

环境景观 —— 绿化种植设计

批准部门 中华人民共和国建设部
主编单位 中国建筑标准设计研究所
实行日期 二00三年二月十五日

批准文号 建质[2003]17号
统一编号 GJBT-599
图 集 号 03J012-2

主编单位负责人 王艳
主编单位技术负责人 李金路
技 术 审 定 人 李金路
设 计 负 责 人 白伟凤

目 录

目录	1~2	VI区代表城市杭州	13~14
说明	3	VII区代表城市广州	15~16
中国主要城市园林植物区划		VIII区代表城市海口	17~18
分区的原则及各区界线	4	IX区代表城市兰州	19~20
区划名称及各区主要城市	5	X区代表城市乌鲁木齐	20~21
中国城市园林植物区划示意图	6	常用木本园林植物性状检索	
主要区划代表城市常用园林植物		生态性状	22~26
及人工配置植物群落	7~21	耐阴树种	22~23
II区代表城市哈尔滨	7~8	阴性树种	23
III区代表城市北京	8~9	抗旱树种	23~24
IV区代表城市郑州	10~11	耐水湿树种	24
V区代表城市南京	11~12		

目 录		图集号	03J012-2
审核	设计	页	1

耐盐碱树种	24
抗污染树种	25~26
抗SO ₂ 树种	25
抗HF树种	26
抗Cl ₂ 树种	26
滞尘力强的树种	26
观赏特性	27~32
观叶类	27~28
彩叶植物	27
双色叶植物	27
香叶植物	27
秋色叶植物	27
春色叶植物	28
观花类	28~30
春花类	28~29
夏花类	29
秋花类	30
冬花类	30
观果类	31
红果(含橙红、粉红色)系列	31
黑果(含紫黑色、蓝黑色)系列	31
黄果系列	31
白果系列	31
紫果系列	31

香花类	32
其他类型	32
招鸟类	25~26
引蝶类	25
代表树种树型	33~35
常绿乔木树形特征	33
落叶乔木树形特征	34
灌木树形特征	35

附表1: 各区划常用木本园林植物性状表

常绿针叶树	36~40
落叶针叶树	40~41
常绿阔叶树	41~54
落叶阔叶树	54~80
竹类	80~82
藤木	82~86

附表2: 常用草本园林植物性状表

一二年生花卉	86~89
宿根花卉	89~91
球根花卉	91~92
水生花卉	92
草坪地被植物	92~93

目 录			图集号	03J012-2
审核	陈雪莉	校对	王紫娟	设计
			白伟凤	页
				2

说明

1 编制依据

本图集是根据建设部建质[2002]156号《二00二年国家建筑标准设计编制工作计划》中有关项目要求进行编制的。

2 主要规范依据

《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》 CJ/T 34-91
《公园设计规范》 CJJ 48-92
《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ 75-97
《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T 82-99
《城市绿化和园林绿地用植物材料球根花卉种球》 CJ/T135-2001

3 适用范围

适用于城镇建设各类绿地。

4 图集内容

- 4.1 本图集共分三部分：中国主要城市园林植物区划；常用木本园林植物性状检索；常见园林植物性状表。
- 4.2 鉴于木本植物是种植设计中的主体，考虑数量的限制，本图集以木本植物为主要收录对象。
- 4.3 图集中代表树种树型，是对自然树种树形的归纳提炼，非原树形的素描。
- 4.4 因某些木本植物属于半常绿性的，如：云南黄馨、红花羊蹄甲、大叶榕、金丝桃等，在附表1中其都归于落叶阔叶树类；在代表城市常用园林植物的常绿性或落叶性的性状归类则依据该树种在城市中表现出的性状为准。
- 4.5 附表1中所列植物高度有两种表示形式：一是表中只有一个

数字，其含义为该树种在原产地可达到的最大高度；二是表中的数字有一个幅度，其含义为该树种在常用地区通常可达的高度至最大高度。

5 定义

- 5.1 阴性树种一般需光度为全日照的5%~20%，不能忍受过强的光照，需在一定的庇荫条件下才可生长良好的树种。
- 5.2 耐阴树种对光照的适应幅度较大，在全日照下生长良好，亦能忍受适当的蔽荫。

6 选用方法

- 6.1 为便于图集的使用，在中国主要城市园林植物区划的基础上列举了九个代表城市的常用园林植物，并作了相应的人工植物群落配置示例。设计者在选用植物做种植设计时，应根据植物的生态习性、生物学特性和具体立地条件，不可一味照搬。
- 6.2 本图集第一、第二部分中列举的植物名称后都有数字序号或拉丁名，木本植物根据序号在附表1中寻找，草本植物根据序号在附表2中寻找。植物名称后附有拉丁名的，表示该植物在附表中检索不到，可借助拉丁名到有关的资料中查寻。如：樟子松(13)，表示樟子松这种植物在图册第三部分的附表1的检索序号为13。
- 6.3 附表1中标有●标志的表示配有植物实物照片，请在图集配套光盘中查找。此照片在做建筑效果渲染图时，也可直接选用。

说明		图集号	03J012-2
审核	设计	页	3

1 中国主要城市园林植物区划

1.1 分区的原则及各区界线

根据中国植被区划, 结合我国主要城市的分布状况, 将全国划分为 11 个大区。各区界线如下:

I 区: 包括东经 $127^{\circ}20'$ (黑河附近) 以西, 北纬 $49^{\circ}20'$ (牙克石附近) 以北的大兴安岭北部及其支脉伊勒呼里山的山地, 含黑龙江及内蒙古北部地区。

II 区: 包括东北平原以北、以东的广阔山地, 南端以丹东至沈阳一线为界, 北部延至黑龙江以南的小兴安岭山地, 在地理上位于北纬 $40^{\circ}15'$ 至 $50^{\circ}20'$, 东经 126° 至 $135^{\circ}20'$ 之间。

III 区: 东北界约以沈阳丹东一线与 II 区为邻; 北接 IX 区, 其界线自开原向西, 大致经彰武、阜新至河北省围场, 沿坝上的南缘通过山西省恒山北坡到兴县, 过黄河进入陕西省吴堡、清涧、安寨、志丹等地, 沿子午岭西坡至甘肃省平凉南端; 南界与 IV 区相邻, 由胶东半岛的胶莱河口向西沿鲁中、南山、丘陵北缘至济南附近, 再沿黄河到聊城地区南部, 经河北省滋县以南至太行山之浊漳河, 然后向西南沿太行山分水岭到山西省运城盆地北沿, 再通过陕西省陕北高原南缘, 最后沿西秦岭北坡山麓与 IX 区南界相接。

IV 区: 北接 III 区南界; 南与 V 区相接, 自甘肃省平凉至天水, 再向西南经礼县到武都, 此线以西为青藏高原; 从武都进入陕西省后, 即沿秦岭山脊分水岭向东到河南省伏牛山主脉南麓, 再沿淮河主流经安徽凤台、蚌埠到江苏省的蒋坝、盐城之后至黄海之滨。

V 区: 北界沿秦岭分水岭, 东至伏牛山主脉南侧, 转向东南, 沿淮河主流, 通过洪泽湖南缘, 经苏北灌溉总渠至黄海, 南界沿大巴山脉分水岭向东南, 到神农架南坡, 经京山、黄陂、桐城一线到长江南岸的铜陵, 沿宣郎广丘陵、宜溧山北缘,

太湖边, 到无锡、昆山, 从崇明、横沙岛之间通过; 西界在松潘附近; 东以黄海边为界。全区包括: 江苏、安徽、河南、湖北、陕西及甘肃等六省的部分地区。

VI 区: 北接 V 区南界; 南界东自三沙湾——飞鸾起, 经戴云山至永定, 达广东龙川、怀集, 广西柳州, 到贵州罗甸、望谟一线, 沿南盘江北面山原, 经曲溪、新平、景东、凤庆、保山至泸水一线; 东起长江口南岸, 经太湖北缘、皖南丘陵, 过江北的菜子湖, 沿长江北岸的黄陂、应城到神农架南坡, 越过大巴山山脊, 止于松潘附近; 西至川西高原南缘。

VII 区: 东起至台湾岛中北部及其附属海岛, 经福建南部, 广东至广西的中部, 贵州的西南部, 云南的中南部, 北回归线从本区通过。

VIII 区: 东起东经 123° 附近的台湾省静浦以南, 西至东经 85° 的西藏南部亚东、聂拉木附近, 北界蜿蜒于北纬 21° — 24° 之间, 南端处于北纬 4° 附近, 包括台湾、广东、广西、云南和西藏等五省区的南部。

IX 区: 包括松辽平原、内蒙古高原、黄土高原的大部分地区和新疆北部的阿尔泰山区。

X 区: 包括新疆维吾尔自治区的准噶尔盆地与塔里木盆地、青海省的柴达木盆地, 甘肃省与宁夏回族自治区北部的阿拉善高平原, 以及内蒙古自治区鄂尔多斯台地西端, 约在北纬 36° 以北, 东经 108° 以西的地区。

XI 区: 青藏高原, 约在北纬 28° — 37° , 东经 75° — 103° 。

中国主要城市园林植物区划		图集号	03J012-2
审核 李雪雁 校对 王黎光 设计 白伟航		页	4

1. 2 区划名称及各区主要城市


区域代号及名称	区域内主要城市
I 寒温带针叶林区	漠河 黑河
II 温带针阔叶混交林区	哈尔滨 牡丹江 鹤岗 鸡西 双鸭山 伊春 佳木斯 长春 四平 延吉 抚顺 铁岭 本溪
III 北部暖温带落叶阔叶林区	沈阳 葫芦岛 大连 丹东 鞍山 辽阳 锦州 营口 盘锦 北京 天津* 太原 临汾 长治 石家庄 秦皇岛 保定 唐山 邯郸 邢台 承德 济南 德州* 延安 宝鸡 天水
IV 南部暖温带落叶阔叶林区	青岛 烟台 日照 威海 济宁 泰安 淄博 潍坊 枣庄 临沂 莱芜 东营* 新泰 滕州 郑州 洛阳 开封 新乡 焦作 安阳 西安 咸阳 徐州 连云港* 盐城 淮北 蚌埠 韩城 铜川
V 北亚热带落叶、常绿阔叶混交林区	南京 扬州 镇江 南通 常州 无锡 苏州 合肥 芜湖 安庆 淮南 襄樊 十堰
VI 中亚热带常绿、落叶阔叶林区	武汉 沙市 黄石 宜昌 南昌 景德镇 九江 吉安 井冈山 赣州 上海 长沙 株洲 岳阳 怀化 吉首 常德 湘潭 衡阳 邵阳 郴州 桂林 韶关 梅州 三明 南平 杭州 温州 金华 宁波 重庆 成都 都江堰 绵阳 内江 乐山 自贡 攀枝花 贵阳 遵义 六盘水 安顺 昆明 大理

区域代号及名称	区域内主要城市
VII 南亚热带常绿阔叶林区	福州 厦门 泉州 漳州 广州 佛山 顺德 东莞 惠州 汕头 台北 柳州 桂平 个旧
VIII 热带季雨林及雨林区	海口 三亚 琼海 高雄 台南 深圳 湛江 中山 珠海 澳门 香港 南宁 钦州 北海 茂名 景洪
IX 温带草原区	兰州 平凉 阿勒泰 海拉尔 满洲里 齐齐哈尔 阜新 肇东 大庆* 西宁 银川 通辽 榆林 呼和浩特 包头 张家口 集宁 赤峰 大同 锡兰浩特
X 温带荒漠区	乌鲁木齐* 石河子 克拉玛依* 哈密 喀什 武威 酒泉 玉门 嘉峪关 格尔木 库尔勒 金昌 乌海
XI 青藏高原高寒植被区	拉萨 日喀则

说明：标*的城市为土壤盐碱化较重的城市，选择园林植物应注意其耐盐碱性。

1. 3 中国城市园林植物区划示意图

区划名称及各区主要城市	图集号	03J012-2
审核 姜雪红 校对 王静 设计 白晓风	页	5



图例

- 首都和直辖市
- 省会城市
- 国界
- 海岸线
- 省界
- 区界
- 珊瑚礁
- 河流
- 山峰

中国城市园林植物区划示意图

图集号

03J012-2

审核 苏雪冰 校对 孙崇山 设计 白佳佩

页

6

1. 4 主要区划代表城市常用园林植物及人工配置植物群落

1. 4. 1 II区代表城市哈尔滨

常绿乔木及小乔木:樟子松(13)、长白松(*Pinus sylvestriiformis*)、红松(15)、黑皮油松(*Pinus tabulaeformis* var. *mukdensis*)、丹东桧(41)、紫杉(61)、红皮云杉(11)、青杆(8)、白杆(9)、鱼鳞云杉(*Picea jezoensis*)、臭冷杉(5)、辽东冷杉(4)、长白侧柏(50)、杜松(59)

落叶乔木及小乔木:兴安落叶松(71)、长白落叶松(*Larix olgensis*)、旱柳(305)、粉枝柳(*Salix rorida*)、银白杨(291)、紫椴(514)、糠椴(516)、榆(326)、垂枝榆(327)、大果榆(324)、春榆(330)、裂叶榆(*Ulmus laciniata*)、毛赤杨(320)、风桦(322)、白桦(321)、糖槭(355)、五角枫(358)、青楷槭(*Acer tegmentosum*)、花楷槭(*Acer ukurunduense*)、水曲柳(558)、花曲柳(559)、黄檗(375)、核桃楸(278)、青杨(299)、香杨(293)、山杨(303)、山槐(398)、水榆花楸(503)、花楸(*Sorbus pohuashanensis*)、山梨(*Pyrus ussuriensis*)、东北杏(*Prunus mandshurica*)、杏(465)、山桃稠李(472)、稠李(473)、山荆子(457)、茶条槭(350)

常绿灌木:偃松(20)、偃柏(38)、天山圆柏(60)、兴安桧(*Sabina davurica*)、矮紫杉(62)、沙地柏(46)

落叶灌木:东北连翘(*Forsythia mandshurica*)、卵叶连翘(*Forsythia ovata*)、欧丁香(578)、匈牙利丁香(564)、喜马拉雅丁香(563)、水腊(584)、偃伏株木(538)、红瑞木(535)、郁李(469)、风箱果(*Physocarpus amurensis*)、黄刺玫(495)玫瑰(502)、刺梅蔷薇(*Rosa davurica*)、东北珍珠梅(494)、金露梅(456)、银

露梅(*Potentilla glabra*)、柳叶绣线菊(444)、绢毛绣线菊(*Spiraea sericea*)、土庄绣线菊(*Spiraea pubescens*)、树锦鸡儿(386)、胡枝子(390)、花木蓝(*Indigofera kirilowii*)、小花溲疏(*Deutzia parviflora*)、大花溲疏(433)、东北溲疏(*Deutzia amurensis*)、太平花(439)、东北山梅花(*Philadelphus schrenkii*)、东北茶藨子(*Ribes manschuricum*)、蓝靛果忍冬(*Lonicera coerulea*)、金银木(597)、长白忍冬(599)、鞑靼忍冬(600)、紫枝忍冬(598)、早花忍冬(*Lonicera praeflorens*)、黄花忍冬(596)、接骨木(608)、东北接骨木(*Sambucus mandshurica*)、阿穆尔小檗(*Berberis amurensis*)、细叶小檗(412)、天目琼花(611)、刺五加(541)、辽东楸木(542)、短梗五加(*Acanthopanax sessiliflorus*)、百里香(*Thymus mongolicus*)

藤本植物:山葡萄(*Vitis amurensis*)、杠柳(692)、北五味子(673)、葛枣猕猴桃(704)、软枣猕猴桃(702)、南蛇藤(683)、蝙蝠葛(*Menispermum dauricum*)

草坪及地被植物:林地早熟禾(*Poa nemoralis*)、草地早熟禾(105)、加拿大早熟禾(*Poa compressa*)、紫羊茅(*Festuca rubra*)、匍茎剪股颖(101)、异穗苔草(*Carex heterostachya*)、卵穗苔草

(*Carex duriuscula*)、羊胡子草(108)、乌苏里苔草(*Carex ussuriensis*)、宽叶苔草(*Carex siderosticta*)、东北天南星(*Arisaema amurense*)、白三叶(99)、连钱草(100)、石竹(*Dianthus chinensis*)、类叶升麻(*Actaea asiatica*)、侧金盏花(*Adonis amurensis*)、草玉梅(*Anemone rivularis*)、山芍药(*Paeonia obovata*)、落新妇(*Astilbe chinese*)、耬斗菜(*Aquilegia vulgaris*)、歪头菜(*Vicia unijuga*)、一枝黄花(*Solidago canadensis*)、燕子花(*Iris laevigata*)、铃兰(*Convallaria majalis*)

植物群落示例:

- 1、红松+白桦+山杨—矮紫杉+偃松+欧丁香+东北连翘—燕子花+铃兰
- 2、糠椴+紫椴+黄檗—矮紫杉+天目琼花+红瑞木—白三叶
- 3、糖槭+紫椴+水曲柳—水榆花楸+红皮云杉+刺五加—东北珍珠梅+偃伏栎木+东北接骨木—连钱草
- 4、春榆+樟子松+白桦—黄花忍冬+柳叶绣线菊+胡枝子—山芍药+一枝黄花+羊胡子草
- 5、红松+旱柳+毛赤杨—花楷槭+花楸+青楷槭—珍珠梅+东北山梅花+小花溲疏—宽叶苔草+歪头菜+落新妇

1.4.2 Ⅲ区代表城市北京

常绿乔木及小乔木:油松(14)、白皮松(25)、乔松(22)、华山松(26)、辽东冷杉(4)、臭冷杉(5)、白杆(9)、青杆(8)、红皮云杉(11)、侧柏(35)、桧柏(37)、龙柏(42)、雪松(30)、杜松(59)

落叶乔木及小乔木:银杏(266)、毛白杨(290)、钻天杨(297)、河北杨(296)、泡桐(365)、旱柳(305)、馒头柳(307)、绦柳(308)、合欢(379)、国槐(396)、刺槐(392)、红花刺槐(394)、皂荚(400)、山皂荚(401)、洋白蜡(557)、臭椿(411)、千头椿(*Ailanthus altissima* cv. Qiantou)、悬铃木(431)、梧桐(531)、栎树(425)、板栗(288)、榉栎(287)、栓皮栎(283)、蒙椴(515)、糠椴(516)、君迁子(549)、柿树(545)、元宝枫(352)、杜仲(432)、丝棉木(507)、火炬树(349)、小叶朴(334)、核桃(279)、榆(326)、桑(418)、玉兰(272)、二乔玉兰(273)、望春玉兰(*Magnolia biondii*)、杏(465)、枣树(510)、杜梨(491)、楸树(372)、梓树(371)、桂香柳(534)、暴马丁香(571)、龙爪槐(397)、海棠花(461)、山楂(455)、西府海棠(462)、紫叶李(466)、白梨(489)、山桃(485)、碧桃(478)、文冠果(428)

常绿灌木:沙地柏(46)、大叶黄杨(135)、矮紫杉(62)、朝鲜黄杨(154)、小叶黄杨(153)、铺地柏(45)

北京市常用园林植物		图集号	03J012-2
审核	设计	页	8

落叶灌木: 猬实(615)、糯米条(593)、金银木(597)、锦带花(602)、木本绣球(610)、天目琼花(611)、欧洲琼花(*Viburnum opulus*)、太平花(439)、棣棠(504)、平枝栒子(452)、水栒子(453)、香荚蒾(613)、金露梅(456)、银露梅(*Potentilla glabra*)、珍珠梅(493)、贴梗海棠(450)、白玉棠(501)、毛樱桃(470)、榆叶梅(486)、黄刺玫(495)、现代月季(497)、玫瑰(502)、大花溲疏(433)、菱叶绣线菊(448)、麻叶绣球(445)、粉花绣线菊(449)、三桠绣球(*Spiraea trilobata*)、珍珠花(442)、香茶藨子(435)、鸡麻(492)、阿穆尔小檗(*Berberis amurensis*)、紫叶小檗(414)、腊梅(506)、牡丹(430)、连翘(553)、丁香(568)、迎春(560)、太平花(439)、小花溲疏(*Deutzia parviflora*)、枸杞(587)、胡枝子(390)、锦鸡儿(385)、紫薇(616)、木槿(626)、海州常山(589)、红瑞木(535)、木本香薷(366)、黄栌(345)、紫荆(402)、石榴(410)、金叶女贞(581)、小叶女贞(582)、雪柳(552)、紫珠(588)、接骨木(608)

藤本植物: 山荞麦(*Polygonum auberti*)、蛇葡萄(*Vitis amurensis*)、葡萄(696)、中国地锦(694)、美国地锦(695)、紫藤(677)、藤本月季(499)、粉团蔷薇(*Rosa multiflora* var. *cathayensis*)、花旗藤(*Rosa* 'American Pilla')、十姐妹(689)、多花蔷薇(688)、木香(687)、南蛇藤(683)、扶芳藤(686)、胶东卫矛(685)、三叶木通(691)、蝙蝠葛(*Menispermum dauricum*)、台尔曼忍冬(700)、金银花(698)、美国凌霄(671)

竹类: 早园竹(662)、黄槽竹(663)、筠竹(*Phyllostachys glauca* f. *yuozhu*)、斑竹(653)、苦竹(664)、阔叶箬竹(642)

草坪及地被植物: 野牛草(103)、中华结缕草(*Zoysia sinica*)、日本结缕草(106)、紫羊茅(*Festuca rubra*)、羊茅(109)、苇状羊茅(*Festuca arundinacea*)、林地早熟禾(*Poa nemoralis*)、草地早熟禾

(105)、加拿大早熟禾(*Poa compressa*)、早熟禾(*Poa annua*)、小糠草(*Agrostis alba*)、匍茎剪股颖(101)、崂峪苔草(*Carex* sp.)、羊胡子草(108)、白三叶(99)、鸢尾(77)、萱草(71)、玉簪(72)、麦冬(74)、二月兰(98)、马蔺(*Iris ensata*)、紫花地丁(*Viola chinesis*)、蛇莓(*Duchesnea indica*)、蒲公英(*Taraxacum mongolicum*)

植物群落示例:

- 1、绦柳—白杆+青杆—矮紫杉+大叶黄杨球+棣棠+紫藤—崂峪苔草
- 2、河北杨+油松—金银木+珍珠梅—羊胡子草
- 3、桧柏—太平花+接骨木—萱草
- 4、油松—紫丁香+白玉棠—剪股颖
- 5、榆树—小花溲疏+猬实—二月兰+丹麦草
- 6、臭椿—胡枝子+红瑞木—玉簪
- 7、刺槐—棣棠+紫珠—二月兰
- 8、栾树—天目琼花+糯米条—鸢尾
- 9、泡桐—柳叶绣线菊+连翘—白三叶

1.4.3 IV区代表城市郑州

常绿乔木及小乔木: 油松(14)、白皮松(25)、黑松(16)、华山松(26)、赤松(18)、雪松(30)、日本花柏(34)、日本扁柏(54)、侧柏(35)、云杉(10)、桧柏(37)、龙柏(42)、刺柏(58)、千头柏(36)、女贞(190)、广玉兰(89)、枇杷(134)、石楠(130)、棕榈(239)、蚊母(151)、桂花(184)、刺桂(189)

落叶乔木及小乔木: 水杉(73)、银杏(266)、悬铃木(413)、毛泡桐(367)、泡桐(365)、梓树(371)、楸树(372)、桑树(418)、青桐(513)、毛白杨(290)、黄连木(346)、国槐(396)、龙爪槐(397)、刺槐(392)、皂荚(400)、合欢(379)、乌桕(526)、旱柳(305)、垂柳(304)、枫杨(280)、核桃(279)、榉栎(287)、光叶榉(335)、栾树(425)、小叶朴(334)、杜仲(432)、板栗(288)、麻栎(282)、栓皮栎(283)、柿树(545)、构树(416)、白蜡(555)、洋白蜡(557)、玉兰(272)、枣树(510)、鸡爪槭(359)、红枫(362)、茶条槭(350)、五角枫(358)、流苏(551)、刺楸(543)、楝树(343)、丝棉木(507)、四照花(539)、七叶树(623)、臭椿(411)、千头椿(*Ailanthus altissima* cv. *Qiantou*)、东京樱花(475)、杏(465)、木瓜(451)、海棠花(461)、紫叶李(466)、白梨(489)、日本晚樱(471)、山楂(455)、碧桃(478)

常绿灌木: 沙地柏(46)、铺地柏(45)、翠柏(49)、鹿角柏(39)、枸骨(169)、海桐(149)、大叶黄杨(135)、小叶黄杨(153)、黄杨(156)、凤尾兰(263)、丝兰(264)、十大功劳(118)、八角金盘(215)、桃叶珊瑚(167)、小蜡(583)、水蜡(584)、夹竹桃(219)、蔓常春花(*Vinca major*)、火棘(132)、金丝桃(627)

落叶灌木: 香荚蒾(613)、接骨木(608)、猬实(615)、糯米条(593)、海州常山(589)、贴梗海棠(450)、麦李(467)、欧李(*Prunus humilis*)、郁李(469)、白鹃梅(440)、榆叶梅(486)、黄刺玫(495)、

珍珠梅(493)、珍珠花(442)、粉花绣线菊(449)、现代月季(497)、平枝栒子(452)、鸡麻(492)、紫珠(588)、棣棠(504)、细叶小檗(412)、紫叶小檗(414)、牡丹(430)、东陵八仙花(436)、木本绣球(610)、三桠绣球(*Spiraea trilobata*)、金叶女贞(581)、紫荆(402)、小叶女贞(582)、连翘(553)、丁香(568)、雪柳(552)、迎春(560)、腊梅(506)、锦鸡儿(385)、胡枝子(390)、太平花(439)、山梅花(438)、红瑞木(535)、锦带花(602)、海仙花(609)、天目琼花(611)、金银木(597)、石榴(410)、接骨木(608)、花椒(377)、竹叶椒(*Zanthoxylum armatum*)、木槿(626)、秋胡颓子(533)、紫珠(588)、紫薇(616)、紫玉兰(271)、枸桔(378)

竹类: 淡竹(661)、刚竹(654)、紫竹(660)、罗汉竹(651)、斑竹(653)、早园竹(662)、筠竹(*Phyllostachys glauca* f. *yuozhu*)、苦竹(664)、箬竹(642)

藤本植物: 中华常春藤(705)、洋常春藤(707)、地锦(694、695)、葡萄(696)、蛇葡萄(*Vitis amurensis*)、金银花(698)、胶东卫矛(685)、木香(687)、紫藤(677)、扶芳藤(686)、爬行卫矛(684)、猕猴桃(701)、美国凌霄(671)、凌霄(672)、藤本月季(499)、三叶木通(691)

草坪及地被植物: 中华结缕草(*Zoysia nini*)、日本结缕草(106)、马尼拉结缕草(*Zoysia matella*)、草地早熟禾(105)、早熟禾(*Poa annua*)、匍茎剪股颖(101)、小糠草(*Agrostis alba*)、紫羊茅(*Festuca rubra*)、羊茅(109)、双穗雀稗(*Paspalum distichum*)、麦冬(74)、红花酢浆草(112)、鸢尾(77)、萱草(71)、紫萼(*Hosta ventricosa*)、玉簪(72)、白三叶(99)、二月兰(98)、连钱草(100)

植物群落示例:

- 1、 楝树+龙柏—黄杨+石楠+棣棠—二月兰
- 2、 栓皮栎+华山松—溲疏+天目琼花—玉簪+萱草
- 3、 麻栎+栓皮栎+黄连木+龙柏—四照花+连翘—宽叶麦冬
- 4、 楸树+梓树—石楠+糯米条+棣棠—红花酢浆草
- 5、 华山松+乌桕+黄连木—黄栌+平枝栒子—白三叶

1.4.4 V区代表城市南京

常绿乔木及小乔木: 湿地松(28)、黑松(16)、赤松(18)、白皮松(25)、马尾松(27)、罗汉松(67)、雪松(30)、桧柏(37)、龙柏(42)、云片柏(55)、柏木(51)、日本冷杉(6)、日本五针松(24)、日本花柏(34)、日本扁柏(54)、北美圆柏(47)、广玉兰(89)、女贞(191)、柳杉(31)、青冈栎(95)、棕榈(237)、桂花(184)、石楠(130)、蚊母(151)、刺桂(189)、珊瑚树(197)、枇杷(134)、油橄榄(191)

落叶乔木及小乔木: 金钱松(75)、水杉(73)、落羽杉(77)、池杉(76)、悬铃木(431)、黄金树(373)、楸树(372)、榔榆(325)、光叶榉(335)、白蜡(555)、桑树(418)、构树(416)、刺槐(392)、江南槐(395)、国槐(396)、龙爪槐(397)、合欢(379)、银杏(266)、薄壳山核桃(281)、枫杨(280)、毛白杨(290)、杜仲(432)、柿树(545)、垂柳(304)、赤杨(319)、板栗(288)、麻栎(282)、栓皮栎(283)、朴树(331)、榉树(286)、榉栎(287)、鹅掌楸(267)、玉兰(272)、二乔玉兰(273)、皂荚(400)、刺楸(543)、青桐(531)、毛泡桐(367)、泡桐(365)、七叶树(623)、白蜡(555)、三角枫(357)、鸡爪槭(359)、红枫(362)、枳椇(508)、枫香(523)、丝棉木(507)、南酸枣(345)、黄连木(346)、复羽叶栎树(426)、重阳木(528)、乌桕(526)、臭椿(411)、紫叶李(466)、沙梨(490)、东京樱花(475)、山楂(455)、木瓜(451)、海棠花(461)、梅花(487)、碧桃(478)、日本晚樱(471)

南京市常用园林植物			图集号	03J012-2
审核	苏雪银	校对	王琳	设计
			页	11

常绿灌木: 平头赤松(19)、翠柏(49)、铺地柏(45)、鹿角柏(39)、千头柏(36)、线柏(*Chamaecyparis pisifera* cv. *Filifera*)、火棘(132)、海桐(149)、枸骨(169)、山茶花(174)、茶梅(175)、胡颓子(166)、大叶黄杨(135)、小叶黄杨(153)、黄杨(156)、迎春(560)、夹竹桃(219)、南天竹(119)、十大功劳(118)、阔叶十大功劳(117)、凤尾兰(263)、丝兰(264)、小叶女贞(582)、金叶女贞(581)、小蜡(583)、水蜡(584)、金丝桃(627)、桃叶珊瑚(167)、洒金东瀛珊瑚(168)、八角金盘(215)

落叶灌木: 紫玉兰(271)、星花玉兰(274)、珍珠花(442)、麻叶绣线菊(445)、菱叶绣线菊(448)、玫瑰(502)、现代月季(497)、郁李(469)、麦李(467)、垂丝海棠(459)、贴梗海棠(450)、棣棠(504)、山梅花(438)、平枝栒子(452)、海州常山(589)、紫叶小檗(414)、牡丹(430)、溲疏(434)、金钟花(554)、紫珠(588)、紫薇(616)、腊梅(506)、紫荆(402)、锦鸡儿(385)、四照花(539)、糯米条(593)、海仙花(609)、木本绣球(610)、蝴蝶树(614)、天目琼花(611)、金银木(597)、接骨木(608)、无花果(422)、结香(629)、木槿(626)、木芙蓉(625)、云锦杜鹃(218)、石榴(410)、秋胡颓子(533)、花椒(377)、枸桔(378)、醉鱼草(585)、白鹃梅(440)、雪柳(552)、羽毛枫(360)

竹类: 孝顺竹(643)、苦竹(664)、箬竹(642)、毛竹(658)、菲白竹(665)、桂竹(652)、斑竹(653)、刚竹(654)、罗汉竹(651)、淡竹(661)、紫竹(660)

藤本植物: 盘叶忍冬(697)、贯叶忍冬(699)、金银花(698)、地锦(694、695)、紫藤(677)、凌霄(672)、美国凌霄(671)、珍珠莲(*Ficus foveolata*)、络石(709)、南蛇藤(683)、胶东卫矛(685)、三叶木通(691)、木香(687)、中华常春藤(705)、洋常春藤(707)、猕猴桃

(701)、葡萄(696)、薜荔(682)、扶芳藤(686)

草坪及地被植物: 狗牙根(104)、假俭草(111)、中华结缕草(*Zoysia nini*)、日本结缕草(106)、细叶结缕草(107)、马尼拉结缕草(*Zoysia matrella*)、草地早熟禾(105)、早熟禾(*Poa annua*)、匍茎剪股颖(101)、小糠草(*Agrostis alba*)、紫羊茅(*Festuca rubra*)、羊茅(109)、双穗雀稗(*Paspalum distichum*)、宽叶麦冬(74)、山麦冬(*Liriope spicata*)、红花酢浆草(112)、石蒜(83)、石菖蒲(*Acorus gramineus*)、沿阶草(75)、二月兰(98)、吉祥草(67)、鸢尾(77)、忽地笑(*Lycoris ovrea*)、玉簪(72)、石竹(101)、花叶蔓长春花 (*Vinca minor* cv. *Variegata*)

植物群落示例:

- 1、水杉+黄连木+乌桕+连香树—卫矛+石楠+十大功劳+粉花绣线菊+棣棠—鸢尾
- 2、马尾松+栓皮栎+麻栎—山茶+垂丝海棠+棣棠—酢浆草
- 3、全缘栎+合欢—洒金东瀛珊瑚+海桐+南天竹—沿阶草
- 4、悬铃木+垂柳+黑松—金钟花+紫珠+麻叶绣球——二月兰
- 5、鹅掌楸 +广玉兰+桂花—八仙花+天目琼花+珍珠梅—萱草+玉簪
- 6、广玉兰+白玉兰—山茶—阔叶麦冬
- 7、雪松+龙柏+红枫—大叶黄杨球+锦绣杜鹃—雏菊+沿阶草
- 8、重阳木+乌桕+金钱松+黑松—毛白杜鹃+锦绣杜鹃—连钱草
- 9、鸡爪槭+红枫+桂花—海桐+锦带花+金钟花—花叶蔓长春花

南京市常用园林植物		图集号	03J012-2
审核	苏雪东 校对	于晓光 设计	白伟红
		页	12

1.4.5 VI区代表城市杭州

常绿乔木及小乔木: 黑松(16)、马尾松(27)、赤松(18)、湿地松(28)、五针松(24)、北美圆柏(47)、日本冷杉(6)、日本扁柏(54)、柏木(51)、侧柏(35)、云片柏(55)、日本花柏(34)、桧柏(37)、龙柏(42)、白皮松(25)、罗汉松(67)、雪松(30)、柳杉(31)、红豆杉(64)、三尖杉(69)、广玉兰(89)、红茴香(*Illicium henryi*)、木莲(86)、厚皮香(182)、桂花(184)、女贞(190)、香樟(138)、浙江樟(140)、檫木(521)、红楠(146)、紫楠(143)、杜英(200)、冬青(171)、石楠(130)、青冈栎(95)、钩栗(94)、苦槠(91)、石栎(90)、栲树(93)、木荷(181)、珊瑚树(197)、杨梅(96)、枇杷(134)、大叶冬青(172)、乐昌含笑(80)、火力楠(81)、深山含笑(82)、浙江楠(*Phoebe chekiangensis*)、华东楠(147)、棕榈(239)、蚊母(151)

落叶乔木及小乔木: 水杉(73)、池杉(76)、落羽杉(77)、墨西哥落羽杉(78)、金钱松(75)、银杏(266)、七叶树(623)、鹅掌楸(267)、玉兰(272)、薄壳山核桃(281)、麻栎(282)、栓皮栎(283)、白栎(*Quercus fabri*)、板栗(288)、槲栎(287)、枫香(523)、乌桕(526)、栎树(425)、全缘栎树(427)、无患子(424)、垂柳(304)、大叶柳(309)、水冬瓜(318)、枫杨(280)、悬铃木(431)、重阳木(528)、南酸枣(345)、黄连木(346)、八角枫(*Alangium chinensis*)、三角枫(357)、鸡爪槭(359)、红枫(362)、羽扇槭(*Acer japonicum cv. Aconitifolium*)、青榨槭(356)、苦槠(343)、川楝(344)、榔榆(325)、桑(418)、柘(417)、青桐(531)、合欢(379)、皂荚(400)、枳椇(508)、刺槐(392)、国槐(396)、龙爪槐(397)、杜仲(432)、榉树(334)、朴树(331)、珊瑚朴(333)、油柿(*Diospyros oleifera*)、喜树(633)、刺楸(543)、丝棉木(507)、臭椿(411)、天目木姜子(*Litsea*

auriculata)、沙梨(490)、东京樱花(475)、杏(465)、木瓜(451)、紫叶李(466)、海棠花(461)、梅花(487)、日本晚樱(471)、碧桃(478)、四照花(539)、瓶兰花(*Diospyros armata*)

常绿灌木: 铺地柏(45)、翠柏(49)、鹿角柏(39)、千头柏(36)、线柏(*Chamaecyparis pisifera cv. Filifera*)、粗榧(70)、南天竹(119)、海桐(149)、夹竹桃(219)、栀子花(225)、十大功劳(118)、阔叶十大功劳(117)、火棘(132)、枸骨(169)、红花油茶(180)、油茶(179)、山茶花(174)、云南黄馨(561)、含笑(83)、瑞香(204)、八角金盘(215)、黄杨(156)、桃叶珊瑚(167)、洒金珊瑚(168)、水蜡(584)、小蜡(583)、大叶黄杨(135)、小叶女贞(582)、金叶女贞(581)、金丝桃(627)

落叶灌木: 棣棠(504)、垂丝海棠(459)、贴梗海棠(450)、笑靥花(441)、珍珠花(442)、麻叶绣线菊(445)、菱叶绣线菊(448)、现代月季(497)、欧丁香(578)、紫荆(402)、腊梅(506)、木芙蓉(625)、木槿(626)、糯米条(593)、石榴(410)、毛白杜鹃(638)、云锦杜鹃(218)、牡丹(430)、木本绣球(610)、蝴蝶树(614)、金银木(597)、无花果(422)、结香(629)、花椒(377)、枸桔(378)、醉鱼草(585)、紫薇(616)、溲疏(434)、紫叶小檗(414)、山梅花(438)、海仙花(609)、羽毛枫(360)、紫玉兰(271)、枸桔(378)

竹类: 孝顺竹(643)、苦竹(664)、箬竹(642)、毛竹(658)、菲白竹(665)、桂竹(652)、凤尾竹(644)、慈竹(667)、斑竹(653)、刚竹(654)、淡竹(661)、紫竹(660)、罗汉竹(651)、龟甲竹(659)

藤本植物: 紫藤(677)、络石(709)、薛荔(682)、地锦(694,695)、木香(687)、雀梅藤(512)、木通(690)、三叶木通(691)、藤本月季(499)、中华常春藤(705)、洋常春藤(707)、长春油麻藤(679)

草坪及地被植物: 狗牙根(104)、假俭草(111)、结缕草(106)、细叶结缕草(107)、中华结缕草(*Zoysia nitida*)、马尼拉结缕草(*Zoysia matrella*)、草地早熟禾(105)、早熟禾(*Poa annua*)、匍茎剪股颖(101)、小糠草(*Agrostis alba*)、紫羊茅(*Festuca rubra*)、双穗雀稗(*Paspalum distichum*)、山麦冬(*Liriope spicata*)、宽叶麦冬(74)、沿阶草(75)、石菖蒲(*Acorus gramineus*)、蝴蝶花(*Iris japonica*)、马蹄金(113)、花叶蔓常春花(*Vinca minor* cv. *Variegata*)、葱兰(86)、韭兰(*Euphyranthes candida*)、水仙(84)、石蒜(83)、鹿葱(*Lycoris squamigera*)、忽地笑(*Lycoris radiata*)、连钱草(100)、红花酢浆草(112)、换锦花(*Lycoris sprengeri*)、雪滴花(*Leucojum vernum*)、大吴风草(*Farfugium japonicum*)、二月兰(98)、马蹄金(113)

植物群落示例:

- 1、香樟+紫楠+银杏+马尾松—木本绣球+杜鹃+洒金东瀛珊瑚—沿阶草
- 2、大叶柳—枸骨—吉祥草
- 3、麻栎+枫香—厚皮香+红茴香—二月兰
- 4、香樟—瓶兰花+海桐+栀子花—红花酢浆草
- 5、栓皮栎+枫香+马尾松—棣棠+红瑞木—蝴蝶花
- 6、黑松+赤松—杂种杜鹃+云锦杜鹃—石蒜

7、乐昌含笑+火力楠—洒金东瀛珊瑚+毛白杜鹃+锦绣杜鹃—石菖蒲

8、白玉兰+广玉兰—含笑+八角金盘—玉簪

9、深山含笑+桂花—阔叶十大功劳+南天竹—马蹄金

10、金钱松—锦绣杜鹃—苔草

11、全缘栾树+合欢—栀子+金丝桃—大吴风草

12、三角枫+枫香+乌桕—八仙花+蝴蝶绣球—花叶长春蔓

1.4.6 VII区代表城市广州

常绿乔木及小乔木: 南洋杉(2)、湿地松(28)、杉木(32)、加勒比松(29)、桧柏(37)、龙柏(42)、侧柏(35)、柏木(51)、福建柏(53)、罗汉松(67)、柳杉(31)、竹柏(66)、长叶竹柏(*Podocarpus fleuryi*)、香榧(65)、三尖杉(69)、印度橡胶榕(123)、高山榕(122)、小叶榕(120)、大果榕(126)、垂叶榕(124)、黄葛榕(423)、菩提树(125)、木麻黄(234)、白兰(84)、广玉兰(89)、厚朴(275)、阴香(142)、香樟(138)、肉桂(141)、苦梓(*Gmelina hainanensis*)、海南红豆(109)、台湾相思(111)、铁刀木(114)、红花羊蹄甲(403)、羊蹄甲(404)、洋紫荆(405)、扁桃(101)、芒果(102)、蒲桃(211)、人心果(233)、柠檬桉(208)、窿缘桉(*Eucalyptus exserta*)、大叶桉(207)、蓝桉(210)、白千层(213)、蝴蝶果(162)、木波罗(127)、樟叶槭(*Acer cinnamomifolium*)、苦楮(91)、青岗栎(95)、石栗(163)、银桦(199)、杜英(200)、黄槿(203)、铁冬青(170)、女贞(190)、桂花(184)、枇杷(134)、南洋楹(112)、桃花心木(97)、大叶桃花心木(98)、假萍婆(*Sterculia lanceolata*)、中国无忧花(116)、番荔枝(*Annona squamosa*)、龙眼(128)、人面子(100)、火力楠(81)、腊肠树(409)、花榈木(110)、水翁(*Cleistocalyx operculatus*)、水石榕(*Elaeocarpus hainanensis*)、油梨(*Persea americana*)、盆架子(222)、棕榈(239)、假槟榔(241)、蒲葵(240)、鱼尾葵(245)、皇后葵(243)、大王椰子(244)、董棕(247)、老人葵(260)、桃榔(261)、槟榔(*Areca catechu*)、长叶刺葵(251)

落叶乔木及小乔木: 榄仁(641)、水松(74)、池杉(76)、落羽杉(77)、鹅掌楸(267)、白玉兰(272)、青桐(531)、大花紫薇(617)、木棉(620)、凤凰木(407)、洋金凤(406)、蓝花楹(374)、黄槐(408)、苦楝(343)、麻楝(342)、刺桐(383)、板栗(288)、麻栎(282)、栓

皮栎(283)、朴树(331)、榔榆(325)、白栎(*Quercus fabri*)、喜树(633)、合欢(379)、金合欢(*Acacia farnesiana*)、刺楸(543)、枫香(523)、垂柳(304)、二乔玉兰(273)、水冬瓜(318)、乌桕(526)、枳椇(508)、沙梨(490)、无患子(424)、全缘栎树(427)、鸡蛋花(639)、紫叶李(466)、碧桃(478)、梅(487)、木瓜(451)
常绿灌木: 苏铁(1)、粗榧(70)、米仔兰(99)、四季米仔兰(*Aglaia duperreana*)、九里香(*Murraya exotica*)、红背桂(161)、鹰爪花(*Artabotrys hexapetalus*)、山茶花(174)、油茶(179)、大叶茶(177)、夹竹桃(219)、黄花夹竹桃(*Thevetia peruviana*)、小花黄蝉(221)、六月雪(226)、软枝黄蝉(708)、小叶驳骨丹(229)、朱蕉(262)、变叶木(159)、红桑(158)、金边桑(*Acalypha wikesiana* cv. *Marginata*)、金叶榕(121)、光叶决明(*Cassia floribunda*)、马银花(*Rhododendron ovatum*)、紫金牛(*Ardisia japonica*)、含笑(83)、海桐(149)、十大功劳(118)、南天竹(119)、八角金盘(215)、夜合(88)、扶桑(201)、吊灯花(202)、红千层(212)、福建茶(235)、假连翘(195)、栀子花(225)、虎刺梅(529)、一品红(160)、云南黄馨(561)、桃叶珊瑚(167)、枸骨(169)、洋杜鹃(217)、映山红(634)、凤尾兰(263)、丝兰(264)、华南黄杨(155)、大叶黄杨(135)、密花胡颓子(*Elaeagnus conferta*)、茶梅(175)、华南珊瑚树(198)、洒金珊瑚(168)、金丝桃(627)、三药槟榔(242)、

散尾葵(253)、琼棕(*Chuniophoenix hainanensis*)、轴榈(*Licuala fordiana*)、软叶刺葵(250)、短穗鱼尾葵(246)、矮棕竹(255)、筋头竹(256)

落叶灌木: 木芙蓉(625)、木槿(626)、紫荆(402)、郁李(469)、笑靥花(441)、珍珠花(442)、麻叶绣线菊(445)、菱叶绣线菊(448)、现代月季(497)、糯米条(593)、石榴(410)、紫珠(588)、紫玉兰(271)、胡枝子(390)、金银木(597)、木本绣球(610)、蝴蝶树(614)、接骨木(608)、无花果(422)、花椒(377)、枸桔(378)、醉鱼草(585)、小蜡(583)

竹类: 青皮竹(646)、慈竹(667)、粉单竹(648)、箬竹(642)、苦竹(664)、孝顺竹(643)、凤尾竹(644)、毛竹(658)、淡竹(661)、黄金间碧玉竹(650)、佛肚竹(649)、麻竹(*Dendrocalamus latiflorus*)

藤本植物: 龟背竹(714)、叶子花(712)、麒麟尾(713)、绿萝(*Epipremnum aureum*)、中华常春藤(705)、洋常春藤(707)、络石(709)、南五味子(674)、地锦(694,695)、凌霄(671,672)、西番莲(717)、多花紫藤(678)、常春油麻藤(679)、鸡血藤(676)、炮仗花(669)、使君子(711)、三叶木通(691)、金银花(698)、扶芳藤(686)、薜荔(682)、猕猴桃(701)、爬行卫矛(684)、香港崖角藤(*Rhaphidophora hongkongensis*)、禾雀花(*Mucuna birdwoodiana*)、球兰(*Hoya carnos*)、大花老鸦嘴(*Thunbergia grandiflora*)

草坪及地被植物: 地毯草(102)、狗牙根(104)、假俭草(111)、双穗雀稗(*Paspalum distichum*)、细叶结缕草(107)、中华结缕草(*Zoysia nini*)、马尼拉结缕草(*Zoysia matella*)、广东万年青(68)、石菖蒲(*Acorus gramineus*)、葱兰(86)、韭兰(*Eephyranthes candida*)、忽地笑(*Lycoris aurea*)、吊竹梅(*Zebrina pendula*)、紫

露草(*Tradescantia virginiana*)、蚌花(*Rhoeo discolor*)、沿阶草(75)、大叶仙茅(*Curculigo orchioides*)、白蝴蝶(*Syngonium podophyllum*)、蝴蝶花(*Iris japonica*)、红花酢浆草(112)、黑眼花(*Thunbergia alata*)、山麦冬(*Liriope spicata*)、吉祥草(67)、一叶兰(*Aspidistra elatior*)

植物群落示例:

- 1、小叶榕+榄树+朴树+假萍婆—散尾葵—春羽+艳山姜
- 2、红花羊蹄甲—山茶—海芋+艳山姜—地毯草
- 3、白兰—油茶+大头菜—虎尾兰
- 4、白千层—九里香—沿阶草
- 5、蒲葵—南天竹+海桐—红花酢浆草+大叶仙茅
- 6、半枫荷—冬红+毛茉莉—地毯草
- 7、南洋楹—鹰爪花+含笑+山茶+紫金牛—蝴蝶花
- 8、白兰—大叶米兰—珠兰+紫背竹芋
- 9、大叶桉—长叶竹柏—棕竹—沿阶草
- 10、盆架树—红背桂+假连翘—吊竹梅
- 11、台湾相思+小叶榕—九里香+木本绣球+梔子—白蝴蝶
- 12、火力楠+红花木莲—含笑+夜合+厚皮香—蚌花

1.4.7 Ⅷ区代表城市海口

常绿乔木及小乔木: 海南五针松(*Pinus fenzeliana*)、罗汉松(67)、竹柏(66)、南洋杉(2)、异叶南洋杉(3)、侧柏(35)、龙柏(42)、北美圆柏(47)、木莲(86)、红花木莲(*Manglietia insignis*)、腰果(*Anacardium occidentale*)、酸豆树(115)、大叶桃花心木(98)、血桐(*Macaranga tanarius*)、蝴蝶果(163)、火焰木(236)、观光木(*Tsoongiodendron odorum*)、白兰(84)、黄兰(85)、乐昌含笑(80)、香樟(138)、阴香(142)、阳桃(*Averrhoa carambola*)、白千层(213)、木荷(181)、青皮(*Vatica mangachampoi*)、乌墨(*Syzygium cumini*)、木波罗(127)、蒲桃(211)、芒果(102)、扁桃(101)、橄榄(194)、柠檬桉(208)、银桦(199)、杜英(200)、水石榕(*Elaeocarpus hainanensis*)、假萍婆(*Sterculia lanceolata*)、萍婆(165)、铁刀木(114)、大花五桠果(*Dillenia turbinata*)、台湾相思(111)、马占相思(*Acacia mangium*)、南洋楹(112)、洋紫荆(405)、中国无忧花(116)、海南红豆(109)、木麻黄(234)、木波罗(127)、高山榕(123)、大叶榕(423)、大果榕(126)、垂叶榕(124)、桂木(*Artocarpus nitidus*)、铁冬青(170)、桃花心木(97)、龙眼(128)、荔枝(129)、石栗(163)、秋枫(*Bischofia javanica*)、人面子(100)、鹅掌柴(216)、人心果(233)、羊蹄甲(404)、红花羊蹄甲(403)、桂花(184)、黑板树(220)、海南菜豆树(*Radermachera hainanensis*)、柚木(*Tectona grandis*)、黄槿(203)、假槟榔(241)、槟榔(*Areca catechu*)、鱼尾葵(245)、董棕(247)、椰子(248)、酒瓶椰子(259)、三角椰子(*Neodypsis decaryi*)、王棕(244)、油棕(257)、长叶刺葵(251)、皇后葵(243)、丝葵(260)、红刺露兜树(262)

落叶乔木及小乔木: 水杉(73)、池杉(76)、落羽杉(77)、玉兰(272)、二乔玉兰(273)、大花紫薇(617)、鱼木(*Grateva religiosa*)、榄仁(641)、梧桐(531)、爪哇木棉(621)、美丽异木棉(*Ceiba insignis*)、

木棉(620)、海红豆(*Adenathera pavonina* var. *microsperma*)、楹树(380)、阔荚合欢(*Albizia lebbeck*)、黄槐决明(134)、腊肠树(409)、凤凰木(407)、刺桐(383)、紫檀(382)、枫香(523)、垂柳(304)、朴树(331)、榔榆(325)、菩提树(125)、麻楝(342)、非洲楝(*Khaya senegalensis*)、复羽叶栎树(426)、无患子(424)、红枫(362)、岭南酸枣(*Spondias lakonensis*)、喜树(633)、蓝花楹(374)、三角枫(357)、紫叶李(466)、碧桃(478)

常绿灌木: 千头柏(36)、苏铁(1)、夜合花(88)、含笑(83)、鹰爪花(*Artabotrys hexapetalus*)、南天竹(119)、金粟兰(*Chloranthus spicatus*)、海桐(149)、油茶(179)、山茶花(174)、红千层(212)、桃金娘(214)、野牡丹(*Melastoma candidum*)、金丝桃(627)、扶桑(201)、吊灯扶桑(202)、金英(*Thryallis glauca*)、红桑(158)、变叶木(159)、肖黄栌(157)、铁海棠(529)、一品红(160)、红背桂(161)、火棘(132)、石斑木(131)、华南黄杨(155)、棱果蒲桃(*Eugenia uniflora*)、密花胡颓子(*Elaeagnus conferta*)、九里香(106)、米仔兰(99)、八角金盘(215)、鹅掌藤(706)、云南黄馨(561)、茉莉(183)、夹竹桃(219)、黄花夹竹桃(*Thevetia peruviana*)、大花梔子(225)、希茉莉(223)、龙船花(224)、红叶金花(*Mussaenda erythrophylla*)、六月雪(226)、珊瑚树(197)、福建茶(235)、夜香树(192)、驳骨丹(229)、黄钟花(238)、小蜡(山指甲)(583)、荷包花(592)、假连翘(195)、马缨丹(196)、红花檵木(150)、枸骨(169)、锦绣杜鹃(635)、朱蕉(262)、龙血树

(*Dracaena cambodiana*)、凤尾兰(263)、散尾葵(253)、短穗鱼尾葵(246)、美丽针葵(250)、棕竹(256)、矮棕竹(255)、琼棕(*Chuniophoenix hainanensis*)、三药槟榔(242)、轴榈(*Licuala fordiana*)

落叶灌木:紫薇(616)、石榴(410)、木芙蓉(625)、木槿(626)、木本绣球(610)、现代月季(497)、金凤花(406)、双荚决明(113)

竹类:青皮竹(646)、佛肚竹(649)、凤尾竹(644)、黄金间碧玉竹(650)、粉单竹(648)、方竹(668)、龟甲竹(659)、孝顺竹(643)、紫竹(660)、小琴丝竹(*Bambusa multiplex* cv. *Alphonse*)、麻竹(*Dendrocalamus latiflorus*)、毛竹(658)、吊丝竹(*Dendrocalamus minor*)、茶秆竹(666)、撑篙竹(*Bambusa pervariabilis*)

藤本植物:叶子花(712)、鸡蛋果(*Passiflora edulis*)、猕猴桃(701)、使君子(711)、白花油麻藤(*Mucuna birdwoodiana*)、多花紫藤(678)、薛荔(682)、异叶爬墙虎(*Parthenocissus heterophylla*)、洋常春藤(707)、软枝黄蝉(708)、金银花(698)、凌霄(672)、蒜香藤(670)、炮仗花(669)、蓝花藤(*Petrea volubilis*)、马鞍藤(*Ipomoea pes-caprae*)、大花老鸦嘴(*Thunbergia grandiflora*)、西番莲(717)、麒麟尾(713)、龟背竹(714)

草坪及地被植物:地毯草(102)、狗牙根(104)、假俭草(111)、双穗雀稗(*Paspalum distichum*)、细叶结缕草(107)、中华结缕草(*Zoysia nini*)、马尼拉结缕草(*Zoysia matella*)、彩叶草(*Coleus hybrida*)、蚌花(*Rhoeo discolor*)、紫鸭趾草(*Setcreasea purpurea*)、吊竹梅(*Zebrina pendula*)、白蝴蝶(*Syngonium podophyllum* cv. *Albovirens*)、大花美人蕉(*Canna generalis*)、蟛蜞菊(*Wedelia trilobata*)、蜘蛛兰(*Hymenocallis littoralis*)、文殊兰(*Crinum asiaticum*)、万年青(68)、仙茅(*Curculigo orchioides*)、土麦冬(*Liriope spicata*)、阔叶麦冬(74)、忽地笑(*Lycoris aurea*)、石蒜(83)、葱兰(86)、柊叶(*Phrynium capitatum*)

植物群落示例:

- 1、木棉+红花木莲—大花紫薇+红花羊蹄甲+鱼尾葵—桃金娘+含笑+鹰爪花+野牡丹+金丝桃+八仙花—葱兰+蜘蛛兰
- 2、凤凰木+白兰—黄槐+紫花羊蹄甲—含笑+茶梅+九里香—韭兰+忽地笑+紫三七
- 3、火焰木+黄兰—双翼豆(*Peltophorum pterocarpum*)+红绒球(*Calliandra haematocephala*)+金凤花+双荚决明—石蒜+姜花(*Hedychium coronarium*)+仙茅
- 4、蓝花楹+无忧树—龙牙花+紫玉兰+狗牙花+红花檵木+米仔兰—红花酢浆草+千年健(*Homalomena occulta*)+益智(*Alpinia oxyphylla*)
- 5、全缘栾树+大花第伦桃+洋蒲桃—软枝黄蝉+大花栀子+海桐—紫鸭趾草+艳山姜(*Alpinia zerumbet*)
- 6、吊瓜木+火力楠+蒲桃—水石榕+希茉莉+白纸扇(*Mussaenda philippica* cv. *Aurosae*)—水栀子(*Gardenia jasminoides* var. *radicans*)+白蝴蝶+蛇根草(*Ophiorrhiza mungos*)
- 7、秋枫+深山含笑+乐昌含笑—金脉爵床+红纸扇+白英丹(*Ixora henryi*)—大叶油草+砂仁(*Amomum villosum*)+大叶仙茅(*Curculigo capitulata*)
- 8、长芒杜英+乐东拟单性木兰+酸豆树—黄槿+山茶花+东兴油茶—朱顶红(*Hippeastrum vittatum*)+地毯草
- 9、楹树+蓝花楹+银桦—紫蝉+希茉莉+粉纸扇(*Mussaenda hybrida* cv. *Alicia*)—吊竹梅+柊叶+红蕉(*Musa uranoscopus*)

1.4.8 IX区代表城市兰州

常绿乔木及小乔木: 青海云杉(7)、鳞皮云杉(*Picea retroflexa*)、紫果云杉(*Picea abies*)、鳞皮冷杉(*Abies squamata*)、青杆(8)、油松(14)、杜松(59)、西安桧(40)、白皮松(25)、华山松(26)、祁连圆柏(*Sabina przewalskii*)、大果圆柏(*Sabina tibetica*)、塔枝圆柏(*Sabina komarovii*)、侧柏(35)

落叶乔木及小乔木: 箭杆杨(295)、钻天杨(297)、小叶杨(294)、青甘杨(*Populus przewalskii*)、康定杨(*Populus kangdingensis*)、银白杨(291)、新疆杨(292)、青杨(299)、山杨(303)、康定柳(*Salix paraplesia*)、旱柳(305)、小叶朴(334)、黑榆(*Ulmus davidiana*)、春榆(330)、欧洲白榆(329)、榆(326)、红桦(*Betula albo-sinensis*)、坚桦(*Betula chinensis*)、白桦(321)、辽东栎(284)、栎树(425)、核桃(279)、青榨槭(356)、马氏槭(*Acer maximowiczii*)、刺槐(392)、国槐(396)、白蜡(555)、山荆子(457)、山杏(*Prunus sibirica*)、海棠果(460)、沙枣(534)、火炬树(349)、臭椿(411)、白蜡(555)、暴马丁香(571)、文冠果(428)、山桃稠李(472)、花红(458)、甘肃山楂(454)

常绿灌木: 沙地柏(46)、高山柏(*Sabina squamata*)、方枝柏(*Sabina saltuaria*)、陕甘瑞香(*Daphne tangutica*)、凹叶瑞香(*D. retusa*)、毛蕊杜鹃(*Rhododendron websterianum*)、头花杜鹃(*R. capitatum*)、百里香杜鹃(*R. thymifolium*)、秀雅杜鹃(*R. araiophyllum*)、烈香杜鹃(*R. anthopogonoides*)、红背杜鹃(*R. daphniflorum*)

落叶灌木: 香荚蒾(613)、陕甘花楸(*Sorbus koehneana*)、多腺悬钩子(*Rubus phoenicolasia*)、水栒子(453)、西北栒子(*Cotoneaster*

zabelii)、匍匐栒子(*C. adpressus*)、金露梅(456)、银露梅(*Potentilla glabra*)、珍珠梅(493)、黄刺玫(495)、黄蔷薇(*Rosa hugonis*)、峨眉蔷薇(*R. omeiensis*)、榆叶梅(486)、东陵绣球(436)、毛樱桃(470)、假稠李(*Maddenia hypoleuca*)、蒙古绣线菊(*Spiraea mongolica*)、细枝绣线菊(*S. myrtilloides*)、高山绣线菊(*S. alpina*)、欧李(*Prunus humilis*)、鸡麻(492)、接骨木(608)、藏花忍冬(601)、鞑靼忍冬(600)、紫枝忍冬(598)、黄花忍冬(596)、小叶忍冬(*Lonicera microphylla*)、陇塞忍冬(*L. tangutica*)、锦带花(602)、红瑞木(535)、金银木(597)、紫丁香(568)、波斯丁香(572)、羽叶丁香(573)、毛叶丁香(574)、连翘(553)、雪柳(552)、牡丹(430)、荆条(590)、猬实(615)、宁夏枸杞(*Lycium barbarum*)、直穗小檗(*Berberis dasystachya*)、毛叶小檗(*B. mitifolia*)、匙叶小檗(*B. verna*)、栓翅卫矛(*Euonymus alatus*)、紫花卫矛(*E. porphyreus*)、沙棘(532)、黄栌(347)、盐肤木(348)、刺五加(541)、扁核木(*Prinsepia utilis*)、宝兴茶藨子(*Ribes moupinense*)、五裂茶藨子(*R. meyeri*)、香茶藨子(435)、紫穗槐(384)、树锦鸡儿(386)、多花胡枝子(391)、百里香(*Thymus mongolicus*)、太平花(439)、山梅花(438)、花椒(377)、怪柳(522)、长穗怪柳(*Tamarix elongata*)、互叶醉鱼草(*Buddleja alternifolia*)

藤本植物: 葡萄(696)、猕猴桃(702)、山荞麦(*Polygonum auberti*)、杠柳(692)、啤酒花(*Humulus lupulus*)、天木蓼(704)、何首乌(*Polygonum multiflorum*)、甘肃铁线莲(*Clematis tangutica*)、绣球藤(*Clematis montana*)、藤山柳(*Clematoclethra lasioclada*)

草坪及地被植物: 野牛草(103)、结缕草(106)、草地早熟禾(105)、早熟禾(*Poa annua*)、林地早熟禾(*P. nemoralis*)、加拿大早熟禾(*P. compressa*)、羊茅(109)、紫羊茅(*Festuca rubra*)、苇状羊茅(*F. elata*)、匍茎剪股颖(101)、小糠草(*Agrostis alba*)、白颖苔草(108)、糙缘苔草(*Carex scabrirostris*)、异穗苔草(*Carex heterostachya*)、费菜(*Sedum aizoon*)、狭穗景天(*Sedum angustum*)、马蔺(*Iris ensata*)、狼毒(*Wikstroemia dolichantha*)、东方草莓(*Fragaria orientalis*)、歪头菜(*Vicia unijuga*)、金色补血草(*Limonium aureum*)、白射干(*Iris dichatoma*)

植物群落示例:

- 1、银白杨+大果圆柏—连翘+接骨木—二月兰+草地早熟禾
- 2、旱柳+油松—紫丁香+羽叶丁香+波斯丁香—马蔺+加拿大早熟禾
- 3、青海云杉+祁连圆柏+新疆杨—蒙古绣线菊+红瑞木+红花忍冬+金花忍冬—东方草莓+紫羊茅

1.4.9 X区代表城市乌鲁木齐

常绿乔木及小乔木: 樟子松(13)、西伯利亚云杉(*Picea obovata*)、雪岭云杉(*Picea schrenkiana*)、西伯利亚刺柏(*Juniperus sibirica*)

落叶乔木及小乔木: 胡杨(301)、钻天杨(297)、箭杆杨(295)、新疆杨(292)、黑杨(*Populus nigra*)、灰杨(*P. pruinosa*)、银白杨(291)、青杨(299)、白柳(310)、旱柳(305)、榆树(326)、圆冠榆(328)、欧洲大叶榆(329)、春榆(330)、黄檗(375)、桑(418)、文冠果(428)、水曲柳(558)、美白蜡(*Fraxinus Americana* var. *juglandifolia*)、小叶白蜡(*F. sogdiana*)、夏橡(*Quercus robur*)、三刺皂荚(399)、刺槐(392)、国槐(396)、紫椴(514)、心叶椴(518)、茶条槭(350)、复叶槭(355)、五角枫(358)、平基槭(352)、沙枣(534)、山荆子(457)、暴马丁香(571)、西洋梨(*Pyrus communis*)、新疆梨(*P. sinkiangensis*)、新疆野苹果(*Malus sieversii*)、海棠果(460)、山楂(455)、新疆桃(*Prunus persica* ssp. *ferganensis*)、巴旦杏(*Prunus dulcis*)、毛稠李(*Prunus padus* var. *pubescens*)、天山花楸(*Sorbus tianschanica*)

常绿灌木: 沙地柏(46)、高山桧(*Sabina squamata*)、新疆方枝柏(*Sabina pseudosabina*)、沙冬青(*Ammopiptanthus mongolicus*)

落叶灌木: 鞑靼忍冬(600)、金银木(597)、细叶小檗(412)、刺檗(*Berberis vulgaris*)、西伯利亚小檗(*Berberis sibirica*)、紫丁香(568)、珍珠梅(493)、榆叶梅(486)、欧亚绣线菊(*Spiraea media*)、山梅花(438)、太平花(439)、连翘(553)、沙棘(532)、胡枝子(390)、金雀儿(387)、新疆锦鸡儿(*Caragana turkestanica*)、金露梅(456)、毛叶欧李(*Prunus dictyoneura*)、多花栒子(453)、大果栒子(*Cotoneaster multiflorus* var. *calocarpus*)、玫瑰(502)、新疆蔷薇(*Rosa albertii*)、黄蔷薇(*R. hugonis*)、罗布麻(*Rauwolfia verticillata*)、黄刺玫(495)、怪柳(522)、细穗怪柳(*Tamarix leptostachys*)、密花怪柳(*T. arcenthoides*)、长穗怪柳(*T. elongata*)、多花怪柳(*T. hohenackeri*)、球花水枝柏(*Myricaria laxa*)、秀丽水枝柏(*M. elegans*)

藤本植物: 猕猴桃(702)、啤酒花(*Humulus lupulus*)、南蛇藤(683)、东方铁线莲(*Clematis orientalis*)、准噶尔铁线莲(*C. songarica*)

草坪及地被植物: 草地早熟禾(105)、林地早熟禾(*Poa nemoralis*)、加拿大早熟禾(*Poa compressa*)、细叶早熟禾(*Poa angustifolia*)、无芒雀麦(*Bromus inermis*)、紫羊茅(*Festuca rubra*)、羊茅(109)、苇状羊茅(*Festuca elata*)、匍茎剪股颖(101)、白颖苔草(108)、异穗苔草(*Carex heterostachya*)、新疆百脉根(*Lotus frondosus*)、细叶百脉根(*Lotus tenuis*)、紫花苜蓿(*Medicago sativa*)、白三叶(99)、红花三叶草(*Trifolium pratense*)、黄芩(*Scutellaria baicalensis*)、广布野豌豆(*Vicia cracca*)、草原老鹳草(*Geranium pratense*)、石竹(*Dianthus chinensis*)、瞿麦(*D. superbus*)、番红花(*Crocus sativus*)、小鸢尾(*Iris pseudorossii*)、马蔺(*Iris ensata*)

植物群落示例:

- 1、新疆杨+圆冠榆—山梅花+沙地柏+鞑靼忍冬—草地早熟禾
- 2、白柳+雪岭云杉—新疆圆柏+欧亚绣线菊+珍珠梅—草原老鹳草
- 3、西伯利亚红松+旱柳—新疆方枝柏+山梅花+连翘—白三叶
- 4、西伯利亚云杉+银白杨—高山桧+小檗+胡枝子—红三叶
- 5、西伯利亚刺柏+核桃—球花水枝柏+天山花楸—马蔺
- 6、沙枣+樟子松+尖叶槭—红花茶藨子+紫丁香+多花栒子—林地早熟禾

2 常用木本园林植物性状检索

2. 1 生态性状

2. 1. 1 耐阴树种

苏铁(1)、五针松(24)、华山松(26)、红松(15)、青杆(8)、白杆(9)、青海云杉(7)、云杉(10)、红皮云杉(11)、辽东冷杉(4)、臭冷杉(5)、日本冷杉(6)、柳杉(31)、杉木(32)、日本金松(33)、日本花柏(34)、日本扁柏(54)、云片柏(55)、凤尾柏(57)、刺柏(58)、香柏(48)、红豆杉(64)、粗榧(70)、香榧(65)、罗汉松(67)、小叶罗汉松(68)、竹柏(66)、天女花(270)、广玉兰(89)、夜合花(88)、鹅耳枥(315)、千斤榆(316)、青冈栎(95)、青檀(323)、珊瑚朴(333)、朴树(331)、小叶朴(334)、榉树(336)、八角(339)、米仔兰(99)、北五味子(673)、南五味子(674)、黄连木(346)、茶条槭(350)、元宝枫(352)、假色槭(353)、五角枫(358)、黄栌(347)、青榨槭(356)、三角枫(357)、金钱槭(364)、三峡槭(363)、杨梅(96)、凹叶厚朴(277)、美国凌霄(671)、凌霄(672)、紫藤(677)、常春油麻藤(679)、海南红豆(109)、楹树(380)、香茶藨子(435)、山楂(455)、毛樱桃(470)、山桃稠李(472)、稠李(473)、珍珠梅(493)、麻叶绣球(445)、菱叶绣线菊(448)、石楠(130)、棣棠(504)、枇杷(134)、石斑木(131)、水榆花楸(503)、丝棉木(507)、南蛇藤(683)、爬行卫矛(684)、胶东卫矛(685)、扶芳藤(686)、大叶黄杨(135)、鼠李(509)、雀梅藤(512)、三叶木通(691)、木通(690)、紫椴(514)、蒙椴(515)、糠椴(516)、欧洲大叶椴(517)、南京椴(519)、香樟(138)、红楠(146)、大叶楠(147)、木姜子(520)、紫楠(143)、香叶树(148)、马蹄荷(152)、交让木(164)、胡颓子(166)、山茶花(174)、茶梅

(175)、木荷(181)、茶(177)、云南山茶(178)、枸骨(169)、铁冬青(170)、冬青(171)、苦丁茶(172)、龟甲冬青(173)、朝鲜黄杨(154)、小叶黄杨(153)、华南黄杨(155)、红瑞木(535)、四照花(539)、刺楸(543)、紫丁香(568)、红丁香(579)、四川丁香(576)、关东丁香(577)、欧丁香(578)、云南黄馨(561)、水蜡(584)、茉莉(183)、四季桂(185)、丹桂(188)、刺桂(189)、女贞(190)、小蜡(583)、橄榄(194)、枸杞(587)、紫珠(588)、海州常山(589)、糯米条(593)、大花六道木(594)、金银花(698)、美丽忍冬(595)、黄花忍冬(596)、金银木(597)、紫枝忍冬(598)、长白忍冬(599)、桃色忍冬(600)、藏花忍冬(601)、台尔曼忍冬(700)、盘叶忍冬(697)、天目琼花(611)、木本绣球(610)、珊瑚树(198)、杜英(201)、木芙蓉(625)、金丝桃(627)、瑞香(204)、结香(629)、铁线莲(680)、小檗(413)、南天竹(119)、黄花夜香树(192)、二色茉莉(193)、假连翘(195)、棘桐(592)、大花紫薇(617)、紫薇(616)、薜荔(682)、无花果(422)、牡丹(430)、大花溲疏(433)、溲疏(434)、太平花(439)、东陵八仙花(436)、圆锥绣球(437)、山梅花(438)、白鹃梅(440)、接骨木(608)、香荚蒾(613)、荚蒾(612)、早锦带花(606)、白锦带花(605)、蝴蝶树(614)、猕猴桃(701)、猕猴桃梨(702)、天木蓼(704)、五叶地锦(695)、海桐(149)、鹅掌柴(216)、锦绣杜鹃(635)、

耐阴树种		图集号	03J012-2
审核	设计	页	22

杜鹃(634)、满山红(636)、比利时杜鹃(217)、石岩杜鹃(637)、黄花夹竹桃(Thevetia peruviana)、鸡蛋花(639)、长春蔓(710)、栀子花(225)、棕榈(239)、蒲葵(240)、短穗鱼尾葵(246)、美丽针葵(250)、散尾葵(253)、袖珍椰子(254)、矮棕竹(255)、观音竹(256)、酒瓶椰子(259)、红刺露兜树(262)、榄仁(641)、金脉爵床(228)、驳骨丹(229)、龟背竹(714)、使君子(711)、箬竹(642)、孝顺竹(643)、凤尾竹(644)、花孝顺竹(645)、菲白竹(665)

2. 1. 2 阴性树种

偃松(20)、东北红豆杉(61)、矮紫杉(62)、三尖杉(69)、含笑(83)、中国地锦(694)、洒金东瀛珊瑚(168)、阔叶十大功劳(117)、十大功劳(118)、红背桂(161)、中华常春藤(705)、常春藤(707)、八角金盘(215)、鹅掌藤(706)、紫金牛(Ardisia japonica)、朱砂根(Ardisia crenata)、络石(709)、六月雪(226)、春羽(715)、麒麟尾(713)、心叶蔓绿绒(716)、矮棕竹(255)、筋头竹(256)、三药槟榔(242)

2. 1. 3 抗旱树种

雪松(30)、黑松(16)、马尾松(27)、赤松(18)、樟子松(13)、油松(14)、乔松(22)、白皮松(25)、云杉(10)、红皮云杉(11)、侧柏(35)、圆柏(37)、千头柏(36)、丹东桧(41)、偃柏(38)、沙地柏(46)、柏木(51)、龙柏(42)、杜松(59)、天山圆柏(60)、广玉兰(89)、山玉兰(87)、核桃(279)、麻栎(282)、白栎(Quercus fabri)、小叶栎(285)、栓皮栎(283)、辽东栎(284)、石栎(90)、板栗(288)、榲桲(286)、榲桲(287)、青冈栎(95)、苦槠(91)、榔榆(325)、银白杨(291)、新疆杨(292)、响叶杨(289)、毛白杨(290)、滇杨(302)、小叶杨(294)、箭杆杨(295)、河北杨(296)、钻天杨(297)、青杨(299)、

小青杨(300)、胡杨(301)、山杨(303)、垂柳(304)、旱柳(305)、龙爪柳(306)、馒头柳(307)、绦柳(308)、杞柳(311)、桤木(318)、青檀(323)、大果榆(324)、榔榆(325)、榆树(326)、圆冠榆(328)、垂枝榆(327)、榉树(336)、楝树(343)、珊瑚朴(333)、小叶朴(336)、朴树(331)、南酸枣(345)、乌桕(526)、黄连木(346)、盐肤木(348)、黄栌(347)、火炬树(349)、楸叶泡桐(366)、楸树(372)、枸桔(378)、刺桐(383)、南洋楹(112)、台湾相思(111)、合欢(379)、云实(675)、紫檀(382)、紫穗槐(384)、锦鸡儿(385)、树锦鸡儿(386)、金雀锦鸡儿(387)、小叶锦鸡儿(388)、胡枝子(390)、多花胡枝子(391)、刺槐(392)、皂荚(400)、山皂荚(401)、紫荆(402)、江南槐(395)、常春油麻藤(679)、紫藤(677)、红花羊蹄甲(403)、羊蹄甲(404)、黄槐(408)、铁刀木(114)、臭椿(411)、南天竹(119)、小檗(413)、细叶小檗(412)、山胡椒(Lindera glauca)、狭叶山胡椒(Lindera angustifolia)、香叶树(148)、构树(416)、柘树(417)、鸡桑(420)、蒙桑(421)、桑(418)、无花果(422)、辟荔(682)、高山榕(122)、栾树(425)、复羽叶栾树(426)、全缘栾树(427)、文冠果(428)、樟树(138)、漫陀(434)、山梅花(438)、碧桃(478)、山桃(485)、白鹃梅(440)、珍珠绣球(443)、金焰绣线菊(446)、火棘(132)、多花栒子(453)、甘肃山楂(454)、山楂(455)、金露梅(456)、山荆子(457)、海棠果(460)、海棠花(461)、西府海棠(462)、杏(465)、李(474)、

阴性树种、抗旱树种		图集号	03J012-2
审核	设计	页	23

郁李(469)、毛樱桃(470)、石楠(130)、榆叶梅(486)、沙梨(490)、杜梨(491)、黄刺玫(495)、梅(487)、垂枝梅(488)、白玉棠(501)、玫瑰(502)、石斑木(131)、多花蔷薇(688)、十姐妹(689)、腊梅(506)、月桂(145)、木姜子(520)、香叶树(148)、桤柳(522)、枫香(523)、檵木(150)、红桑(158)、石栗(163)、胡颓子(166)、沙枣(534)、红瑞木(535)、车梁木(*Cornus walteri*)、偃伏栎木(538)、山茱萸(540)、铁冬青(170)、柿(545)、君迁子(549)、连翘(553)、绒毛白蜡(556)、什锦丁香(562)、西蜀丁香(565)、小叶丁香(566)、蓝丁香(567)、紫丁香(568)、北京丁香(570)、暴马丁香(571)、波斯丁香(572)、羽叶丁香(573)、毛丁香(574)、垂丝丁香(575)、四川丁香(576)、关东丁香(577)、欧丁香(578)、红丁香(579)、梔子花(225)、杠柳(692)、油橄榄(191)、橄榄(194)、大叶醉鱼草(585)、海州常山(589)、荆条(590)、五色梅(196)、棘桐(592)、糯米条(593)、大花六道木(594)、黄花忍冬(596)、金银木(597)、长白忍冬(599)、桃色忍冬(600)、锦带花(602)、花叶锦带花(603)、白锦带花(605)、美丽锦带花(607)、香荚蒾(613)、猬实(615)、紫薇(616)、大花紫薇(617)、黄薇(619)、木棉(620)、灯笼花(202)、木芙蓉(625)、芫花(630)、金丝桃(627)、蓝果树(631)、赤桉(209)、驳骨丹(229)、红苞花(230)、木麻黄(234)、毛竹(658)、棕榈(239)

2. 1. 4 耐水湿树种

湿地松(28)、柏木(51)、落叶松(71)、水杉(73)、水松(74)、池杉(76)、落羽杉(77)、榕树(120)、金叶榕(121)、垂叶榕(124)、胡颓子(166)、茶梅(175)、红苞花(230)、麻栎(282)、枫杨(280)、薄壳山核桃(281)、钻天杨(297)、滇杨(302)、垂柳(304)、旱柳(305)、馒头柳(307)、绦柳(308)、河柳(309)、龙爪柳(306)、白

柳(310)、杞柳(311)、榔榆(325)、榉树(336)、桑(418)、柘(417)、赤杨(319)、毛赤杨(320)、桤木(318)、白桦(321)、紫穗槐(384)、海棠果(460)、西府海棠(462)、湖北海棠(463)、郁李(469)、白梨(489)、沙梨(489)、杜梨(491)、丝棉木(507)、乌桕(526)、重阳木(528)、桤柳(522)、红瑞木(535)、白蜡(555)、绒毛白蜡(556)、洋白蜡(557)、水曲柳(558)、海州常山(589)、棘桐(592)、结香(629)、鸡蛋花(639)、多花蔷薇(688)、十姐妹(689)、棕榈(239)、梔子(225)、枫香(523)、悬铃木(431)、紫藤(677)、楝树(341)、柿(545)、葡萄(696)、凌霄(672)、夹竹桃(219)、雪柳(552)、山胡椒(*Lindera glauca*)、狭叶山胡椒(*Lindera angustifolia*)

2. 1. 5 耐盐碱树种

黑松(16)、侧柏(35)、木麻黄(234)、桤柳(522)、新疆杨(292)、箭杆杨(295)、钻天杨(297)、胡杨(301)、小叶杨(294)、桑(418)、杞柳(311)、白柳(310)、蒙古柳(312)、旱柳(305)、枸杞(587)、楝树(343)、大果榆(324)、榆树(326)、朴树(331)、火炬树(349)、毛泡桐(367)、臭椿(411)、刺槐(392)、紫穗槐(384)、皂荚(400)、国槐(396)、绒毛白蜡(556)、桂香柳(534)、杜梨(491)、合欢(379)、枣(510)、杏(465)、君迁子(549)、金焰绣线菊(446)、金山绣线菊(447)、花红(458)、海棠果(460)、西府海棠(462)、椰子(248)、水椰(*Nypa fruticans*)

抗旱、耐水湿、耐盐碱树种		图集号	03J012-2
审核	设计	页	24

2. 1. 6 抗污染树种

2. 1. 6. 1 抗 SO₂ 树种

黑松(16)、白皮松(25)、铺地柏(45)、桧柏(37)、日本扁柏(54)、日本花柏(34)、龙柏(42)、杜松(59)、侧柏(35)、辽东冷杉(4)、柳杉(31)、竹柏(66)、水杉(73)、罗汉松(67)、紫杉(61)、毛白杨(290)、绦柳(308)、旱柳(305)、垂柳(304)、馒头柳(307)、龙爪柳(306)、银杏(266)、核桃(279)、榆树(326)、大果榆(324)、榉树(336)、刺槐(392)、国槐(396)、龙爪槐(397)、臭椿(411)、白蜡(555)、小叶白蜡(*Fraxinus bungeana*)、茶条槭(350)、大叶朴(332)、枫杨(280)、香樟(138)、黄槿(375)、紫椴(514)、锦带花(602)、金银木(597)、榆叶梅(486)、稠李(473)、苹果(464)、沙枣(534)、胡颓子(166)、紫丁香(568)、连翘(553)、牡丹(430)、皂荚(400)、构树(416)、泡桐(365)、柿树(545)、君迁子(549)、山茱萸(540)、紫穗槐(384)、合欢(379)、紫藤(677)、花椒(377)、锦熟黄杨(*Buxus sempervirens*)、雀舌黄杨(*Buxus bodinieri*)、大叶黄杨(135)、金边黄杨(137)、雪柳(552)、杠柳(692)、接骨木(608)、欧洲绣球(*Viburnum opulus*)、海仙花(609)、金银花(698)、凌霄(672)、山茶花(174)、油茶(179)、桂花(184)、法国梧桐(*Platanus orientalis*)、木芙蓉(625)、络石(709)、棕榈(239)、丝棉木(507)、卫矛(*Euonymus alatus*)、珊瑚树(197)、石楠(130)、枸桔(378)、金桔(107)、柚子(103)、枸骨(169)、麻栎(282)、白栎(*Quercus fabri*)、厚皮香(182)、青冈栎(95)、蒙古栎(*Quercus mongolica*)、板栗(288)、紫楠(143)、苦楝(343)、榔榆(325)、海

桐(149)、广玉兰(89)、白玉兰(272)、山玉兰(87)、七叶树(623)、木瓜(451)、垂丝海棠(459)、紫叶李(466)、倭海棠(*Chaenomeles japonica*)、月桂(145)、长山核桃(281)、硕苞蔷薇(*Rosa bracteata*)、腊梅(506)、山荆子(457)、郁李(469)、枫香(523)、杨梅(96)、鸡爪槭(359)、羽毛枫(360)、樱花(476)、瑞香(204)、榕树(120)、薜荔(682)、印度橡胶榕(123)、高山榕(122)、花叶榕(*Ficus microcapa* cv. Milky)、菩提树(125)、桑(418)、莢蒾(612)、黄连木(346)、枣树(510)、洒金东瀛珊瑚(168)、木麻黄(234)、麻楝(342)、苦楝(343)、芒果(102)、黄花夹竹桃(*Thevetia peruviana*)、夹竹桃(219)、驳骨丹(229)、含笑(83)、天竺桂(140)、叶子花(712)、蒲桃(211)、榄仁(641)、鸡蛋花(639)、木槿(626)、黄槿(203)、石栗(163)、红背桂(161)、蝴蝶果(162)、孔雀豆(*Adenanthera pavonina* var. *microsperma*)、海南红豆(109)、九里香(106)、米仔兰(99)、大叶桃花心木(98)、樟叶槭(*Acer cinnamomifolium*)、扁桃(101)、人心果(233)、盆架木(222)、栾树(425)、女贞(190)、梧桐(531)、香樟(138)、泡桐(365)、油橄榄(191)、石榴(410)、假槟榔(241)、散尾葵(253)、棕榈(239)、青皮竹(646)、慈竹(667)、毛竹(658)

抗污染树种 1			图集号	03J012-2
审核	设计	校对	页	25

2. 1. 6. 2 抗 HF 树种

白皮松(25)、樟子松(13)、桧柏(37)、龙柏(42)、侧柏(35)、黑松(16)、竹柏(66)、银杏(266)、龙爪柳(306)、垂柳(304)、旱柳(305)、小青杨(300)、河北杨(296)、箭杆杨(295)、小叶杨(294)、国槐(396)、刺槐(392)、构树(416)、臭椿(411)、泡桐(365)、紫薇(616)、紫穗槐(384)、接骨木(608)、欧洲绣球(Viburnum opulus)、丝棉木(507)、大叶黄杨(135)、锦熟黄杨(Buxus sempervirens)、金银花(698)、李(474)、刺玫果(Rosa davurica)、梨树(489)、杜仲(432)、女贞(190)、北京丁香(570)、栾树(425)、核桃(279)、糖槭(355)、五角枫(358)、白蜡(555)、枣树(510)、沙枣(534)、柑桔类(Citrus)、悬铃木(431)、青冈栎(95)、麻栎(282)、榉栎(287)、蚊母(151)、棕榈(239)、蒲葵(240)、石楠(130)、梧桐(531)、火力楠(81)、紫楠(143)、板栗(288)、丝兰(264)、广玉兰(89)、栀子(226)、天竺桂(140)、海桐(149)、无花果(422)、印度橡胶榕(123)、桑(418)、小叶榕(120)、夹竹桃(219)、鸡蛋花(639)、扶桑(201)、蒲桃(211)、米仔兰(99)、九里香(106)、柚(103)、山茶(174)、重阳木(528)、朴树(329)、珊瑚树(198)、苦楝(341)、香樟(138)、灯台树(536)、榆树(324)、枇杷(134)、石榴(410)、乌桕(526)、油橄榄(191)、花椒(377)

2. 1. 6. 3 抗 Cl₂ 树种

白皮松(25)、桧柏(37)、侧柏(35)、黑松(16)、樟子松(13)、红松(15)、千头柏(36)、龙柏(42)、水杉(73)、罗汉松(67)、银杏(266)、海桐(149)、怪柳(522)、杜仲(432)、夹竹桃(219)、石榴(410)、毛白杨(290)、小青杨(300)、旱柳(305)、垂柳(304)、刺槐(392)、

皂荚(400)、合欢(379)、紫藤(677)、海南红豆(109)、紫穗槐(384)、臭椿(411)、广玉兰(89)、榉树(334)、枣树(510)、鼠李(474)、枫杨(280)、核桃(279)、锦熟黄杨(Buxus sempervirens)、黄杨(156)、假槟榔(241)、蒲葵(240)、棕榈(239)、大叶黄杨(135)、木麻黄(234)、梧桐(531)、悬铃木(431)、泡桐(365)、欧洲绣球(Viburnum opulus)、荚蒾(612)、珊瑚树(197)、卫矛(Euonymus alatus)、白桦(321)、九里香(106)、米仔兰(99)、驳骨丹(229)、桂花(184)、柚(103)、柑桔(104)、茶条槭(350)、樟叶槭(Acer cinnamomifolium)、银桦(199)、石栗(163)、女贞(190)、小叶女贞(582)、白蜡(555)、香樟(138)、肉桂(141)、阴香(142)、蝴蝶果(162)、苦楝(343)、栀子花(225)、构树(416)、印度橡胶榕(123)、高山榕(122)、细叶榕(121)、无患子(424)、重阳木(528)、梓树(371)、木槿(626)、蒲桃(211)、芒果(102)、扁桃(101)、黄槿(203)、油茶(179)、山茶(174)

2. 1. 6. 4 滞尘力强的树种

桧柏(37)、龙柏(42)、毛白杨(290)、银杏(266)、刺楸(543)、刺槐(392)、国槐(396)、臭椿(411)、腊梅(506)、构树(416)、重阳木(528)、元宝枫(352)、榆树(331)、朴树(329)、悬铃木(431)、泡桐(365)、榉树(336)、广玉兰(89)、梧桐(531)、木槿(626)、丁香(568)、紫薇(616)、锦带花(602)、天目琼花(611)

抗污染树种 2

图集号

03J012-2

审核

设计

页

26

2. 2 观赏特性

2. 2. 1 观叶类

2. 2. 1. 1 彩叶植物

日本花柏(34)、金黄球柏(*Platycladus orientalis* cv. *Semperaurescens*)、金塔柏(*P. orientalis* cv. *Beverleyensis*)、金孔雀柏(*Chamaecyparis obtuse* cv. *Tetragona*)、金边云片柏(*C. obtuse* cv. *Breviramea*)、金叶桧(*Sabina chinensis* cv. *Aurea*)、金星球桧(*S. chinensis* cv. *Aureoglobosa*)、紫叶李(466)、紫叶桃(483)、红叶石楠(*Photinia glabra* f. *red robin*)、紫叶矮樱(*Prunus serrulata* f. *atropurpurea* Nana)、紫叶小檗(414)、金叶小檗(*Berberis thunbergii* cv. *Aurea*)、紫叶黄栌(*Cotinus coggygria* var. *purpureus*)、红桑(159)、红枫(360)、红羽毛枫(359)、红花檵木(*Loropetalum chinense* var. *rubrum*)、金叶女贞(581)、金山绣线菊(447)、金焰绣线菊(446)、金心大叶黄杨(136)、银边大叶黄杨(*Euonymus japonicus* cv. *Albo-marginatus*)、金边大叶黄杨(137)、金叶洋槐(*Robinia pseudoacacia* cv. *Aurea*)、金叶三刺皂荚(*Gleditsia triacanthos* cv. *Aurea*)、金脉爵床(228)、金叶连翘(*Forsythia × intermedia* cv. *Aurea*)、金脉连翘(*Forsythia × intermedia*)、金叶接骨木(*Sambucus nigra* cv. *Aurea*)、金叶山梅花(*Philadelphus coronaries* cv. *Aurea*)、变叶木(159)、洒金桃叶珊瑚(168)、金叶红瑞木(*Cornus alba* cv. *Aurea*)、花叶红瑞木(*C. alba* cv. *Elegantissima*)、金叶榕(122)、金叶假连翘(*Duranta repens* cv. *Dwarf Yellow*)、花叶锦带花(*Weigela florida* cv. *Variegata*)、花叶长春蔓(*Vinca major* cv. *Variegata*)、狗枣猕猴桃(703)、肖黄栌(157)

2. 2. 1. 2 双色叶植物

银白杨(291)、胡颓子(166)、秋胡颓子(533)、栓皮栎(283)、油

橄榄(191)、杞柳(309)、红背桂(161)、银桦(199)

2. 2. 1. 3 香叶植物

阴香(142)、香樟(138)、柠檬桉(208)、松柏类、柑桔类(*Citrus* spp.)、香叶树(148)、蒜香藤(670)、木本香薷(368)、臭檀(376)、百里香(*Thymus mongolicus*)

2. 2. 1. 4 秋色叶植物

水杉(73)、落羽杉(77)、池杉(76)、落叶松(71、72)、金钱松(75)、鸡爪槭(359)、元宝枫(352)、五角枫(358)、茶条槭(350)、枫香(523)、中国地锦(694)、五叶地锦(695)、复叶槭(355)、拧筋槭(351)、日本槭(354)、青榨槭(356)、三角枫(357)、小檗(413)、樱花(476)、石楠(130)、山楂(455)、稠李(473)、珍珠花(442)、水榆花楸(503)、花楸(*Sorbus pohuashanensis*)、漆树(*Rhus verniciflua*)、盐肤木(348)、火炬树(349)、黄栌(347)、黄连木(346)、蒙楸(515)、柿(545)、臭檀(376)、南天竹(119)、金花小檗(415)、乌桕(526)、重阳木(528)、榭树(286)、麻栎(282)、栓皮栎(283)、榭栎(287)、爬行卫矛(684)、扶芳藤(686)、红瑞木(535)、山茱萸(540)、银杏(266)、连香树(505)、檫木(521)、山麻杆(527)、四照花(539)、金缕梅(524)、木荷(181)、白蜡(555)、大花紫薇(617)、鹅掌楸(267)、蓝果树(631)、榄仁(641)、胡杨(301)、旱柳(305)、梧桐(531)、榆树(326)、大果榆(324)、刺槐(392)、美国皂荚(399)、白桦(321)、无患子(424)、栎树(425)、紫荆(402)、悬铃木(431)、胡桃(279)、光叶桦(335)、石榴(410)、桑(418)

观叶木本植物		图集号	03J012-2
审核	设计	页	27

2. 2. 1. 5 春色叶植物

山杨(303)、河柳(309)、鹅耳枥(315)、臭椿(411)、连香树(505)、元宝枫(350)、蒙椴(515)、重阳木(528)、木荷(181)、栾树(425)、香樟(138)、桂花(184)、枇杷(134)、石栗(163)、石楠(130)、荔枝(129)

2. 2. 2 观花类

2. 2. 2. 1 春花类

2. 2. 2. 1. 1 白花系列

火力楠(81)、山玉兰(87)、深山含笑(82)、南洋楹(112)、石斑木(131)、火棘(132)、海桐(149)、茉莉(183)、瑞香(204)、蒲桃(211)、星花木兰(274)、鹅掌楸(267)、白玉兰(272)、二乔玉兰(273)、厚朴(275)、凹叶厚朴(277)、泡桐(365)、枸桔(378)、刺槐(384)、金凤花(406)、文冠果(428)、牡丹(430)、白鹃梅(440)、笑靥花(441)、珍珠花(442)、珍珠绣球(443)、麻叶绣线菊(445)、菱叶绣线菊(448)、甘肃山楂(454)、山楂(455)、山荆子(457)、海棠果(460)、山桃稠李(472)、郁李(469)、苹果(464)、稠李(473)、李(474)、东京樱花(475)、白碧桃(479)、白梨(489)、沙梨(490)、鸡麻(492)、月季(496)、杜梨(491)、刺楸(543)、瓶兰花(546)、乌柿(547)、老鸦柿(548)、白檀(550)、白丁香(569)、金银木(597)、锦带花(602)、香荚蒾(613)、蝴蝶树(614)、毛白杜鹃(638)、木香(687)

2. 2. 2. 1. 2 红花系列

火焰木(236)、红花檵木(150)、蚊母(151)、云南山茶(178)、珊瑚朴(333)、日本槭(354)、糖槭(355)、灰楸(370)、刺桐(383)、

红花洋槐(394)、紫荆(402)、红花羊蹄甲(403)、洋紫荆(405)、牡丹(430)、贴梗海棠(450)、花红(458)、垂丝海棠(459)、海棠花(461)、日本晚樱(471)、毛樱桃(470)、木瓜(451)、麦李(467)、杏(465)、湖北海棠(463)、西府海棠(462)、东京樱花(475)、樱花(476)、碧桃(478)、山桃(485)、榆叶梅(486)、品种月季(497)、丰花月季(“曼海姆宫殿”、“红帽子”)(498)、锦带花(602)、美丽锦带花(607)、早锦带花(606)、木棉(620)、吉贝(621)、杜鹃(634)、满山红(636)、石岩杜鹃(637)、锦绣杜鹃(635)、云锦杜鹃(219)、炮仗花(669)、蒜香藤(670)、叶子花(712)

2. 2. 2. 1. 3 黄花系列

鹅掌楸(267)、台湾相思(111)、含笑(83)、双荚决明(113)、阔叶十大功劳(117)、月桂(145)、扶桑(201)、金脉爵床(228)、拧筋槭(351)、元宝枫(352)、楹树(380)、锦鸡儿(385)、黄槐(408)、香茶藨子(435)、黄刺玫(495)、品种月季(“和平”)(497)、丰花月季(“金玛丽”)(498)、棣棠(504)、金缕梅(524)、蜡瓣花(525)、沙棘(532)、山茱萸(540)、刺五加(541)、连翘(553)、迎春(560)、云南黄馨(561)、结香(629)、叶子花(712)、报春刺玫(*Rosa primula*)、黄蔷薇(495)

2. 2. 2. 1. 4 蓝、紫花系列

二色茉莉(193)、紫玉兰(271)、毛泡桐(367)、紫花文冠果(429)、蓝丁香(567)、紫丁香(568)、关东丁香(577)、欧丁香(578)、芫花(630)、紫藤(677)、常春油麻藤(679)、木通(690)、叶子花(712)

2. 2. 2. 2 夏花类

2. 2. 2. 2. 1 白花系列

乐东拟单性木兰(79)、乐昌含笑(80)、白兰花(84)、木莲(86)、夜合花(88)、广玉兰(89)、柚(103)、柑桔(104)、橙(105)、九里香(106)、金桔(107)、南天竹(120)、石楠(130)、狭叶火棘(133)、第伦桃(108)、花榈木(110)、木荷(181)、茉莉(183)、女贞(190)、橄榄(194)、珊瑚树(197)、华南珊瑚树(198)、香桃木(206)、八角金盘(215)、梔子花(225)、六月雪(226)、凤尾兰(263)、丝兰(264)、天女花(270)、日本厚朴(276)、银薇(616)、楸树(372)、黄金树(371)、美国木豆树(369)、翅荚香槐(381)、国槐(396)、大花溲疏(433)、溲疏(434)、太平花(439)、山梅花(438)、多花栒子(453)、珍珠梅(493)、东北珍珠梅(494)、白玉棠(501)、水榆花楸(503)、灯台树(536)、车梁木(537)、偃伏楝木(538)、四照花(539)、流苏树(551)、雪柳(552)、大叶醉鱼草(585)、水蜡(584)、北京丁香(570)、暴马丁香(571)、羽叶丁香(573)、金叶女贞(581)、小蜡(583)、海州常山(589)、糯米条(593)、天目琼花(611)、木本绣球(610)、荚蒾(612)、东陵八仙花(436)、大花园锥绣球(437)、七叶树(623)、天师栗(624)、铁线莲(680)、多花蔷薇(688)、金银花(698)、络石(709)

2. 2. 2. 2. 2 红花系列

火焰木(236)、灯笼花(202)、扶桑(201)、红千层(212)、云锦杜鹃(218)、希茉莉(223)、龙船花(224)、红苞花(230)、合欢(379)、胡枝子(390)、江南槐(395)、凤凰木(407)、石榴(410)、粉花绣线菊(449)、金焰绣线菊(446)、金山绣线菊(447)、玫瑰(502)、什锦丁香(562)、西南丁香(563)、西蜀丁香(565)、小叶丁香(566)、多花蔷薇(688)、十姐妹(689)、贯叶忍冬(699)、台尔曼忍冬(700)、使君子(711)、美丽忍冬(595)、桃色忍冬(600)、海仙花(609)、猬实(615)、红薇(616)、大花紫薇(617)、木槿(626)、杜鹃(634)、美国凌霄(671)、凌霄(672)、垂丝海棠(459)、四川丁香(576)、红丁香(579)、大叶醉鱼草(585)、五色梅(196)、龙吐珠(591)、赅桐(592)、大花六道木(594)

2. 2. 2. 2. 3 黄花系列

米仔兰(99)、双荚决明(113)、十大功劳(118)、黄兰(85)、夜香树(192)、银桦(199)、小花黄蝉(221)、金脉爵床(228)、麻楝(342)、梓树(371)、黄钟花(238)、紫檀(382)、树锦鸡儿(386)、金雀锦鸡儿(387)、小叶锦鸡儿(388)、北京锦鸡儿(389)、小檗(413)、细叶小檗(412)、腊肠树(409)、黄槐(408)、金花小檗(415)、栾树(425)、复羽叶栾树(426)、全缘栾树(427)、金露梅(456)、糠椴(516)、秋胡颓子(533)、沙枣(534)、五色梅(196)、黄花忍冬(596)、黄薇(619)、金丝桃(627)、金丝梅(628)、云实(675)、转子莲(681)、盘叶忍冬(697)、黄槿(203)

夏花木本植物		图集号	03J012-2
审核	设计	页	29

2. 2. 2. 2. 4 蓝、紫花系列

东瀛珊瑚(167)、二色茉莉(193)、苦楝(343)、假色槭(353)、蓝花楹(374)、东陵八仙花(436)、匈牙利丁香(564)、波斯丁香(572)、毛丁香(574)、辽东丁香(580)、紫珠(588)、假连翘(195)、荆条(590)、紫薇(616)、鸡血藤(676)、多花紫藤(678)、三叶木通(691)、大叶醉鱼草(585)

2. 2. 2. 3 秋花类

2. 2. 2. 3. 1 白花系列

海南红豆(109)、茶(177)、茉莉(183)、刺桂(189)、八角金盘(215)、鹅掌柴(216)、圆锥绣球(437)、品种月季(“冰山”)(497)、糯米条(593)、木芙蓉(625)、木槿(626)

2. 2. 2. 3. 2 红花系列

火焰木(236)、丹桂(188)、灯笼花(202)、扶桑(201)、红千层(212)、希茉莉(223)、龙船花(224)、红苞花(230)、多花胡枝子(391)、红花羊蹄甲(403)、羊蹄甲(404)、月季(496)、龙吐珠(591)、赧桐(592)、木芙蓉(625)、木槿(626)、蒜香藤(670)、贯叶忍冬(699)、使君子(711)

2. 2. 2. 3. 3 黄花系列

双荚决明(113)、铁刀木(114)、桂花(184)、四季桂(185)、黄花夜香树(192)、扶桑(201)、小花黄蝉(221)、玉叶金花(227)、金脉

爵床(228)、黄钟花(238)、黄槐(408)、品种月季(497)、黄薇(619)、黄槿(203)

2. 2. 2. 3. 4 蓝、紫花系列

二色茉莉(193)、蓝花楹(374)、假连翘(195)、大叶醉鱼草(585)

2. 2. 2. 4 冬花类

2. 2. 2. 4. 1 白花系列

山茶花(174)、茶梅(175)、油茶(179)、鹅掌柴(216)、梅(487)

2. 2. 2. 4. 2 红花系列

火焰木(236)、山茶花(174)、茶梅(175)、云南山茶(178)、红花油茶(180)、红苞花(230)、梅(487)、美人树(622)、炮仗花(669)、叶子花(712)

2. 2. 2. 4. 3 黄花系列

双荚决明(113)、金花茶(176)、桂花(184)、黄槐(408)、腊梅(506)、叶子花(712)

2. 2. 2. 4. 4 蓝、紫花系列

假连翘(195)、叶子花(712)

秋花、冬花木本植物		图集号	03J012-2
审核	设计	页	30

2. 2. 3 观果类

2. 2. 3. 1 红果（含橙红、粉红色）系列

罗汉松(67)、小叶罗汉松(68)、木莲(86)、天女花(270)、山桐子(338)、南五味子(674)、北五味子(673)、金钱槭(364)、臭檀(376)、石榴(410)、珊瑚朴(333)、小檗(413)、紫叶小檗(414)、金花小檗(415)、南天竹(119)、构树(416)、垂叶榕(124)、栾树(425)、复羽叶栾树(426)、全缘栾树(427)、平枝栒子(452)、多花栒子(453)、甘肃山楂(454)、山楂(455)、山荆子(457)、毛樱桃(470)、麦李(467)、郁李(469)、石楠(130)、黄刺玫(495)、水榆花楸(503)、花楸(*Sorbus pohuashanensis*)、狭叶火棘(133)、丝棉木(507)、胶东卫矛(685)、香叶树(148)、假萍婆(*Sterculia lanceolata*)、胡颓子(166)、秋胡颓子(533)、东瀛珊瑚(167)、洒金珊瑚(168)、四照花(539)、山茱萸(540)、枸骨(169)、铁冬青(170)、冬青(171)、苦丁茶(172)、老鸦柿(548)、枸杞(587)、盘叶忍冬(697)、美丽忍冬(595)、黄花忍冬(596)、金银木(597)、紫枝忍冬(598)、长白忍冬(599)、贯叶忍冬(699)、桃色忍冬(600)、藏花忍冬(601)、天目琼花(611)、接骨木(608)、珊瑚树(197)、荚蒾(612)、香荚蒾(613)、蝴蝶树(614)、天木蓼(703)、中华常春藤(705)、常春藤(707)、紫金牛(*Ardisia japonica*)、朱砂根(*Ardisia crenata*)、福建茶(235)

2. 2. 3. 2 黑果（含紫黑、蓝黑色）系列

小叶朴(334)、阔叶十大功劳(117)、十大功劳(118)、香茶藨子(435)、山桃稠李(472)、稠李(473)、石斑木(131)、大血藤(693)、木通(690)、香樟(138)、木姜子(520)、檫木(521)、车梁木(537)、刺五加(541)、大果冬青(544)、龟甲冬青(173)、白檀(550)、流苏树(551)、女贞(190)、小叶女贞(582)、水蜡(584)、海州常山(589)、华南珊瑚树(198)、香桃木(206)

2. 2. 3. 3 黄果系列

苦楝(343)、木波罗(127)、贴梗海棠(450)、柑桔(104)、金桔(107)、银杏(266)、大叶朴(332)、山荆子(457)、花红(458)、海棠果(460)、海棠花(461)、湖北海棠(463)、木瓜(451)、杏(465)、沙梨(490)、枇杷(134)、南蛇藤(683)、阴香(142)、沙棘(532)、柿(545)、橄榄(194)、假连翘(195)、中华常春藤(705)、常春藤(707)、鹅掌柴(216)、瓶兰花(546)、乌柿(547)

2. 2. 3. 4 白果系列

乌桕(526)、红瑞木(535)、偃伏栎木(538)、珠兰(*Chloranthus erectus*)、雪果(*Symphoricarpos albus*)、陕甘花楸(*Sorbus koehneana*)、湖北花楸(*S. hupehensis*)、芫花(630)

2. 2. 3. 5 紫果系列

紫珠(588)

观果木本植物		图集号	03J012-2
审核	设计	页	31

2. 2. 4 香花类

乐东拟单性木兰(79)、星花木兰(274)、乐昌含笑(80)、火力楠(81)、白兰花(84)、黄兰(85)、山玉兰(87)、深山含笑(82)、含笑(83)、夜合花(88)、天女花(270)、白玉兰(272)、广玉兰(89)、厚朴(275)、日本厚朴(276)、凹叶厚朴(277)、北五味子(673)、南五味子(674)、苦楝(343)、米仔兰(99)、美国木豆树(369)、柑桔(104)、枸桔(378)、九里香(106)、金桔(107)、台湾相思(111)、合欢(379)、紫檀(382)、刺槐(392)、紫藤(677)、多花紫藤(678)、洋紫荆(405)、铁刀木(114)、贴梗海棠(450)、木瓜(451)、湖北海棠(463)、稠李(473)、香水月季(500)、白玉棠(501)、玫瑰(502)、腊梅(506)、多花蔷薇(688)、欧洲大叶槿(517)、心叶槿(518)、糠槿(516)、檫木(521)、阴香(142)、海桐(149)、金缕梅(524)、蜡瓣花(525)、胡颓子(166)、秋胡颓子(533)、沙枣(534)、大果冬青(544)、厚皮香(182)、瓶兰花(546)、水蜡(584)、什锦丁香(562)、匈牙利丁香(564)、紫丁香(568)、北京丁香(570)、暴马丁香(571)、毛丁香(574)、四川丁香(576)、欧丁香(578)、茉莉(183)、桂花(184)、刺桂(189)、小叶女贞(582)、油橄榄(191)、大叶醉鱼草(585)、夜香树(192)、二色茉莉(193)、橄榄(194)、荆条(590)、糯米条(593)、金银花(698)、华南珊瑚树(198)、香荚蒾(613)、天师栗(624)、猕猴桃(701)、深山天木蓼(703)、天木蓼(704)、瑞香(204)、结香(629)、香桃木(206)、白千层(213)、鹅掌柴(216)、锦绣杜鹃(635)、云锦杜鹃(218)、毛白杜鹃(638)、

朱砂根(*Ardisia crenata*)、鸡蛋花(639)、络石(709)、栀子花(225)、使君子(711)

2. 3 其他类型

2. 3. 1 招鸟类

矮紫杉(62)、罗汉松(67)、香榧(65)、龟甲冬青(173)、铁冬青(170)、香樟(138)、杨梅(96)、苦楝(343)、茶梅(175)、华南珊瑚树(198)、红楠(146)、平头赤松(19)、女贞(190)、日本女贞(*Ligustrum japonicum*)、刺桂(189)、厚皮香(182)、交让木(164)、梅(487)、山茱萸(540)、荚蒾(612)、日本辛夷(*Magnolia kobus*)、东京樱花(475)、郁李(469)、毛樱桃(470)、大山樱(*Prunus sargentii*)、平枝栒子(452)、多花栒子(453)、四照花(539)、桃叶珊瑚(167)、石斑木(131)、海桐(149)、十大功劳(118)、火棘(132)、黄杨(156)、八角金盘(215)、紫金牛(*Ardisia japonica*)、五桠果(108)、山楂(455)、卫矛(*Euonymus alatus*)、海棠果(460)、棕榈(239)、小檗(413)、红瑞木(535)

2. 3. 2 引蝶类

大叶醉鱼草(585)、黄连木(346)、其他香花类植物(如芸香科柑桔属植物)

2. 4 代表树种树型

香花和招鸟引蝶木本植物

图集号

03J012-2

审核

李冬梅

校对

李冬梅

设计

白伟凤


页

32

2.4.1常绿乔木树形特征

一、风致型

代表树种：老年油松(14)、樟子松(13)、马尾松(27)



二、塔状圆锥型

代表树种：雪松(30)、金钱松(75)




三、倒卵型

代表树种：白皮松(25)、深山含笑(82)、紫楠(143)




四、扁圆球型

代表树种：桧柏(37)、杜松(59)、广玉兰(89)、榕树(120)、香樟(138)、鱼尾葵(245)




五、圆球型

代表树种：侧柏(35)、罗汉松(67)、木莲(86)、枇杷(134)



六、广圆锥型

代表树种：云杉(10)、柳杉(31)、柏木(51)




说明：
()内数字代表该树种在附表1中的序号。

2.4.2落叶乔木树形特征

一、长卵圆型

代表树种：毛白杨
(290)、枫香(523)




二、圆柱型

代表树种：新疆杨(292)、
箭杆杨(295)



三、倒卵型

代表树种：枫杨(280)、
旱柳(305)




四、伞状扁球型

代表树种：合欢(379)、
凤凰木(407)、臭椿
(411)



五、圆球型

代表树种：
榔榆(325)、
珊瑚朴(333)、
元宝枫(352)、
国槐(396)、
栾树(425)、
杜仲(432)、
圆冠榆(328)



六、广圆锥型

代表树种：水杉(73)、金
钱松(75)、落羽杉(77)




七、卵圆型

代表树种：白玉兰(260)
小青杨(289)、无患子
(414)、悬铃木(421)



八、垂枝型

代表树种：垂柳(304)、
白桦(321)、绦柳(308)



九、广卵圆型

代表树种：
老年银杏(266)、白
榆(326)、鸡爪槭
(358)、
七叶树(623)




十、长圆球型

代表树种：鹅掌楸(267)、刺
槐(392)、小叶白蜡(555)



十一、半球型

代表树种：
馒头柳(307)、
椴树(343)、梓树
(371)、龙爪槐
(397)、千头椿



十二、长圆球型(小乔木)

代表树种：
西府海棠(462)、紫叶李
(466)、山桃(485)、
丝棉木(507)



说明：
() 内数字代表该树种在附表1中的序号。

落叶乔木树形特征

图集号 03J012-2


审核 苏雪颖 校对 李强 设计 孙伟

页 34

2.4.3 灌木树形特征

一、圆球型

代表数种：溲疏(434)、太平花(439)、榆叶梅(486)、珍珠梅(493)、黄刺玫(495)、棣棠(504)、丁香(568)、金银木(597)



二、长圆型

代表树形：枸桔(378)、石榴(410)、腊梅(506)、紫薇(616)、木槿(626)




三、垂枝半球型

代表树种：紫穗槐(384)、连翘(553)、迎春(560)、锦带花(602)、海仙花(609)




四、半球型

代表数种：紫叶小檗(414)、牡丹(430)、柳叶绣线菊(444)、麻叶绣球(445)、贴梗海棠(450)、郁李(469)、丰花月季(498)、玫瑰(502)、木芙蓉(625)、云实(675)




五、圆球型

代表树种：含笑(83)、海桐(149)、桂花(184)



六、倒卵圆型

代表树种：十大功劳(118)、南天竹(119)、大叶黄杨(135)、黄杨(156)、洒金珊瑚(168)



七、圆锥型

代表树种：珊瑚树(197)



八、匍匐型

代表树种：沙地柏(46)、云南黄馨(561)



说明：

1、()内数字代表该树种在附表1中的序号。

2、一至四为落叶灌木树形特征；五至八为常绿半常绿灌木树形特征。

灌木树形特征

图集号

03J012-2

审核

李智超

校对

李玲

设计

白伟成

页

35

附表 1：各区划常用木本园林植物性状表

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
常 绿 针 叶 树								
1	苏铁 ●	Cycas revolute	苏铁科	2	华南、西南(VII、VIII)	中性,喜暖热湿润气候及酸性土	花黄褐色 7~8 月,姿态优美	景园树
2	南洋杉	Araucaria cunninghamii	南洋杉科	20~30	华南(VII南部、VIII)	阳性,喜暖热气候,不耐寒,喜肥,生长快	树冠狭圆锥形,姿态优美	风景树、行道树
3	异叶南洋杉 ●	Araucaria heterophylla	南洋杉科	10~30	华南(VII南部、VIII)	阳性,喜暖热气候,不耐寒,喜肥,生长快	树冠塔形	风景树、行道树
4	辽东冷杉	Abies holophylla	松科	30	东北东南部、华北(II、III)	阴性,喜冷凉湿润气候,酸性土,耐寒	树冠圆锥形	风景林、庭荫树
5	臭冷杉	Abies nephrolepis	松科	30	东北及华北山地(II、III)	阴性,喜冷湿环境及酸性土壤,浅根性	树冠尖塔形	风景林、用材林
6	日本冷杉	Abies firma	松科	30~40	华东、华中(IV~VD)	阴性,喜冷凉湿润气候及酸性土	树冠圆锥形	风景林、用材林
7	青海云杉	Picea carassifolia	松科	23	西北(II、III、IX)	中性,浅根性	树冠塔形	风景林、行道树、景园树
8	青杆 ●	Picea wilsonii	松科	50	西北、华北、东北(II、III、IX)	耐阴性强,喜凉爽湿润气候,适应力强,喜微酸性土壤	针叶灰蓝色,枝叶繁密	风景林、景园树
9	白杆	Picea meyeri	松科	30	华北、东北、山西、河南(II、III、IX)	中性,耐阴,喜冷凉湿润气候,生长慢	树冠圆锥形,针叶粉蓝色	风景林、景园树
10	云杉 ●	Picea asperata	松科	45	陕、甘、晋、宁、川北(IV~VI西部)	中性,耐阴,喜凉润气候及排水良好的酸性土壤,耐干冷,浅根性	冠圆锥形,叶灰绿色	园景树及风景树、用材林
11	红皮云杉	Picea koraiensis	松科	30	东北、华北(II、III)	耐阴,耐干旱,耐寒,生长较快	树冠圆锥形	园景树
12	欧洲云杉	Picea abies	松科	36~60	华东(III~VI东部)	喜温凉气候及深厚湿润的酸性土	针叶鲜绿色	园景树,常用作圣诞树和用于岩石园
13	樟子松 ●	Pinus sylvestris	松科	30	东北、西北(I、II、IX、X)	强阳性,耐寒、耐干旱耐瘠薄,深根性,抗风沙	针叶黄绿色	防护林、风景林
14	油松 ●	Pinus tabulaeformis	松科	10~30	东北南部,华北、西北(III、IV、IX)	强阳性,耐寒、耐干旱耐瘠薄,深根性	老年树冠伞形,树姿苍劲古雅,枝繁叶茂	庭荫树、风景林、防护林、行道树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
15	红松●	Pinus koraiensis	松科	40	东北地区（Ⅱ、Ⅸ北部）	弱阳性，喜冷凉湿润气候及酸性土	针叶蓝绿色	庭荫树、风景林、行道树
16	黑松●	Pinus thubergii	松科	30~40	华东沿海地区（Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ的东部）	强阳性，抗海潮风，宜生长海滨，耐盐碱	树冠广卵形	庭荫树、防潮林、行道树
17	锦松	Pinus thubergii cv. Corticosa	松科	10~20	华东（Ⅵ）	强阳性，抗海潮风，宜生长海滨	枝干上木栓质树皮特别发达，形态奇特	盆景
18	赤松●	Pinus densiflora	松科	20~40	华东及北部沿海地区（Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ的东部）	强阳性，耐寒，要求海岸气候，深根性，抗风力强	针叶细软较短，暗绿色	庭荫树、风景林、园景树、行道树
19	平头赤松	Pinus densiflora cv. Umbraculifera	松科	3~4	华东地区（Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ的东部）	阳性，喜温暖气候，生长慢	树冠伞形，丛生大灌木状	庭植园景树
20	偃松	Pinus pumila	松科	1~6	东北（Ⅰ、Ⅱ）	阴性，喜阴湿	丛生，大枝伏卧状	地被，常用于岩石园
21	海岸松	Pinus pinaster	松科	30	华东地区（Ⅴ、Ⅵ）	阳性，长势旺盛		风景林
22	乔松	Pinus griffithii	松科	70	华北、滇西北、藏西南（Ⅲ、Ⅺ）	弱阳性，耐旱，喜温暖湿润气候	针叶灰绿色，细柔下垂	庭荫树、风景林
23	刚松	Pinus rigida	松科	25	华东（Ⅲ~Ⅴ东部）	喜温暖湿润气候	针叶暗绿色	园景树
24	五针松●	Pinus parviflora	松科	30	长江中下游地区（Ⅴ、Ⅳ东部）	中性，较耐阴，不耐寒，生长慢	针叶细短，蓝绿色	庭荫树、风景林
25	白皮松●	Pinus bungeana	松科	10~30	华北、西北、长江流域（Ⅲ~Ⅴ、Ⅸ）	阳性，适应干冷气候，抗污染力强，不耐积水	老干树皮成粉白色，树冠开阔	庭荫树、风景林
26	华山松●	Pinus armandi	松科	10~30	西南、华西、华北（Ⅲ~Ⅴ、Ⅸ）	弱阳性，喜温凉湿润气候，浅根性，不耐碱土，怕涝	针叶灰绿色	园景树、庭荫树
27	马尾松	Pinus massoniana	松科	40	长江流域及其以南地区（Ⅴ~Ⅶ）	强阳性，喜温暖湿润气候，宜酸性土，忌水涝和盐碱，耐瘠薄，深根性，生长快	针叶细软	风景林、用材林
28	湿地松	Pinus elliottii	松科	25~35	长江流域至华南（Ⅴ~Ⅶ）	强阳性，喜温暖气候，较耐水湿和碱土，不耐旱，抗风力较强		风景林、用材林
29	加勒比松	Pinus caribaea	松科	25~35	华南（Ⅶ、Ⅷ）	强阳性，喜温暖气候，较耐水湿和碱土，不耐旱，抗风力较强，生长快		风景林、用材林

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
30	雪松	Cedrus deodara	松科	8~25	华北至长江流域 (III~VI)	弱阳性, 喜温和凉润气候气候, 耐寒性不强, 抗污染力弱, 不耐 水湿, 浅根性	树冠幼年圆锥形, 姿态优 美, 树干挺直, 老枝铺散, 小枝梢下垂	庭荫树、风景林
31	柳杉	Cryptomeria fortunei	杉科	40	长江流域及其以 南地区 (V~VII)	中性, 喜温湿气候及酸性土, 浅 根性, 侧根发达, 生长快	树冠圆锥形, 树姿优美, 绿 叶婆娑	庭荫树
32	杉木	Cunninghamia lanceolata	杉科	30~35	长江中下游至华 南 (V~VII)	中性, 喜温湿气候及酸性土, 速 生	树冠圆锥形	造林树种
33	日本金松	Sciadopitys verticillata	杉科	40	华东(IV~VI东部)	喜阴, 喜深厚、肥沃排水良好的 土壤, 耐寒, 生长慢	树冠圆锥形	庭院观赏
34	日本花柏	Chamaecyparis pisifera	柏科	50	长江流域 (VI)	中性, 喜凉爽湿润气候, 较耐阴	树冠尖塔形	庭院观赏
35	侧柏	Platycladus orientalis	柏科	20	华北、西北至华南 (III~IX)	阳性, 耐寒, 耐干旱瘠薄, 抗污 染能力强, 耐修剪	幼时树冠圆锥形, 庭荫树	庭荫树、防护林、 绿篱
36	千头柏	Platycladus orientalis cv. Sieboldii	柏科	3~5	华北、西北至华南 (III~VIII)	阳性	树冠紧密,近球形	庭院观赏
37	圆柏 (桧 柏)	Sabina chinensis	柏科	20	东北南部、华北至 华南 (III~VIII)	阳性, 幼树稍耐阴, 耐干旱瘠薄, 耐寒, 稍耐湿, 耐修剪, 防尘隔 音效果好	幼年树冠狭圆锥形	庭荫树、防护林、 行道树、绿篱
38	偃柏 ●	Sabina chinensis var. sargentii	柏科	0.6~ 0.8	东北 (II)	阳性, 耐寒, 耐瘠薄	匍匐灌木, 大枝铺地生, 小枝 上升成密丛状, 针叶蓝绿色	地被, 常用于岩 石园
39	鹿角柏	Sabina chinensis cv. Pfitzeriana	柏科	3~5	华北至长江流域 (III~VII)	阳性, 耐寒	丛生状, 干向四周斜展, 针 叶灰绿色	庭院观赏
40	西安桧	Sabina chinensis cv.Xian	柏科	15	东北至华中 (III~V)	阳性, 耐寒, 忌水涝	树势粗壮, 叶色鲜绿	行道树、园景树
41	丹东桧 ●	Sabina chinensis cv. Dandong	柏科	10	东北(II、III北部)	阳性, 耐寒, 耐修剪	树冠圆柱尖塔形, 圆锥形, 侧 枝生长势强, 冬季叶色深绿。	用作造型树, 绿 篱
42	龙柏 ●	Sabina chinensis cv. Kaizuca	柏科	8	华北南部至长江 流域 (IV~VII)	阳性, 耐寒性不强, 抗有害气体, 滞尘能力强, 耐修剪	树冠圆柱形似龙体, 侧枝稍 有螺旋体	庭荫树、园景树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
43	塔柏	Sabina chinensis cv. Pyramidalis	柏科	8~15	华北及长江流域 (III~VI)	阳性, 耐寒, 耐修剪, 通常全为刺叶	树冠圆柱状窄塔形	行道树、园景树
44	垂枝圆柏	Sabina chinensis f. pendula	柏科	8~15	陕西西南, 甘肃东南 (IV西部, IX南部)	阳性	小枝细长下垂	园景树
45	铺地柏●	Sabina procumbens	柏科	0.75	华北至长江流域 (III~VI)	阳性, 耐寒, 耐干旱, 生长较慢	匍匐灌木	岩石园、地被、盆景
46	沙地柏(新疆圆柏)●	Sabina vulgaris	柏科	0.8	西北、内蒙古、华北 (III、IV、IX)	阳性, 耐寒, 极耐干旱, 生长迅速	匍匐状灌木, 枝斜上	地被
47	铅笔柏(北美圆柏)●	Sabina virginiana	柏科	20~30	华东 (VI~VIII)	阳性, 适应性强, 抗污染	树冠狭圆锥形	园景树、行道树
48	香柏●	Sabina sino-alpina	柏科	2~3	我国西部(IX、X)	阴性, 耐寒, 喜湿润气候	匍匐状灌木	盆景, 常用于岩石园
49	翠柏●	Sabina squamata cv. Meyeri	柏科	1~3	黄河流域至长江流域 (IV~VI)	喜光, 喜石灰质肥沃土壤, 怕涝	针叶蓝绿色	庭植观赏
50	长白侧柏●	Thuja koraiensis	柏科	2~10	东北 (II)	喜阴凉, 耐潮湿, 耐修剪	树冠圆锥形	绿篱, 常用于岩石园
51	柏木	Cupressus funebri	柏科	35	长江以南地区 (VI、VII)	中性, 喜温暖多雨气候及钙质土, 耐干旱瘠薄, 稍耐水湿, 浅根性	枝叶浓密, 树姿优美	庭植观赏
52	西藏柏	Cupressus torulosa	柏科	45	西南、藏东南(XI)	阳性, 耐瘠薄, 生长快		庭植观赏
53	福建柏	Fokienia hodginsii	柏科	20	华中、华南、西南 (VI、VII)	幼树喜隐蔽, 喜温暖湿润气候, 喜光, 耐寒, 略耐干旱	树姿雄伟, 鳞叶紧密, 蓝白相间	风景树
54	日本扁柏	Chamaecyparis obtusa	柏科	10~20	长江流域(V、VI)	中性, 不耐寒, 喜凉爽湿润气候, 浅根性	树冠尖塔形	庭植观赏
55	云片柏	Chamaecyparis obtuse cv. Breviramea	柏科	5	长江流域(V、VI)	中性, 不耐寒, 喜凉爽湿润气候	树冠窄塔形, 小枝片先端圆钝, 片片如云	庭植观赏
56	孔雀柏	Chamaecyparis obtuse cv. Tetragona	柏科	3	华东(IV~VII东部)	中性, 不耐寒, 喜凉爽湿润气候	灌木	庭植观赏

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
57	凤尾柏	<i>Chamaecyparis obtusa</i> cv. <i>Filicoides</i>	柏科	3	华东 (Ⅳ~Ⅶ东部)	中性, 不耐寒,喜凉爽湿润气候	灌木, 小枝外形颇似凤尾蕨	庭植观赏
58	刺柏	<i>Juniperus formosana</i>	柏科	12	长江流域至西南 (Ⅵ、Ⅶ)	中性偏阴, 喜温暖多雨气候及钙质土	树冠狭圆锥形, 小枝柔软下垂	园景树、用材林
59	杜松●	<i>Juniperus rigida</i>	柏科	10	东北、西北、华北 (Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ)	阳性, 耐寒, 耐干旱瘠薄, 抗海潮风, 生长慢	树冠狭圆锥形	绿篱、庭院观赏
60	天山圆柏●	<i>Juniperus semiglobosa</i>	柏科	4	东北、西北 (Ⅱ、Ⅹ中部)	适应性强, 喜湿润土壤	匍匐状灌木	地被、岩石园
61	东北红豆杉(紫杉●)	<i>Taxus cuspidata</i>	红豆杉科	20	辽宁东部、吉林 (Ⅱ)	阴性, 喜冷凉湿润气候, 浅根性, 怕涝, 忌盐碱	树冠广卵形, 圆形, 叶深绿色, 种紫红色, 假种皮肉质, 浓红色	庭荫树
62	矮紫杉●	<i>Taxus cuspidata</i> cv. <i>Nana</i>	红豆杉科	2	华北、东北 (Ⅱ、Ⅲ)	阴性, 耐寒, 耐修剪, 怕涝	半球状密丛灌木	绿篱、庭植观赏
63	南方红豆杉	<i>Taxus mairei</i>	红豆杉科	16	长江流域以南各省 (Ⅵ~Ⅷ)	阴性, 喜温暖湿润气候及酸性土, 生长慢		庭荫树、用材林
64	红豆杉	<i>Taxus chinensis</i>	红豆杉科	30	我国中部及西部 (Ⅳ~Ⅵ西部)	阴性, 喜温暖湿润气候及酸性土, 生长慢		庭荫树、用材林
65	香榧	<i>Torreya grandis</i> cv. <i>Merrilli</i>	红豆杉科	20~25	长江以南至闽北 (Ⅵ)	阴性, 不耐寒, 喜酸性土, 抗烟尘	小枝下垂, 叶深绿色	庭荫树
66	竹柏●	<i>Podocarpus nagi</i>	罗汉松科	10~15	华东; 华南 (Ⅵ~Ⅷ)	喜半阴, 喜温暖湿润气候, 抗大气污染	广椭圆状塔形树冠, 干皮红褐色, 光滑	园景树、庭荫树、行道树
67	罗汉松●	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	罗汉松科	10~20	长江以南各地 (Ⅵ、Ⅶ)	半阴性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒	树形优美, 种子卵圆形熟时紫红色, 观果观叶	庭荫树、绿篱
68	小叶罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>maki</i>	罗汉松科	20	长江以南各地 (Ⅵ、Ⅶ)	半阴性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒	树形优美, 种子卵圆形熟时紫红色, 观果观叶,叶较小	庭植、盆景
69	三尖杉	<i>Cephalotaxus fortunei</i>	三尖杉科	20	中部至南部、西南部 (Ⅴ~Ⅶ)	阴性	树冠开展, 多分枝	庭荫树
70	粗榧	<i>Cephalotaxus sinensis</i>	三尖杉科	2~6	长江流域及其以南各省 (Ⅴ~Ⅶ)	耐阴性强, 喜温凉湿润气候, 耐修剪	树冠广圆锥形	庭荫树、绿篱

落 叶 针 叶 树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
71	兴安落叶松	Larix gmelini	杉科	35	东北（Ⅰ、Ⅱ）	强阳性，喜温凉湿润气候，较耐湿，适应性强不耐海潮，忌大风	树冠幼年成塔状，老树则较开阔	庭荫树、风景林
72	黄花落叶松●	Larix olgensis	杉科	40	东北（Ⅲ）	喜光，耐严寒，喜湿润，适应性强，有一定的耐旱耐水湿能力	树姿优美	庭荫树、风景林
73	水杉●	Metasequoia glyptostroboides	杉科	40	华北南部至长江流域（Ⅳ~Ⅵ）	阳性，喜温暖，较耐寒，耐水湿	树冠狭圆锥形	庭荫树、防护林、水边绿化
74	水松	Glyptostrobus pensilis	杉科	8~10	华南、西南（Ⅶ、Ⅷ）	阳性，喜暖热多雨气候、酸性土，耐水湿	树冠狭圆锥形，树姿优美	庭荫树、护堤树、水边湿地绿化
75	金钱松●	Pseudolarix amabilis	杉科	40	长江流域（Ⅵ、Ⅶ）	阳性，喜温暖多雨气候及酸性土，深根性，抗风	树冠圆锥形，叶态秀丽，秋叶金黄	庭荫树、行道树
76	池杉●	Taxodium ascendens	杉科	25	长江流域及其以南地区（Ⅴ~Ⅶ）	阳性，喜温暖，极耐水湿，不耐碱土	树冠狭圆锥形，秋叶鲜褐色	庭荫树、水边绿化树
77	落羽杉●	Taxodium distichum	杉科	50	长江流域及其以南地区（Ⅴ~Ⅶ）	阳性，喜温暖，耐水湿	树冠狭圆锥形，观秋色叶	庭荫树、水边护岸树
78	墨杉	Taxodium mucronatum	杉科	50	长江流域（Ⅵ）	喜温暖，耐水湿，耐碱土	树冠狭圆锥形	水边、河湾绿化树种
常 绿 阔 叶 树								
79	乐东拟单性木兰●	Parakmeria lotungensis	木兰科	30	我国东南部至西南部（Ⅵ）	阳性，喜温暖至高温多湿气候，生长迅速，抗污染	花白色，顶生，花期夏季。芳香，种子红色	风景树、行道树，木本花卉
80	乐昌含笑●	Michelia chapensis	木兰科	10~20	华中至华南（Ⅵ、Ⅶ）	阳性，喜温暖湿润气候，生长迅速，适应性强，耐旱，怕涝	树冠圆锥塔形，花白色，芳香，夏季开花	庭荫树
81	火力楠（醉香含笑）●	Michelia macclurei	木兰科	20~30	华南（Ⅵ、Ⅶ）	阳性，喜温暖湿润气候及酸性土，耐寒、抗旱，抗污染，忌积水，速生	树冠圆伞形，花白色，繁密，芳香，3~4月	庭荫树、风景树、行道树
82	深山含笑●	Michelia maudiae	木兰科	20	中国南部（Ⅵ、Ⅶ）	阳性，喜暖湿气候，适应性强，怕涝	花白色，2~3月，芳香	庭荫树
83	含笑●	Michelia figo	木兰科	2~3	长江以南地区（Ⅵ~Ⅷ）	中性，喜温暖湿润气候及酸性土	花淡紫色，浓香，4~5月	庭植、盆栽
84	白兰花●	Michelia alba	木兰科	17	华南（Ⅶ、Ⅷ）	阳性，喜暖热，喜酸性土，不抗污染，怕涝	花白色，具浓香，5~9月	庭荫树、行道树
85	黄兰●	Michelia champaca	木兰科	10	藏东南、西南、华南（Ⅵ南部~Ⅷ）	阳性，喜暖热，喜酸性土，不耐碱土	花橙黄色，浓香，花期夏季	庭荫树、行道树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
86	木莲●	Manglietia fordiana	木兰科	20	中国东南至西南 (VI南部~VIII)	阳性, 幼树耐阴, 喜暖湿气候及酸性土, 畏干热	树荫浓密, 花色洁白, 5 月开花, 聚合果红褐色	园景树
87	山玉兰 (优昙花)●	Magnolia delavayi	木兰科	6~12	西南(VI、VII西部)	阳性, 稍耐阴, 耐干旱, 忌水湿, 生长慢	花奶油白色, 微香, 4~6 月	庭荫树
88	夜合花 ●	Magnolia coco	木兰科	2~4	华南 (VII、VIII)	喜半阴, 喜暖湿气候, 较耐干旱瘠薄, 抗污染	花下垂, 白色, 浓香, 夜间尤甚, 夏至秋季开花	香花植物, 庭植观赏
89	广玉兰●	Magnolia grandiflora	木兰科	30	长江流域及其以南地区 (V~VII)	弱阳性, 喜温暖湿润气候, 抗污染, 不耐碱土	树冠圆锥形, 花大, 白色, 芳香, 6~7 月	园景树、行道树、庭荫树
90	石栎	Lithocarpus glabra	山毛榉科	15~20	我国东南部 (VI~VII)	喜光, 稍耐阴, 耐干旱瘠薄	枝叶茂密	庭荫树
91	苦槠	Castanopsis sclerophylla	山毛榉科	15~20	长江以南地区 (VI~VII)	中性, 喜温暖气候, 抗有毒气体, 深根性, 寿命长, 防火	枝叶茂密	风景林、防护林
92	米槠 (小红栲)	Castanopsis carlesii	山毛榉科	20	东南沿海至华中、华南 (VI~VII)		叶背浅褐色或浅灰色	风景林
93	丝 栗 栲 (栲树)	Castanopsis fargesii	山毛榉科	30	长江以南地区 (V~VII)	耐阴, 喜湿润肥沃土壤	树形美丽	风景林、庭荫树、孤赏树
94	钩栗	Castanopsis tibetana	山毛榉科	30	长江以南地区 (V~VII)	中性偏阴, 喜温暖湿润气候, 抗污染	树冠浑厚, 叶大荫浓	风景林、防护林、孤赏树
95	青冈栎	Cyclobalanopsis glauca	山毛榉科	10	长江以南地区 (V~VII)	中性, 喜温暖湿润气候, 萌芽力强, 耐修剪	枝叶茂密, 树姿优美	风景林、园景树
96	杨梅	Myrica rubra	杨梅科	12~15	长 江 以 南 地 区 (VI、VII)	耐阴, 喜润湿气候和酸性土, 怕烈日直射, 深根性, 抗有害气体	树冠园整, 红果可食	园路树、庭荫树
97	桃花心木●	Swietenia mahagoni	楝科	10~20	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜高温多湿气候, 适应性强, 抗风, 抗大气污染。生长慢	枝叶茂密, 树形美观	庭荫树、行道树
98	大叶桃花心木●	Swietenia macrophylla	楝科	25	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜高温多湿气候, 适应性强, 抗风, 抗大气污染。生长速度中等	树皮淡红褐色, 枝叶茂密, 树形美观	庭荫树、行道树
99	米仔兰●	Aglaia odorata	楝科	4~7	华南、西南南部 (VI南部~VIII)	弱阳性, 喜温暖湿润气候, 抗大气污染	花小而多, 黄色, 浓香, 花期夏秋	香花植物
100	人面子 ●	Draecontomelon duperreanum	漆树科	10~25	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜温暖湿润气候, 适应性颇强, 耐寒, 抗风, 抗大气污染	树冠伞形, 叶色翠绿	风景树、行道树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
101	扁桃 ●	Mangifera sylvatica	漆树科	10~20	华南、云南南部 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性，喜温暖，抗 SO ₂	树干挺直，树冠茂密，球形 或卵形	庭荫树、行道树
102	芒果 ●	Mangifera indica	漆树科	10~20	华南、福建、台湾 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性，抗污染，耐海水	树冠球形，枝叶茂密	庭荫树、行道树
103	柚	Citrus grandis	芸香科	5~10	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光	花白色，果黄色，果大皮厚	果树
104	柑桔	Citrus reticulata	芸香科	3~5	长江以南各省 (Ⅵ、Ⅶ)	阳性，喜排水良好的土壤，抗性 强	花白，有香气，果橙红或橙 黄，大而又美丽	庭荫树，果可食
105	橙	Citrus sinensis	芸香科	3~5	长江以南各省 (Ⅵ、Ⅶ)	喜光	花白色，果橙黄色	果树
106	九里香 ●	Murraya paniculata	芸香科	3~4	华南、西南 (Ⅵ、 Ⅶ、Ⅷ)	喜光，耐半阴，喜温暖湿润气候， 抗大气污染	花白色，芳香，夏至秋季开 花。冬季果树，橙红色	庭植观赏，绿篱
107	金桔 (金 弹)	Fortunella margarita	芸香科	3	浙江 (Ⅵ)	阳性	花白色，6月，芳香，果倒卵形， 橙黄色或黄绿色，11月成熟	庭植观赏、果树
108	第 伦 桃 (五桠果 ●)	Dillenia indica	五桠果 科	5~10	云南、广西 (Ⅷ)	喜光，耐半阴，喜高温湿润气候， 抗风，怕涝	树冠浓密，花白色，花期夏 季，果绿色	风景林、园路树， 果实可招引鸟类
109	海南红豆 ●	Ormosia pinnata	蝶形花 科	10~15	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光，耐半阴，喜高温湿润气候， 适应性强，抗大气污染，抗风， 速生	树冠园伞形，圆锥花序黄白 色略带粉红，秋季开花，荚 果念珠状，熟时黄色	风景树、行道树
110	花榈木	Ormosia henryi	蝶形花 科	13	长江以南地区 (Ⅵ、Ⅶ)	阳性	树冠圆球形，树皮青灰色光 滑。花黄白色，6~7月，荚 果扁平，种子鲜红色	庭荫树
111	台湾相思 ●	Acacia richii	含羞草 科	16	华南、台湾 (Ⅶ、 Ⅷ)	阳性，喜暖热气候，耐干旱，抗 风	花黄色，4~6月，微香	庭荫树、行道树、 水土保持林
112	南洋楹 ●	Albizia falcataria	含羞草 科	10~20	华南 (Ⅷ)	强阳性，喜高温多湿气候，不耐 干旱，速生	树冠广阔，花淡黄白色，春 末夏初开花	风景树、绿荫树
113	双荚决明 (金边黄槐) ●	Cassia bicaularis	苏木科	1.5~3	华南 (Ⅷ)	喜光及高温湿润气候，喜肥	花鲜黄色，全年可开花	丛植、绿篱
114	铁刀木 ●	Cassia siamea	苏木科	20	华南及滇南 (Ⅶ、 Ⅷ)	阳性，喜暖热气候，耐干旱瘠薄， 忌积水，抗风，耐修剪	树冠广阔，花黄色，9~12 月，芳香	风景树、庭荫树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
115	罗望子 (酸豆)	Tamarindus indica	苏木科	20	云南及两广南部 (Ⅷ)	阳性	花淡绿色, 5~6 月	庭荫树, 果可食
116	火焰花(中国无忧花)●	Saraca dives	苏木科	5~20	云南及两广南部 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜排水良好的肥沃土壤	树冠椭圆状伞形, 花序大, 花桔红色, 花期夏季	风景树
117	阔叶十大功劳	Mahonia bealei	小檗科	3~4	长江流域及其以南地区 (Ⅴ~Ⅷ)	耐阴, 喜温暖湿润气候	花黄色, 3~4 月。果暗蓝色, 9~10 月	庭植、绿篱
118	十大功劳	Mahonia fortunei	小檗科	2	长江流域及其以南地区 (Ⅴ~Ⅷ)	耐阴, 喜温暖湿润气候	花黄色, 7~8 月。叶形秀丽, 果黑色	庭植、绿篱
119	南天竹●	Nandiana domestica	南天竹科	2	长江流域及其以南地区 (Ⅴ~Ⅷ)	中性, 喜温暖湿润气候, 是石灰岩钙质土指示植物	花白 5~7 月, 9~10 月果红色, 枝叶秀丽, 冬季叶变红	庭植
120	榕树(细叶榕)●	Ficus microcapa	桑科	20~25	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜暖热多雨气候及酸性土, 耐湿, 耐瘠薄, 抗风, 抗大气污染, 耐修剪	树冠大而圆整, 有大量粗壮气根插入土中, 形成独木成林的景观	庭荫树、行道树
121	金叶榕●	Ficus microcapa cv. Golden Leaves	桑科	1~3	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜暖热多雨气候及酸性土, 耐湿, 耐瘠薄, 抗大气污染, 耐修剪	叶金黄色, 常修剪成灌木状	修剪造型, 绿篱色带
122	高山榕●	Ficus altissima	桑科	30	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜高温多湿气候, 耐干旱瘠薄, 抗风, 抗大气污染		庭荫树、行道树、风景树
123	印度橡胶榕	Ficus elastica	桑科	20~45	华南 (Ⅷ)	中性, 宜肥沃湿润土壤, 喜酸性土		庭荫树
124	垂叶榕●	Ficus benjamina	桑科	10	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜高温多湿气候, 耐湿, 耐瘠薄, 抗风耐潮, 抗大气污染, 耐修剪	枝条下垂, 隐头花序球形, 成熟时淡红色或黄色	庭荫树、风景树
125	菩提树(思维树)●	Ficus religiosa	桑科	20	华南 (Ⅷ)	阳性, 喜温暖至高温湿润气候, 抗风, 抗大气污染, 速生	树冠广阔, 叶形别致	庭荫树, 寺庙常用
126	大果榕(象耳榕)●	Ficus auriculata	桑科	3~10	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜高温湿润气候, 不抗风, 抗大气污染	树冠呈圆伞形, 叶色浓绿碧亮	庭荫树、行道树
127	木波罗(波罗蜜)●	Artocarpus heterophyllus	桑科	8~15	华南 (Ⅷ)	阳性, 喜高温多湿气候, 抗风, 抗大气污染	树冠伞形或圆锥形, 叶色浓绿、亮泽, 大型聚花果黄色, 老干结果	风景树、行道树、果树
128	龙眼●	Dimocarpus longan	无患子科	10~20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	中性, 喜温暖湿润气候, 寿命长	树冠广阔, 树姿壮观	庭荫树、风景树
129	荔枝●	Litchi chinensis	无患子科	8~20	华南 (Ⅷ)	喜光, 喜温暖湿润气候, 抗风, 抗大气污染, 寿命长	树冠广阔	庭荫树、风景树
130	石楠●	Photinia serrulata	蔷薇科	4~6	华东、中南、西南 (Ⅳ~Ⅵ)	弱阳性, 喜温暖湿润, 耐干旱瘠薄, 不耐水湿, 抗污染	树冠球形, 枝叶浓密, 嫩叶红色, 花白色, 5~7 月秋冬红果	庭荫树、绿篱

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
131	石斑木●	Raphiolepis indica	蔷薇科	1~4	华东、华南至西南 (VI~VIII)	中性,喜半阴,喜温暖湿润气候,耐干旱瘠薄,喜酸性土壤	花白色,中心淡红色或橙红色,4月。梨果球形,紫黑色,7~8月成熟	庭植观赏
132	火棘●	Pyracantha fortuneana	蔷薇科	3	华东、华中、西南 (VI~VIII)	阳性,喜温暖气候,不耐寒,耐修剪	春白花,秋冬红果	基础种植、丛植、花篱
133	狭叶火棘	Pyracantha angustifolia	蔷薇科	6	鄂、川、滇、藏 (VI~VII)	阳性,喜温暖气候,不耐寒,耐修剪	花白色,5~6月,果砖红色,9~10月	庭植观赏
134	枇杷●	Eriobotrya japonica	蔷薇科	10	华中至华南(VI、VII)	弱阳性,喜温暖湿润,喜酸性土或中性土,不耐寒	叶大荫浓,初夏黄果	庭植观赏、果树
135	大叶黄杨●	Euonymus japonicus	卫矛科	0.5~8	华北至华南、西南 (III~VII)	中性,喜温湿气候,抗有毒气体	枝叶紧密,叶面深绿有光泽	观叶植物,绿篱、基础种植
136	金心黄杨●	Euonymus japonicus cv. Aureo-pictus	卫矛科	0.5~2	长江流域(V、VI)	中性,喜温湿气候	叶中脉附近金黄色,有时叶柄及枝端叶也为金黄色	观叶植物
137	金边黄杨●	Euonymus japonicus cv. Aureo-marginatus	卫矛科	0.5~2	长江流域(V、VI)	中性,喜温湿气候	叶边缘金黄色	观叶植物
138	香樟●	Cinnamomum camphora	樟科	30	长江流域至珠江流域(VI、VII)	弱阳性,喜温暖湿润,较耐水湿,抗污染,深根性,抗海潮风	树冠卵圆形,叶色翠绿,可挥发出樟脑香味	庭荫树、行道树、风景林
139	黄樟(大叶樟)	Cinnamomum porrectum	樟科	20~25	长江以南(VI~VIII)	喜温暖湿润气候及酸性土,喜光,幼树耐阴,生长快,萌芽性强		庭荫树
140	天竺桂(浙江樟)	Cinnamomum japonica	樟科	20~25	中国东南部(VI)	喜光,幼树耐阴,喜暖湿气候及酸性土,怕涝,抗污染,生长较快	树姿高大,树干直,树冠圆整,枝叶茂密	庭荫树、风景树
141	肉桂	Cinnamomum cassia	樟科	15~25	华南(VII、VIII)	耐阴,喜温暖多雨气候及肥沃湿润的酸性土,深根性,抗风力强,生长慢	树形整齐	庭荫树
142	阴香●	Cinnamomum burmanii	樟科	15~25	华南(VII、VIII)	较喜光,喜暖热、湿润气候及肥沃土壤,抗风,抗大气污染	树冠浓密,夏秋萌发的新叶呈淡红色。花绿白色,芳香,春季至夏初开花,浆果卵形,秋季成熟时橙黄色	庭荫树、行道树、风景林
143	紫楠	Phoebe sheareri	樟科	15~20	长江以南及西南地区(VI、VII)	阴性,喜温暖湿润气候及较阴湿的环境,深根性,生长慢	树形端正,叶大荫浓	庭荫树、风景树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
144	楠木（桢楠）	Phoebe zhenna	樟科	35	中国西南部（VI、VII）	喜光，喜暖湿气候及酸性土，深根性，生长慢，寿命长	干直	庭荫树、园景树
145	月桂	Laurus nobilis	樟科	12	南部（VI、VII）	喜光，稍耐阴，喜暖湿气候，耐干旱，不择土壤	树冠圆整，花黄色，春季开花	庭荫树
146	红楠	Machilus thunbergii	樟科	20	长江以南地区（VI、VII）	弱阳性，喜温暖湿润气候，耐盐，抗海潮风，生长快，寿命长		风景林、庭荫树、防风林
147	大叶楠(华东楠)	Machilus leptophylla	樟科	28	华东、华中（VI、VII）	弱阳性，喜温暖湿润气候，生长较快	叶大荫浓	风景林、庭荫树
148	香叶树	Lindera communis	樟科	13	华中、华南、西南（V~VII）	耐阴，喜温暖气候，耐干旱瘠薄，喜酸性土壤，耐修剪	果球形，熟时深红色	庭荫树、园景树
149	海桐●	Pittosporum tobira	海桐科	2~6	东南沿海及其以南地区（IV~VIII）	中性，喜温暖湿润气候，不耐寒，抗海潮风及SO ₂ ，对土壤要求不严	白花芳香，5月，叶革质，萌芽力强,耐修剪	绿篱、庭植观赏
150	檵木●	Loropetalum chinense	金缕梅科	10	华东、华南及西南（VI~VIII）	阳性，稍耐阴，喜温暖气候及酸性土壤，耐旱	花黄白色，4~5月，有红花檵木变种，花叶均为紫红色	庭植观赏、绿篱
151	蚊母	Distylium racemosum	金缕梅科	16	长江中下游至东南部（V、VI）	阳性，喜暖热气候，抗有毒气体	花紫红色，3~4月，抗污染树种	庭植观赏
152	马蹄荷(合掌木)	Exbucklandia populnea	金缕梅科	20	西南（VI西部）	耐阴，喜暖湿气候		用材树、庭荫树
153	小叶黄杨●	Buxus microphylla	黄杨科	0.5~1	长江流域及其以南各省（V~VII）	中性，耐寒性弱，抗污染	枝叶紧密	庭植观赏、绿篱
154	朝鲜黄杨	Buxus microphylla var.koreana	黄杨科	0.6	东北南部至华中（III、IV）	中性，耐寒性强	冬季叶多变紫褐色	庭植观赏、绿篱
155	华南黄杨	Buxus harlandii	黄杨科	1~9	华南（VII、VIII）	弱阳性，耐修剪，较耐寒，抗污染	枝叶细密	绿篱、庭植观赏
156	黄杨●	Buxus sinica	黄杨科	1~7	华北至华南,西南（III~VII）	中性，生长慢，耐修剪，抗污染	树冠圆形，枝叶细密	庭植观赏、绿篱
157	肖黄栌(紫锦木)●	Euphorbia cotinifolia	大戟科	2~3	华南（VIII）	弱阳性，喜温暖湿润气候，耐瘠薄	茎及叶片均呈红色，花淡黄色，春夏秋三季开花	彩叶植物
158	红桑●	Acalypha wikesiana	大戟科	1~2	华南（VII、VIII）	阳性，喜暖湿气候，耐干旱，忌水湿，生长快	叶红色或红色带紫斑	观叶植物

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
159	变叶木●	Codiaeum variegatum	大戟科	1~2	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜高温多湿气候, 生活力 强	叶色丰富, 品种繁多	观叶植物、绿篱
160	一品红●	Euphorbia pulcherrima	大戟科	1~4	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 不耐旱, 喜温暖	冬季顶生小叶鲜红色	庭植、盆栽、冬 季观花灌木
161	红背桂●	Excoecaria cochinchinensis	大戟科	1~2	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	半阴性, 喜温暖	叶面绿色, 叶背紫红色	庭植、林带下木、 绿篱
162	蝴蝶果●	Cleidiocarpon cavaleriei	大戟科	10~30	西南至华南 (Ⅶ、 Ⅷ)	阳性, 喜温暖多湿气候, 耐寒, 抗风力较差	枝叶浓密, 树姿挺拔	庭荫树、风景树
163	石栗●	Aleurites moluccana	大戟科	15	华南 (Ⅷ)	喜光, 喜温热气候及排水良好的沙 壤土, 深根性, 速生, 抗风, 耐旱	树冠近似圆锥状塔形, 春末 夏初发出大量灰白色新叶	行道树、风景树、 庭荫树
164	交让木	Daphniphyllum macropodum	虎皮楠 科	20	长 江 流 域 以 南 (Ⅵ、Ⅶ)	中性, 偏阴, 喜暖湿气候	新发叶集生枝端, 老叶在新 叶长出后齐落	庭荫树
165	萍婆 (凤 眼果)●	Sterculia nobilis	梧桐科	10~20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	强阳性, 喜高温湿润气候, 适应 性强, 抗风, 耐瘠薄, 不耐寒	树冠浓密, 叶色终年碧绿, 蓇葖果鲜红色	风景树、庭荫树
166	胡颓子	Elaeagnus pungens	胡颓子 科	3~4	长江流域及其以 南各省 (Ⅴ~Ⅶ)	弱阳性, 喜温暖, 耐干旱、水湿, 抗污染, 耐修剪	花银白, 芬芳, 10~11 月, 红果 5 月, 叶背银白色	庭植、果可食
167	日本桃叶 珊瑚	Aucuba japonica	山茱萸 科	5	华南 (Ⅵ、Ⅶ)	阴性, 喜温暖湿润, 不耐寒	花紫色, 果鲜红色	观叶、观果、庭 植
168	洒金珊瑚	Aucuba japonica cv. Variegata	山茱萸 科	2	华南 (Ⅶ)	阴性, 喜温暖湿润, 不耐寒	叶面有黄色斑点, 果鲜红色	观叶、观果、庭 植
169	枸骨●	Ilex cornuta	冬青科	2~4	长江中下游各省 (Ⅴ~Ⅷ)	弱阳性, 耐寒, 耐修剪, 抗有毒 气体, 生长慢	叶革质, 深绿而有光泽, 果 球形, 亮红色	岩石园、庭植、 刺篱
170	铁冬青●	Ilex rotunda	冬青科	5~15	长江流域及其以 南地区 (Ⅴ~Ⅷ)	中性, 喜温暖湿润气候, 耐干旱 瘠薄, 抗大气污染	冬季绿叶红果	行道树、风景林、 观果树
171	冬青	Ilex purpurea	冬青科	13~20	长江流域以南地 区 (Ⅵ、Ⅶ)	中性, 喜温暖湿润气候及肥沃的 酸性土, 耐修剪, 生长慢	绿叶常青, 红果终冬不落	庭荫树、绿篱
172	苦丁茶 (大 叶冬青)	Ilex latifolia	冬青科	20	长江下游至华南 (Ⅵ~Ⅷ)	耐阴	春花黄绿色, 果红色, 秋季 成熟, 嫩叶可代茶	庭荫树
173	龟甲冬青 (豆瓣冬青)	Ilex crenata cv. Convexa	冬青科	1	长江下游至华南 (Ⅵ~Ⅷ)	耐阴	矮灌木, 叶小而密, 花白色, 果球形, 黑色	盆景、庭植观赏

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
174	山茶花●	Camellia japonica	山茶科	6~9	长江流域及其以南地区 (IV东部~VIII)	喜半阴, 喜温湿气候及酸性土壤, 抗污染	花白、粉、红, 冬季及次年春季开花	庭植观赏、盆栽
175	茶梅	Camellia sasanqua	山茶科	3~13	长江以南地区 (VI~VIII)	喜半阴, 喜温湿气候及酸性土壤, 较耐水湿, 抗大气污染	花白、粉红、红或杂色, 有香气, 单瓣或重瓣, 11月~1月开花	庭植观赏、盆栽、花篱
176	金花茶●	Camellia chrysantha	山茶科	2~5	华南 (VIII)	喜光, 耐半阴, 喜高温多湿气候, 忌阳光直射	花金黄色, 12~翌年2月开花	茶花育种重要亲本, 庭植观赏
177	茶 (大叶茶)	Camellia sinensis	山茶科	5	长江以南地区 (V~VII)	耐阴, 喜暖湿气候及酸性土壤	花白色 9~10月, 嫩叶为饮料	经济作物
178	云南山茶	Camellia reticulata	山茶科	15	长江流域及其以南地区, 主产云南 (VI西部)	喜侧方庇荫, 喜温暖湿润气候, 要求酸性土壤, 生长缓慢, 寿命长	花淡红至深紫, 花期 12~翌年4月	庭植观赏
179	油茶●	Camelia oleifera	山茶科	7	长江流域以南、华东 (V~VIII)	阳性, 喜温暖湿润气候及肥沃排水良好的酸性土壤	花白, 10~12月	庭植观赏、片植、花篱
180	红花油茶	Camelia chekiangoleosa	山茶科	3~7	长江流域下游及其以南地区 (VI~VIII)	阳性, 喜温暖湿润气候及肥沃排水良好的酸性土壤	花红色, 10~12月	庭植观赏、片植、花篱
181	木荷●	Schima superba	山茶科	10~30	长江流域以南地区 (VI~VIII)	喜光, 耐阴, 喜暖湿气候及酸性土, 速生, 抗风, 抗污染, 可防火	花白色, 夏初开花, 秋叶及新发叶红艳可观	庭荫树、观赏树
182	厚皮香	Ternstroemia gymnanthera	山茶科	3~8	中国南部及西南部 (VI、VII)	较耐阴	花小, 淡黄色, 浓香	庭植观赏
183	茉莉●	Jasminum sambac	木犀科	1~3	华南 (VI南部~VIII)	阳性, 稍耐阴, 喜酸性土	花白色, 芳香, 春至秋季开花	庭植观赏、丛植
184	桂花●	Osmanthus fragrans	木犀科	12	长江流域及其以南地区 (V~VII)	弱阳性, 喜温暖湿润气候, 怕旱	花黄、白色, 浓香, 花期 9月, 正值仲秋, 香飘数里	庭荫树、风景林
185	四季桂●	Osmanthus fragrans cv. Semperflorens	木犀科	12	长江流域及其以南地区 (V~VII)	弱阳性, 喜温暖湿润气候	花黄白色, 5~9月陆续开花, 仍以秋季为主	庭植观赏
186	银桂	Osmanthus fragrans cv. Latifolius	木犀科	12	长江流域及其以南地区 (V~VII)	弱阳性, 喜温暖湿润气候	花近白色或黄白色, 香味较金桂淡	庭植观赏
187	金桂●	Osmanthus fragrans cv. Thubergii	木犀科	12	长江流域及其以南地区 (V~VII)	弱阳性, 喜温暖湿润气候	花黄色至深黄色, 香气浓郁	庭植观赏

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
188	丹桂	Osmanthus fragrans cv. Aurantiacus	木犀科	12	长江流域及其以 南地区 (V~VII)	弱阳性, 喜温暖湿润气候	花桔红色或橙黄色, 香味弱	庭植观赏
189	刺桂 (柎树)	Osmanthus heterophyllus	木犀科	6	长江流域及其以 南地区 (IV~VII)	弱阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐 寒, 生长慢	花白色, 甜香, 10 月	庭植观赏
190	女贞●	Ligustrum lucidum	木犀科	6~15	长江流域及其以 南地区 (IV~VII)	弱阳性, 喜温暖湿润, 耐修剪, 抗污染	花白色, 6~7 月, 果蓝黑色	行道树、绿篱
191	油橄榄	Olea europaea	木犀科	6.5	长江流域及汉中 地区 (V、VI)	喜光, 喜温暖, 喜石灰质土壤, 稍耐旱, 怕涝	叶银灰色, 花小白色, 芳香	庭荫树
192	黄花夜香 树●	Cestrum aurantiacum	茄科	2~3	华南 (VII、VIII)	阳性, 耐半阴, 喜温暖湿润气候	花期春末至秋, 花冠淡黄色, 白 天闭合, 夜间绽开, 具浓香	庭植观赏
193	二色茉莉 ●	Brunfelsia acuminata	茄科	1	华南 (VII、VIII)	阴性, 喜温暖湿润气候, 不耐瘠 薄、积水	花初开时蓝紫色, 后变淡蓝色或 白色。花期春季至秋季, 芳香	丛植
194	橄榄●	Canarium album	橄榄科	10~20	我国东南部至西 南 (VII、VIII)	喜光, 耐半阴, 喜高温湿润气候, 耐干旱, 抗风力强	花白色, 芳香, 花期夏季。 果冬季成熟, 成熟时黄绿色	庭荫树、行道树、 风景树
195	假连翘●	Duranta repens	马鞭草 科	4.5	华南 (VII、VIII)	喜光, 耐半阴, 喜温暖湿润气候, 耐修剪	常绿蔓性灌木, 花蓝紫色, 花期 夏、秋、冬三季, 边开花边结果, 核果成熟后黄色, 有光泽	绿篱
196	五色梅 (马缨丹)●	Lantana camara	马鞭草 科	1~2	华南 (VII、VIII)	喜光, 喜高温湿润气候, 耐干旱, 适应性强, 生长迅速	花初开时黄色, 渐变为粉紫 色, 盛花期夏季	绿篱、地被、矮墙 和栏杆的垂直绿化
197	珊瑚树 (法 国冬青)●	Viburnum awabuki	忍冬科	6~10	长江流域及其以 南地区 (V~VII)	中性, 喜温暖, 抗烟尘, 耐修剪, 防火	白花, 6 月, 红果 9~10 月	高篱、防护树种
198	华南珊瑚树 (早禾树)	Viburnum odoratissimum	忍冬科	10	华南 (VII、VIII)	中性, 喜暖湿, 抗污染, 防火	白花, 5~6 月, 芳香, 核果, 由红变黑, 果熟 9~10 月	高篱、防护树种
199	银桦●	Grevillea robusta	山龙眼 科	25	华南、西南 (VI~ VIII)	阳性, 喜温暖, 怕炎热, 不耐寒, 生长快, 喜酸性土壤	干直冠大, 花橙黄色, 初夏 开花	行道树
200	杜英 ●	Elaeocarpus sylvestris	杜英科	26	长江以南地区 (VI ~VIII)	中性, 喜暖湿气候及酸性土, 耐 修剪, 对 SO ₂ 抗性强	花黄白色, 花期 7 月, 绿叶 中常存少量鲜红老叶	园景树、庭荫树
201	扶桑●	Hibiscus rosasinensis	锦葵科	6	华南 (VII、VIII)	阳性, 稍耐阴, 喜暖热湿润气候	花色有白、黄、红、粉, 夏 秋开花	庭植观赏、花篱

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
202	灯笼花(吊灯扶桑)●	Hibiscus schizopetalus	锦葵科	1~3	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光, 喜温暖至高温气候, 耐干旱, 抗大气污染	花淡红色, 花期长, 花姿似悬垂的风铃	木本花卉, 庭植观赏
203	黄槿 ●	Hibiscus tiliaceus	锦葵科	3~7	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光, 喜温暖湿润气候, 耐寒, 耐干旱瘠薄, 耐盐, 抗风及大气污染	树冠园伞形, 花黄色, 夏至秋季开花	行道树、园景树、海岸防护林
204	瑞香	Daphne odora	瑞香科	1.5~2	长江流域 (Ⅵ)	阴性, 喜排水良好的酸性土, 不耐移植	花白色或染淡紫红色, 芳香, 花期 3~4 月	庭植观赏
205	赤楠	Syzygium buxifolium	桃金娘科	0.5~5	长江以南地区山地 (Ⅵ、Ⅶ)	阳性, 生长慢	小乔木状灌木	庭植观赏
206	香桃木	Myrtus communis	桃金娘科	1~3	华东 (Ⅵ)	喜光, 也耐阴, 耐修剪	叶密生, 常绿而芳香, 花白色或略带紫色, 芳香, 花期 5 月。浆果扁球形, 10 月熟, 紫褐色	庭植观赏、绿篱
207	大叶桉	Eucalyptus robusta	桃金娘科	30	华南、西南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜暖热气候, 生长快	树冠圆形, 叶深绿	行道树、庭荫树、防护林
208	柠檬桉●	Eucalyptus citriodora	桃金娘科	40	华南、西南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜暖热气候, 生长快	树皮平滑, 通常灰白色树干洁净, 树姿优美, 枝叶具浓郁的柠檬香味	风景树、行道树
209	赤桉	Eucalyptus camaldulensis	桃金娘科	50	华南、云南 (Ⅶ、Ⅷ)	生长快, 适应性强, 耐高温、干旱, 稍耐碱	小枝红色, 细长下垂, 干皮暗灰色或灰白色	庭荫树、行道树
210	蓝桉	Eucalyptus globulus	桃金娘科	35~60	西南高原 (Ⅵ、Ⅶ西部)	阳性, 适应性强, 生长快, 耐湿热性较差, 抗污染	叶蓝绿色, 常被白粉	行道树、造林树种
211	蒲桃●	Syzygium jambos	桃金娘科	10	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜湿热气候, 喜水湿, 抗风力强, 喜肥	树冠广阔, 叶色浓绿, 花白色, 春夏开花	庭荫树、固堤防风树种
212	红千层●	Callistemon rigidus	桃金娘科	1~3	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜高温高湿气候, 耐修剪, 抗大气污染。移栽不宜成活	夏秋开花, 花序似试管刷, 红色, 艳丽	观花灌木
213	白千层 ●	Melaleuca leucadendron	桃金娘科	15	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜高温多湿气候, 抗风抗大气污染, 不耐旱	树冠椭圆状园锥形, 叶具腺点, 香气浓郁, 树皮白色, 成薄层状剥落	行道树、防护林
214	桃金娘 ●	Rhodomyrtus tomentosa	桃金娘科	1~2	东部至西南部 (Ⅵ~Ⅷ)	阳性, 喜温暖至高温湿润气候, 耐干旱瘠薄, 喜酸性土	花初开时淡紫红色, 渐变为粉红色至白色, 夏初开花, 果熟时紫黑色	观花、观果灌木
215	八角金盘	Fatsia japonica	五加科	1~5	长江以南地区 (Ⅵ~Ⅷ)	耐阴, 要求土壤排水良好	花序较大, 花乳白色, 夏秋开花	观叶植物、林带下木

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
216	鹅掌柴●	Schefflera octophylla	五加科	5~10	西南至东南 (VI~VIII)	喜光,耐半阴,喜深厚肥沃的酸性土,生长快抗风	花白色,芳香,秋冬开花	观叶植物、风景树
217	比利时杜鹃(洋杜鹃)	Rhododendron indicum	杜鹃花科	0.5	华南(VIII)	中性,喜酸性土	矮小灌木,花有玫瑰红、粉红、橙红、白等色彩	庭院观赏
218	云锦杜鹃	Rhododendron fortunei	杜鹃花科	3~4	华东(VI)	喜温暖湿润气候及酸性土壤	花大,淡玫瑰色或红色,芳香,5月开花	庭院观赏、丛植
219	夹竹桃●	Nerium indicum	夹竹桃科	5	长江以南地区(VI~VIII)	喜光,喜温暖湿润气候,抗污染	原种花粉红色,有白花、重瓣栽培品种,夏季开花,花有香气	庭院观赏、丛植
220	黑板树(糖胶树)●	Alstonia scholaris	夹竹桃科	10	华南(VII、VIII)	喜光,喜高温多湿气候,生活力强,抗风,抗大气污染	树冠近椭圆形,分枝逐级轮生,夏季开黄白色花,蓇葖果细线形	行道树、庭荫树
221	小花黄蝉●	Allamanda schottii	夹竹桃科	1~2	华南(VIII)	喜光,喜高温多湿气候,不择土壤	夏至秋季开黄色花	木本花卉,庭植
222	盆架树(盆架子)	Winchia calophylla	夹竹桃科	20~30	华南(VIII)	喜光,喜高温多湿气候,抗风	花白色,4~7月开花	行道树
223	希茉莉●	Hamelia patens	茜草科	1~2	华南(VII、VIII)	喜光,喜温暖湿润气候	花橙红色,春末至秋季	木本花卉、丛植、花篱
224	龙船花●	Ixora chinensis	茜草科	1~2	华南(VII、VIII)	喜光,喜高温多湿气候和排水良好的沙壤	花橙红色或鲜红色,夏至秋季开花	木本花卉、丛植
225	栀子花●	Gardenia jasminoides	茜草科	1.8	长江流域及其以南各地(VI~VIII)	中性,喜温暖湿润气候及酸性土	花白色,浓香,花期6~8月	庭植、花篱
226	六月雪	Serissa japonica	茜草科	1	长江以南地区(VI~VIII)	阳性,耐半阴,喜温暖阴湿环境,萌芽力强,耐修剪	花白或淡紫色,花期夏季	盆景、花篱、下木
227	玉叶金花●	Mussaenda pubescens	茜草科	1	我国东南部至西南部(VI~VIII)	喜光,喜高温多湿气候,怕涝	藤状灌木,花淡黄色,叶状萼片白色,8~10月开花	庭植
228	金脉爵床●	Sanchezia nobilis	爵床科	1	珠江三角洲地区(VIII)	半阴性,喜高温多湿气候,忌强光直射	花期春夏秋三季,黄色,枝红色,叶脉鲜黄色或乳白色	观叶植物
229	驳骨丹●	Gendarussa vulgaris	爵床科	1	华南(VII、VIII)	喜光,耐半阴,喜温暖湿润气候,耐寒,耐干旱,耐修剪		绿篱

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
230	红苞花 ●	Odontonema stricum	爵床科	1	华南 (Ⅷ)	喜光, 喜高温多湿气候, 性强健, 耐干旱, 耐水湿	花红色, 夏至冬季开花, 叶 色鲜绿亮泽	庭植观赏
231	旅人蕉 ●	Ravenala madagascariensis	旅人蕉 科	5~6	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性	花白色, 叶似芭蕉	庭植观赏
232	福树 ●	Garcinia subelliptica	藤黄科	5~20	华南 (Ⅷ)	喜光, 喜高温湿润气候, 性强健, 抗风, 抗盐碱, 防噪音, 寿命长	树冠圆锥状, 叶色终年碧绿	风景树、行道树、 园景树
233	人心果 ●	Manilkara zapota	山榄科	5~10	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光, 喜高温湿润气候, 耐瘠薄, 耐盐碱	花白色, 浆果卵状心形, 夏 至秋季边开花边结果	风景树、园路树
234	木麻黄 ●	Casuarina equisetifolia	木麻黄 科	10~20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜暖热气候, 耐干旱瘠薄 及盐碱土, 抗风, 抗污染	小绿色细长下垂, 叶成鳞片 状, 灰绿色	防护林
235	福建茶 ●	Carmona microphylla	紫草科	1~3	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 耐半阴, 喜温暖湿润气候, 耐瘠薄, 生长迅速, 耐修剪	叶革质, 浓绿色, 白花, 细 小, 春至秋开花不断, 核果 球形, 成熟时变红色	绿篱、盆景造型 植物
236	火焰木 ●	Spathodea campanulata	紫葳科	10~20	华南 (Ⅷ)	喜光, 喜高温湿润气候	花橙红色, 全年可开花, 花 大	园景树、木本花 卉
237	吊瓜树 ●	Kigelia africana	紫葳科	20	华南 (Ⅷ)	喜光, 喜温暖湿润气候, 速生, 耐粗放管理	树冠圆伞形, 春夏开花, 紫红色 花序自老枝上垂下, 圆柱状浆果 秋季成熟, 悬于树上经久不落	风景树、行道树
238	黄钟花 ●	Stenolobium stans	紫葳科	5~10	华南 (Ⅷ)	喜光, 怕涝	分枝茂密, 花鲜黄色, 夏秋 两季盛花, 蒴果长条形	园景树、木本花 卉
239	棕榈 ●	Trachycarpus fortunei	棕榈科	2.5~5	长江流域及其以 南地区 (Ⅵ、Ⅶ)	中性, 喜温暖湿润气候, 抗有毒 气体, 不抗风	干直, 叶如扇	风景树、庭荫树
240	蒲葵 ●	Livistona chinese	棕榈科	10~20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	中性, 喜高温多湿的气候, 抗有 毒气体, 抗风	树冠伞形, 叶大扇形	行道树、风景树
241	假槟榔 ●	Archontophoeni x alexandra	棕榈科	20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜暖热气候, 不耐寒	树形优美	风景树、行道树
242	三药槟榔 ●	Areca triandra	棕榈科	2~3.5	华南 (Ⅷ)	阴性, 喜温暖湿润背风环境, 喜 疏松排水良好地土壤	茎干似翠竹, 雄花有香气, 叶色青绿	庭植观赏

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
243	皇 后 葵 (金山葵)●	Syagrus romenzoffianum	棕榈科	10~15	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜暖热气候, 不耐寒	树形优美	行道树
244	王棕 (大 王椰子)	Roystonea regia	棕榈科	20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜暖热气候, 不耐寒	树形优美	行道树
245	鱼尾葵 ●	Caryota ochlandra	棕榈科	20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜温暖润, 根系浅, 不耐 干旱	花色鲜黄	庭荫树
246	短穗鱼尾 葵 ●	Caryota mitis	棕榈科	5~9	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	耐阴, 喜温湿, 生长迅速	株形婆娑多姿, 枝叶繁茂	丛植, 园景树
247	董棕 ●	Caryota urens	棕榈科	10~20	滇南、华南 (Ⅷ)	阳性, 喜温湿气候	茎干粗大挺直, 叶片巨大, 状 如孔雀尾羽, 核果熟时深红色	行道树、庭荫树
248	椰子 ●	Cocos nucifera	棕榈科	15~35	海南 (Ⅷ)	阳性	热带风光树种	风景树、海岸防 护林
249	刺葵	Phoenix hanceana	棕榈科	1~3	华南、西南 (Ⅶ、 Ⅷ)	阳性		观叶植物
250●	美丽针葵 (软叶刺葵)	Phoenix robelenii	棕榈科	1~3	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	中性, 喜高温多湿气候, 耐干旱 瘠薄	姿态纤细柔美	行道树、园景树、 风景林
251	长叶刺葵(加 那利海枣)●	Phoenix canariensis	棕榈科	10~15	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜高温多湿气候	树干粗壮, 高大雄伟, 羽叶 密而伸展, 形成密集的羽状 树冠	行道树
252	海枣 (伊 拉 克 蜜 枣)	Phoenix dactylifera	棕榈科	20~25	广东、海南 (Ⅶ、 Ⅷ)	阳性		果可食, 行道树
253	散尾葵 ●	Chrysalidocarpu s lutescens	棕榈科	7~8	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	耐阴性强, 喜温暖湿润气候		观叶植物、庭植 观赏
254	袖珍椰子 ●	Chamaedorea elegans	棕榈科	1~3	华南 (Ⅷ)	喜温湿半阴环境, 耐阴性强	矮灌木, 花小鲜橙色, 3~4 月开花, 果球形, 橙红色	室内观叶
255	矮棕竹 ●	Rhapis humilis	棕榈科	2~3	华南、西南 (Ⅶ、 Ⅷ)	阴性, 喜湿润的酸性土	植株挺拔, 叶半圆形, 裂片 狭长软垂	观叶植物
256	观音竹(筋 头竹、棕竹)	Rhapis excelsa	棕榈科	2.5~3	华南、西南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜温暖阴湿通风良好的环境	植株挺拔, 叶形清秀	观叶植物

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
257	油棕●	Elaeis guineensis	棕榈科	10	海南 (Ⅷ)	喜光, 喜高温多雨气候	植株高大	行道树、园景树
258	棍棒椰子●	Hyophore verchaffeltii	棕榈科	5~9	海南 (Ⅷ)	喜光, 喜高温多雨气候	茎干形似棍棒	园景树
259	酒瓶椰子●	Hyophore lagenicaulis	棕榈科	1~3	海南 (Ⅷ)	中性, 喜高温多雨气候, 怕霜冻	茎干形似酒瓶	园景树
260	丝葵 (老人葵)●	Washingtonia filifera	棕榈科	20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜温暖湿润的气候	其干枯的叶子下垂, 覆盖于茎干, 叶片间一屡屡白丝状纤维, 似老翁白发	行道树、庭荫树
261	桄榔(砂糖椰子)●	Arenga pinnata	棕榈科	12	华南、西南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜温暖湿润的热带气候, 不耐寒, 幼苗需遮荫和保温	株形高大, 叶片巨大	行道树、庭荫树
262	红刺露兜树●	Pandanus utilis	露兜树科	3~5 (20)	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光, 稍耐阴, 喜高温多湿气候	叶多而密, 图案般的层叠有序, 酷似一座螺旋形的阶梯, 支柱根群向四周生出	观叶植物
263	凤尾兰●	Yucca glorioca	龙舌兰科	2.5	华北南部至华南 (Ⅵ、Ⅶ)	阳性, 有一定耐寒性, 喜温湿气候, 抗污染	圆锥花序, 花乳白色, 下垂 6、10 月两次开花	庭植观赏
264	丝兰	Yucca filamentosa	龙舌兰科	1~2	华北南部至华南 (Ⅵ、Ⅶ)	阳性, 喜温湿气候	花黄白色, 6~7 月	庭植观赏
265	朱蕉●	Cordyline fruticosa	龙舌兰科	3	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	强阳性, 喜温暖至高温湿润气候, 怕涝	植株清秀, 叶色艳丽	观叶植物
落 叶 阔 叶 树								
266	银杏●	Ginkgo biloba	银杏科	40	沈阳以南、华北至华南 (Ⅲ~Ⅶ)	阳性, 耐寒, 深根, 不耐积水, 抗多种有毒气体。	树干端直高大, 树姿优美, 叶形美观, 秋季变黄	庭荫树、行道树
267	鹅掌楸 (马褂木)●	Liriodendron chinense	木兰科	40	长江流域及其以南地区 (Ⅴ~Ⅷ)	阳性, 喜温暖湿润气候, 抗性较强, 肥沃的酸性土, 生长迅速, 寿命长	叶形似马褂, 花黄绿色, 花大而美丽, 花期 4~6 月	庭荫树、行道树
268	美国鹅掌楸	Liriodendron tulipifera	木兰科	60	华东、西南 (Ⅵ、Ⅶ)	阳性, 喜温暖湿润气候, 抗性较强, 肥沃的酸性土, 生长迅速, 寿命长	花淡黄绿色, 花较大	庭荫树、行道树
269	杂种鹅掌楸●	L. chinense × L. tulipifera	木兰科	50	华北以南 (Ⅳ~Ⅶ)	阳性, 适应性强, 耐寒性较强	花淡黄绿色, 花较大	庭荫树、行道树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
270	天女花 ●	Magnolia sieboldii	木兰科	10	自辽宁至我国亚热带地区山谷阴坡(III~VI)	喜半阴	花朵洁白似玉, 芳香, 花期 5~6 月, 花梗细长, 果红色, 8~9 月	庭荫树
271	紫玉兰 ● (木兰)	Magnolia liliflora	木兰科	3~5	华北至华南、西南 (III~VIII)	阳性, 较耐寒	花大, 外紫内白, 3~4 月先叶开放	庭院观赏、丛植
272	白玉兰 (玉兰) ●	Magnolia denudata	木兰科	15~20	华北至华南、西南 (III~VIII)	阳性, 稍耐阴, 颇耐寒, 怕积水, 生长慢	树冠球形、长圆形, 花大而洁白, 花期 3~4 月, 芳香, 早春先叶而放	庭院观赏、对植、列植
273	二乔玉兰 ●	Magnolia × soulangeana	木兰科	6~10	华北至华南、西南 (III~VIII)	阳性, 耐寒, 耐旱	花白带淡紫色, 花期 3~4 月	庭院观赏
274	星花木兰 ●	Magnolia stellata	木兰科	5	华东、青岛(IV~VI)	阳性	花白色, 有香气, 早春叶前开放	庭荫树
275	厚朴	Magnolia officinalis	木兰科	20	中国中西部 (IV~VII)	阳性, 喜温凉气候及排水良好的酸性土	叶大荫浓, 白花美丽, 芳香, 4~5 月开花	庭荫树、观赏树
276	日本厚朴 ●	Magnolia obvata	木兰科	20	山东半岛、辽东半岛 (III、IV 东部)	阳性, 喜温凉湿润气候及排水良好的酸性土壤	小枝紫色, 花白色, 芳香, 6~7 月开花	庭荫树、行道树
277	凹叶厚朴	Magnolia officinalis ssp. biloba	木兰科	20	我国东南部 (IV~VI 东部)	中性偏阴, 喜凉爽湿润气候及肥沃排水良好的酸性土壤, 畏酷暑和干热	花白色, 芳香, 花叶同放	庭荫树、园景树
278	核桃楸 ●	Juglans mandshurica	胡桃科	20~25	东北、华北 (II、III)	阳性, 耐寒性强, 深根性, 抗风力强	树冠广卵形	庭荫树、行道树、用材林
279	核桃 ● (胡桃)	Juglans regia	胡桃科	25~30	华北、西北至西南 (III~VI、IX 南部)	阳性, 耐干冷气候, 不耐湿热, 防尘力强	树冠广圆形至扁球形	干果树、庭荫树、防护林
280	枫杨	Pterocarya stenoptera	胡桃科	30	华北至长江流域 (III~VI)	阳性, 适应性强, 耐水湿, 速生, 深根性		行道树、护岸树
281	薄壳山核桃 (长山核桃)	Carya illinoensis	胡桃科	55	华东 (VI 东部)	阳性, 喜温湿气候, 较耐水湿		庭荫树、行道树
282	麻栎 ●	Quercus acutissima	山毛榉科	25~30	辽南、华北至华南 (III~VII)	阳性, 适应性强, 耐干旱耐瘠薄。抗风力强, 生长快		庭荫树、用材林
283	栓皮栎 ●	Quercus variabilis	山毛榉科	25~30	辽宁至华南西南、西北 (III~VII、IX)	阳性, 耐寒、耐干旱瘠薄, 深根性, 抗风力强, 不耐移植, 不耐水湿	树干通直, 树冠雄伟, 浓荫如盖, 秋叶橙褐色	庭荫树、防风、防火树种

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
284	辽东栎●	Quercus liaotungensis	山毛榉科	15	东北至黄河流域 (II~IV)	喜光, 耐寒, 抗旱	绿荫浓密	庭荫树
285	小叶栎	Quercus chenii	山毛榉科	30	长江中下游地区 (VI)	喜光, 喜深厚肥沃的中性至酸性土壤, 生长速度中等		用材林
286	槲树	Quercus dentate	山毛榉科	20~25	东北南部至华中、西北、西南(II-VI、IX)	阳性, 稍耐阴, 耐寒、耐旱, 深根性, 耐火力强, 抗烟尘及有害气体	树冠椭圆形, 枝叶茂密, 叶形美丽, 秋季变红色	庭荫树
287	槲栎	Quercus aliena	山毛榉科	20~25	华北、华南、西南 (III~VII)	阳性, 稍耐阴, 耐干旱瘠薄	秋叶橙褐色	庭荫树
288	板栗	Castanea mollissima	山毛榉科	15~20	辽、华北至华南、西南 (III~VII)	阳性, 适应性强, 深根性, 根系发达, 耐修剪	枝叶稠密, 树冠扁球形	庭荫树、果树
289	响叶杨	Populus adenopoda	杨柳科	30	长江及淮河流域 (IV、V)	喜光, 喜温暖湿润, 生长快		造林树种
290	毛白杨	Populus tomentosa	杨柳科	30	自华北、西北至长江下游(II-V、IX南部)	阳性, 喜温凉气候, 抗污染, 深根性, 速生, 寿命较长	树形端正, 树干挺直, 树皮灰白色	行道树、防护林、庭荫树
291	银白杨	Populus alba	杨柳科	15~30	西北、华北、辽、藏 (III、IX~XI)	阳性, 适应寒冷干燥气候, 耐旱	树冠卵圆形, 树干白色, 叶背银白色	风景林、行道树、庭荫树
292	新疆杨	Populus alba cv. Pyramidalis	杨柳科	30	西北, 华北 (III、IX、X)	阳性, 耐大气干旱及盐渍土, 深根性, 抗风力强	树冠圆柱形, 干白色	风景树、行道树、防护林
293	香杨	Populus koreana	杨柳科	30	东北(II、III北部)	阳性, 喜温凉气候, 耐水湿	树冠广圆形, 小枝及芽分泌粘性树脂, 有香气	庭荫树、风景林
294	小叶杨	Populus simonii	杨柳科	20	东北、华北、华中 (II~IV、IX)	阳性, 耐干旱瘠薄, 耐寒, 根系发达, 抗风力强	树冠广卵形	防护林、风景林、行道树
295	箭杆杨	Populus nigra cv. Afghanica	杨柳科	30	黄河中上游一带 (IX)	阳性, 耐寒, 抗大气干旱, 稍耐盐碱	树冠窄圆柱形	风景林、行道树、庭荫树、防护林
296	河北杨	Populus hopeiensis	杨柳科	30	华北、西北 (III、IX)	阳性, 耐干旱, 怕涝	树皮灰白, 树冠园整, 枝叶清秀	风景林、行道树、庭荫树
297	钻天杨	Populus nigra var. italica	杨柳科	30	东北南部、华北、西北 (III、IX)	阳性, 耐寒, 耐干旱, 稍耐盐碱、水湿, 生长快	树冠狭圆柱形	风景林、行道树、庭荫树、护堤树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
298	辽杨	Populus maximowiczii	杨柳科	30	东北南部、内蒙、河北 (III、IX)	阳性，稍耐阴，耐寒，生长快	树皮灰绿色	风景林
299	青杨	Populus cathayana	杨柳科	30	辽、华北、西北、西南 (VI西部、III、IX)	阳性，喜温凉气候，耐干冷，深根性，生长快	春天发叶早，干灰色，树冠卵形	防护林、行道树、风景树
300	小青杨	Populus pseudo-simonii	杨柳科	20	东北 (II、III北部)	阳性，喜温凉气候，耐干冷，生长快，耐修剪，适应性强	干皮较光滑，灰白色	防护林、行道树、风景树
301	胡杨	Populus euphratica	杨柳科	25	西北 (IX、X)	喜光，耐大气干旱及寒冷、干热气候，抗盐碱和风沙	秋叶黄色	造林树种
302	滇杨	Populus yunnanensis	杨柳科	20~25	我国西南部 (VI西部)	喜温凉气候，较耐湿热，喜水湿	树形美观，端直高大	庭荫树、行道树
303	山杨	Populus davidiana	杨柳科	25	东北及黄河流域 (II~IV、IX)	喜光，耐寒性强，耐干旱瘠薄，根系发达，抗风力强	幼叶红艳美丽	山地造林
304	垂柳	Salix babylonica	杨柳科	18	长江流域至华南地区 (V、VI、VII)	阳性，喜温暖及水湿，耐旱，速生	树冠倒卵形，枝细长下垂	行道树、风景树、庭荫树
305	旱柳 (柳树)	Salix matsudana	杨柳科	20	东北、华北、西北 (II~IV、IX、X)	阳性，耐寒，耐旱，耐水湿，速生	树冠广卵形或倒卵形	防护林、行道树、风景树、庭荫树，早春蜜源植物
306	龙爪柳	Salix matsudana cv. tortuosa	杨柳科	12	东北、华北、西北 (II~IV、IX)	阳性，耐寒，生长势较弱，寿命短，抗污染	树冠长圆形，枝条扭曲如游龙	对植
307	馒头柳	Salix matsudana cv. Umbraculifera	杨柳科	15	东北、华北、西北 (II~IV、IX、X)	阳性，耐旱，耐寒，耐湿，速生	树冠半球形	行道树、风景树、庭荫树
308	绦柳	Salix matsudana cv. Pendula	杨柳科	20	东北、华北、西北 (II~IV、IX、X)	阳性，耐旱，耐寒，耐湿，速生	小枝下垂	
309	河柳 (大叶柳)	Salix chaenomeloides	杨柳科	10	辽南、黄河中下游至长江中下游 (III~VI)	喜光，耐寒，喜水湿	嫩叶常发紫红色	护岸树
310	白柳	Salix alba	杨柳科	20~25	西北 (IX、X)	适应性强，抗寒，抗热，耐盐碱和水涝，生长迅速		行道树、防护林，早春蜜源植物
311	杞柳	Salix integra	杨柳科	1~3	东北 (II)	喜光，耐水湿，耐修剪	小枝浅黄色或淡红色，叶正面暗绿色，背面苍白色，花序优美	护岸树、风景林
312	蒙古柳 (筐柳)	Salix linearistipularis	杨柳科	2~4	东北、内蒙 (II、IX)	喜光，喜湿润，稍耐盐碱，耐修剪		湿地绿化

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
313	银芽柳	<i>Salix leucopithecia</i>	杨柳科	2~3	华东(IV~VI东部)	阳性	雄花序盛开前密被银白色绢毛	春节前后供观赏
314	华榛	<i>Corylus chinensis</i>	榛科	30~40	华中至西南(IV~VI)	喜光, 喜温暖湿润气候及中性酸性土壤	树形高大雄伟	园景树、庭荫树
315	鹅耳枥	<i>Carpinus turczaninowii</i>	榛科	5~15	东北南部、华北至西南各省(III~VI)	耐阴, 喜中性及石灰质土壤	枝叶茂密, 叶形秀丽, 幼叶亮红色	庭植观赏、盆景
316	千斤榆	<i>Carpinus cordata</i>	榛科	18	东北至华北、西北(II~IV、IX)	稍耐阴, 喜中性土壤, 耐瘠薄	枝叶茂密, 叶形秀丽, 果穗奇特	风景林、园景树
317	江南桤木	<i>Alnus trabeculosa</i>	桦木科	20	长江下游以南地区(VI)	喜光, 喜湿润肥沃土壤, 生长快	具根瘤菌	湿地造林树种, 改良土壤
318	桤木(水冬瓜、水青岗)	<i>Alnus cremastogyne</i>	桦木科	40	川中、黔北(VI)	喜光喜湿润气候及水湿, 耐干旱瘠薄, 根系发达, 具根瘤菌		水滨绿化, 改良土壤
319	赤杨	<i>Alnus japonica</i>	桦木科	20~25	东北南部至长江以北地区(III~V)	喜光, 耐水湿, 生长快	树形圆整, 具根瘤和菌根	水边湿地绿化, 护岸树, 改良土壤
320	毛赤杨(辽东桤木)	<i>Alnus sibirica</i>	桦木科	15~20	东北及山东崂山(II~IV)	喜光, 生于湿润地带	冠大, 树皮光滑灰褐色	庭荫树、河岸绿化
321	白桦	<i>Betula platyphlla</i>	桦木科	20~25	东北, 华北高山(II、III北部)	阳性, 耐严寒, 喜酸性土, 耐瘠薄及水湿, 速生	枝叶扶疏, 姿态优美, 树皮光滑洁白	庭荫树、风景林
322	风桦	<i>Betula costata</i>	桦木科	30	东北, 河北北部(II、III)	较耐阴, 喜肥沃土壤	树皮黄褐色, 薄片剥落	风景林
323	青檀	<i>Pteroceltis tatarinowii</i>	榆科	20	黄河及长江流域(IV~VI)	喜光, 稍耐阴, 耐干旱瘠薄, 喜生石灰山地, 根系发达, 寿命长		庭荫树
324	大果榆	<i>Ulmus macrocarpa</i>	榆科	10~20	东北、华北(II、III)	阳性, 耐干旱瘠薄, 稍耐盐碱, 根系发达, 寿命长	秋叶红褐色	风景林
325	榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i>	榆科	15	华北中南部至华东、中南及西南(IV~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 耐干旱瘠薄, 深根性, 生长速度中等, 寿命长, 抗烟尘及毒气, 滞尘能力强	树形及枝态优美	庭荫树、行道树、观赏树、盆景
326	榆树(白榆)	<i>Ulmus pumila</i>	榆科	20~25	东北、内蒙, 华北至长江流域(II~VI、IX)	阳性, 适应性强, 耐旱, 耐盐碱土	树冠球形	庭荫树、行道树、东北作绿篱

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
327	垂枝榆	Ulmus pumila cv.Pendula	榆科	2~3	东北、西北、华北 (II ; III、IX、X)	阳性，耐干旱瘠薄	枝下垂，树冠伞形	庭植、园路树
328	圆冠榆	Ulmus densa	榆科	15	西北 (IX、X)	阳性，适应性强	树冠球形	行道树
329	欧洲白榆 (大叶榆)	Ulmus laevis	榆科	35	东北、华北、西北 (II、III、IX、X)	阳性，要求土壤深厚的沙壤土， 抗病虫能力强，深根性	树冠半球形	行道树、庭荫树
330	春榆	Ulmus japonica	榆科	40	东北至华中、华东， 西北 (II~V、IX)	喜光，耐寒，适应性强	树冠广卵形	庭荫树、行道树
331	朴树	Celtis tetrandra ssp.sinensis	榆科	20	江淮流域至华南 (IV~VII)	弱阳性，喜温暖，抗烟尘及毒气， 耐轻盐碱土，深根性，抗风能力 强， 生长慢，寿命长	冠大荫浓，果橙红色或红褐 色	庭荫树、防护林、 行道树
332	大叶朴	Celtis koraiensis	榆科	12	辽宁、华北、西北 (III、IV、IX南部)	阳性	核果球形，橙色	庭荫树、行道树
333	珊瑚朴	Celtis julianae	榆科	25	长江流域 (V、VI)	弱阳性，喜生于湿润的溪谷和坡 地，耐干旱，深根性，生长较快	冬季及早春枝上生满红褐 色花絮	庭荫树、行道树
334	小叶朴	Celtis bungeana	榆科	15~20	东北南部、华北， 长江流域及西南 各地 (III~VI)	中性，耐寒，耐干旱，抗有毒气 体，生长慢，寿命长	枝叶茂密，树形美观，树皮 光滑，果紫黑色	庭荫树、行道树
335	光叶榉	Zelkova serrata	榆科	20	东北南部至华中、华 东、西南 (III~VI)	喜光，喜肥沃湿润土壤，在石灰 岩谷地生长良好	秋叶变黄色，古铜色或红色	庭荫树
336	榉树	Zelkova schneideriana	榆科	15	我国中部至南部， 东部 (V~VII)	弱阳性，喜温暖，抗风，耐烟尘， 深根性，抗病虫害	树形优美，枝叶细密	庭荫树、行道树、 园景树、盆景
337	小叶榉	Zelkova sinica	榆科	15	我国中部、东部 (V~VI)	喜生于石灰质土壤	树形优美，枝叶细密	庭荫树、行道树、 园景树、盆景
338	山桐子	Idesia polycarpa	大风子 科	15	华东、华中、西北、 西南 (V~VI)	阳性	树冠端整，干皮灰白色，浆 果球形，红色，秋果可观	庭荫树、园景树
339	八角	Illicium verum	八角科	10~15	华南 (VII、VIII)	耐阴，喜微酸性土壤	树形美观	庭荫树
340	香椿	Toona sinensis	楝科	25	辽南至东南、西南 各省 (III~VI)	喜光喜肥沃土壤，较耐水湿，深 根性，萌蘖性强	树干通直，冠大荫浓	庭荫树、行道树、 特种经济林
341	红椿	Toona sureni	楝科	35	华南、滇南 (VII、 VIII)	阳性，速生		用材林

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
342	麻楝	Chukrasia tabularis	楝科	38	华南（Ⅶ、Ⅷ）	喜光，喜暖热气候及湿润肥沃土壤抗风，抗大气污染，生长快	树冠伞形，春末夏初开花，园锥顶生花序，花黄色带紫色	风景树、庭荫树、行道树
343	苦楝 (楝树)	Melia azedarach	楝科	15~20	华北南部至华南、西南（Ⅳ~Ⅶ）	阳性，喜温暖湿润气候，对土壤适应性较强，抗污染，生长快，寿命短	花萼紫色，5月，有香气，球形核果淡黄色，经冬不凋	庭荫树、行道树、防护树种
344	川楝	Melia toosendan	楝科	15~20	中部至西南部，华东（Ⅵ）	阳性，喜温暖湿润气候，生长快，抗污染，速生		庭荫树、行道树
345	南酸枣	Choerospondias axillaries	漆树科	30	长江以南及西南各地（Ⅵ~Ⅷ）	阳性，喜温暖，耐干旱，生长快	冠大荫浓	庭荫树、行道树，用材林
346	黄连木	Pistacia chinensis	漆树科	25~30	华北至华南、西南（Ⅳ~Ⅶ）	弱阳性，耐干旱瘠薄，抗污染	树冠开阔，枝叶茂密，秋叶橙黄或红色	庭荫树、行道树
347	黄栌	Cotinus coggygia	漆树科	8	华北、西南（Ⅲ~Ⅵ）	中性，喜温暖气候，耐寒、耐旱，怕涝	霜叶红艳美丽	庭院观赏、风景林
348	盐肤木	Rhus chinensis	漆树科	2~4	除东北北部的其他地区（Ⅲ~Ⅶ）	喜光，适应性强	秋叶红色	丛植观赏
349	火炬树	Rhus typhina	漆树科	8	东北南部，华北、西北（Ⅲ、Ⅸ南部）	阳性，适应性强，抗旱，耐盐碱	秋叶红艳	风景林、防护林
350	茶条槭	Acer ginnala	槭树科	6~9	东北、黄河流域至长江下游（Ⅱ~Ⅵ）	弱阳性，耐寒，抗烟尘	秋叶红色，翅果成熟前红色	绿篱、行道树
351	拧筋槭	Acer triflorum	槭树科	10	东北（Ⅱ）	喜光，喜湿润肥沃土壤	花黄绿色，花期4~5月，秋叶红色	风景林
352	元宝枫 (平基槭)	Acer truncatum	槭树科	10	东北、华北至黄河流域（Ⅲ~Ⅳ）	中性，喜温凉气候及侧方庇荫，深根性，抗风力强，生长速度中等，寿命长	树形优美，花黄绿色，春季开花，叶形秀丽，秋叶变黄色或红色	庭荫树、行道树、风景林
353	假色槭 (紫红槭)	Acer pseudo-sieboldianum	槭树科	8	东北（Ⅱ、Ⅲ东南部）	中性，喜温凉气候	花紫色，花期5~6月，翅果嫩时紫色，叶形秀丽	庭荫树
354	日本槭 (舞扇槭)	Acer japonicum	槭树科	9	华东、青岛（Ⅳ~Ⅵ东部）	喜光及湿润气候	花较大，紫红色，早春花叶同放，秋叶红色	庭荫树、园景树
355	羽叶槭 (复叶槭、糖槭)	Acer negundo	槭树科	20	东北、西北、华北、华中（Ⅱ~Ⅵ）	喜光，喜肥沃土壤及凉爽湿润气候，耐烟尘，耐干冷，耐轻盐碱，耐修剪，速生	花先叶开放，淡紫色，4~5月，翅果淡黄色，秋叶黄色	庭荫树、行道树、防护林
356	青榨槭	Acer davidii	槭树科	7~15	黄河流域至华东、中南及西南各地（Ⅳ、ⅤD）	耐半阴，喜湿润溪谷	入秋叶色黄紫，枝干绿色平滑有白色条纹	风景林

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
357	三角枫	Acer buergerianum	槭树科	20	长 江 流 域 各 地 (VI)	弱阳性, 喜温湿气候, 耐水湿, 耐修剪	秋叶暗红色	庭荫树、行道树、护岸树、绿篱
358	五角枫	Acer mono	槭树科	20	辽南、华北至长江流域 (III~VI)	弱阳性, 喜温凉湿润气候及雨量较多地区	秋叶变亮黄色	庭荫树、行道树、风景树
359	鸡爪槭	Acer palmatum	槭树科	6~7	河南至长江流域 (V~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候	树姿优美, 叶形秀丽, 秋叶红艳	庭荫树
360	羽毛枫	Acer palmatum cv. Dissectum	槭树科	6~7	河南至长江流域 (V、VI)	中性, 喜温暖气候, 不耐寒	树冠开展, 叶片细裂, 秋叶深黄至橙红色, 枝略下垂	庭院观赏、盆栽
361	红羽毛枫	Acer palmatum cv. Dissectum Ornatum	槭树科	6~7	河南至长江流域 (IV~VI)	中性, 喜温暖气候, 不耐寒, 不耐水湿	叶古铜红色, 古铜色	庭院观赏、盆栽
362	红枫	Acer palmatum cv. Atropurpureum	槭树科	6~7	河南至长江流域 (IV~VI)	中性, 喜温暖气候, 不耐寒, 不耐水湿	叶常年红色或紫红色	庭院观赏、盆栽
363	三峡槭	Acer wilsonii	槭树科	10~15	长江流域至华南 (VI、VII)	中性	树皮暗棕色, 光滑。花黄绿色, 近白色	庭荫树、风景林
364	金钱槭	Dipteronia sinensis	槭树科	16	西南、华中 (V、VI)	中性, 喜温暖气候, 不耐寒, 不耐水湿	翅果状似铜钱, 熟时果翅变红	风景林、庭荫树
365	泡桐	Paulownia fortunei	玄参科	20~25	自辽至粤, 黄河流域为分布中心(III~IV)	阳性, 喜温暖气候, 不耐寒, 速生, 抗污染	花白色, 花期 3~4 月	庭荫树、行道树
366	楸叶泡桐	Paulownia catalpifolia	玄参科	20	山东、河南 (IV)	阳性, 较耐干旱瘠薄, 速生	树冠圆锥形, 花白色或淡紫色	庭荫树
367	毛泡桐(紫花泡桐)	Paulownia tomentosa	玄参科	15~25	黄河中下游至淮河流域 (IV、V)	强阳性, 喜温暖, 较耐寒, 耐盐碱, 速生	花鲜紫色, 内有紫斑及黄条纹, 花期 4~5 月, 先叶而放	庭荫树、行道树
368	木本香薷	Elsholtzia stauntoni	唇形科	1	华北、西北 (III、IV、IX)	阳性	叶具薄荷香气, 花淡紫色, 8~10 月开花	庭院观赏
369	美国木豆树(紫薇楸)	Catalpa bignonioides	紫葳科	15~20	华东 (V、VI)	喜光, 喜温暖湿润气候, 适应性强, 树势强健, 生长快, 怕涝	叶大荫浓, 花白色, 喉部黄色具紫斑, 花期 6 月, 有香气	庭荫树、行道树
370	灰楸	Catalpa fargesii	紫葳科	18	华北、西北、华南、西南(IV~VII、IX南部)	喜光, 稍耐阴, 速生	花粉红色或淡紫色, 喉部有红褐色及黄色条纹, 春季开花	速生用材林
371	梓树	Catalpa ovata	紫葳科	15~20	黄河中下游地区 (IV)	弱阳性, 适生于温带地区, 抗污染, 浅根性, 生长快	树冠球形, 叶大荫浓。花淡黄色, 花期 5~6 月, 美丽	庭荫树、行道树、防护林

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
372	楸树	Catalpa bungei	紫葳科	20~30	黄河流域至淮河流域 (Ⅳ、Ⅴ)	弱阳性, 喜温和气候, 抗污染, 不耐干旱瘠薄和水湿	树冠长圆形, 干直荫浓。花白色有紫斑, 大而美观, 花期5月	庭荫树、行道树、防护林
373	黄金树	Catalpa speciosa	紫葳科	25~30	华东 (Ⅴ、Ⅵ)	阳性	花白色, 内有紫斑及黄色条纹, 花期 5~6 月	庭荫树、行道树
374	蓝花楹	Jacaranda acutifolia	紫葳科	15	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	阳性, 喜高温干燥气候, 抗风, 耐干旱, 不耐寒	树冠伞形, 花先叶开放, 花蓝色美丽, 夏初和秋季两次开花	园景树、行道树、木本花卉
375	黄檗 (黄波罗)	Phellodendron amurense	芸香科	15~22	东北至华北北部 (Ⅱ、Ⅲ)	阳性, 耐寒, 深根性, 抗风, 萌芽力强耐火烧, 生长慢	树皮木栓层发达, 枝叶茂密, 树形美观	庭荫树、行道树
376	臭檀	Evodia deniellii	芸香科	15	辽南、华北至湖北, 西至甘肃 (Ⅲ~Ⅵ、Ⅸ南部)	阳性, 耐盐碱, 抗海风, 深根性	果红色, 秋叶鲜黄	风景林
377	花椒	Zanthoxylum bungeanum	芸香科	3~7	东北南部至华南、西北 (Ⅲ~Ⅶ、Ⅸ)	喜光, 喜肥沃湿润的钙质土	果实辛香	庭院刺篱、丛植
378	枸桔 (枳)	Poncirus trifoliata	芸香科	7	黄河流域至华南 (Ⅳ~Ⅶ)	喜光, 喜温暖湿润土壤, 有一定耐寒性, 耐干旱及盐碱, 耐修剪	花白, 花期 4 月, 果黄绿色, 有香气	庭植、刺篱、丛植
379	合欢	Albizia julibrissin	含羞草科	16	华北至华南 (Ⅲ~Ⅷ)	阳性, 耐寒, 耐干旱瘠薄, 不耐水湿, 对有害气体及烟尘抗性强	树冠扁球形, 花粉红色, 花期 6~7 月, 清香	行道树、庭荫树
380	楹树	Albizia chinensis	含羞草科	20~30	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光, 耐半阴, 喜温暖湿润气候, 不抗风	树冠开展, 花冠黄绿色, 春末夏初开花, 叶片纤细	庭荫树、风景树
381	翅荚香槐	Cladrastis platycarpa	蝶形花科	16~20	长江以南至华南 (Ⅵ、Ⅶ)	喜光, 喜酸性土	花白色, 花期 6~7 月, 荚果两侧有窄翅	庭荫树
382	紫檀	Pterocarpus indicus	蝶形花科	15~30	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光, 喜高温高湿气候, 适应性强, 耐干旱, 抗风	树冠开阔, 花黄色, 芳香, 春夏开花	园景树、行道树、庭荫树
383	刺桐	Erythrina orientalis	蝶形花科	10~20	华南 (Ⅶ、Ⅷ)	喜光, 喜高温高湿气候, 耐干旱, 抗海潮, 抗风, 抗大气污染	枝叶茂密, 树姿扶苏, 花红色, 春末夏初先叶开放	行道树、庭荫树
384	紫穗槐	Amorpha fruticosa	蝶形花科	2~4	南北各地 (Ⅲ~Ⅵ)	阳性, 耐水湿, 干旱瘠薄和轻盐碱土, 抗污染	花暗紫, 花期 5~6 月	护坡固堤、林带下木、防护林
385	锦鸡儿	Caragana sinica	蝶形花科	2	华北至长江流域 (Ⅲ~Ⅵ、Ⅸ)	中性, 耐寒, 耐干旱瘠薄	花橙黄, 花期 4 月	庭院观赏、岩石园、盆景

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
386	树锦鸡儿 ●	Caragana arborescens	蝶形花 科	2~5	东北、西南、西北 (II~VI、 IX、 X)	喜光，耐寒，耐干旱瘠薄，抗风沙	花黄色，花期 5~6 月	绿篱、庭植观赏
387	金雀锦鸡 儿 ●	Caragana rosea	蝶形花 科	1~2	我国北部(II~IV、 IX、 X)	喜光，耐干旱瘠薄	花鲜黄色，花期 6 月	绿篱、庭植观赏
388	小叶锦鸡 儿 ●	Caragana microphylla	蝶形花 科	1~3	东北、华北、西北 (II、 III、 IX、 X)	喜光，耐干旱瘠薄	花黄色，花期 5~6 月	绿篱、庭植观赏、 水土保持树种
389	北京锦鸡 儿 ●	Caragana pekinensis	蝶形花 科	2	华北 (III~IV)	喜光，耐干旱瘠薄	花黄色，花期 5 月	绿篱、庭植观赏
390	胡枝子 ●	Lespedeza bicolor	蝶形花 科	1~2	东北至黄河流域 (II~IV)	阳性，耐寒，耐干旱瘠薄	花紫红，花期 7~9 月	庭院观赏、护坡、 林带下木
391	多花胡枝 子 ●	Lespedeza floribunda	蝶形花 科	0.6~1	东北南部至长江 流域 (III~VI)	阳性，抗风沙，耐干旱瘠薄	花紫红，花期 8~9 月	庭植观赏、水土 保持树种
392	刺槐 ●	Robinia pseudoacacia	蝶形花 科	25	东北南部至长江 流域、西北(III~ VI、 IX、 X)	阳性，适应性强，浅根性，生长快	树冠椭圆状，倒卵形，花白 色 5 月，有香气	庭荫树、行道树、 防护林，蜜源植物
393	无刺刺槐	Robinia pseudoacacia cv. Inermis	蝶形花 科	25	青岛、大连、沈阳 (III)	阳性，适应性强，浅根性，生长快	树冠扫帚状，倒卵形，花白 色，有香气，花期 5 月	庭荫树、行道树
394	红花洋槐 ●	Robinia pseudoacacia cv. Decaisneana	蝶形花 科	15~20	东北南部至长江 流域 (III~VI)	阳性，适应性强，浅根性，生长快	树冠椭圆状，倒卵形，花紫 红色，花期 5 月	庭荫树
395	江南槐	Robinia hispida	蝶形花 科	10	华北 (III~VI)	阳性，耐干旱瘠薄	花粉红色，淡紫色，花期 6~7 月，落叶灌木，多高接在刺槐上	风景林
396	国槐 ●	Sophora japonica	蝶形花 科	25	华北、西北至长江 流域 (III~VI、 IX)	阳性，耐寒，抗性强，耐修剪。	枝叶茂密，树冠球形，花黄 绿，花期 7~8 月	庭荫树、行道树
397	龙爪槐 ●	Sophora japonica cv. Pendula	蝶形花 科	2~4	华北、西北至长江 流域 (III~VI、 IX)	阳性，稍耐阴，耐寒	树冠伞形，枝下垂，花黄白	庭植
398	朝 鲜 槐 (山槐) ●	Maackia amurensis	蝶形花 科	25	东北、河北、山东 (II、 III)	喜光，稍耐阴，耐寒	花白色，花期 7~8 月	行道树、庭荫树
399	美国皂荚 (三刺皂荚)	Gleditsia triacanthos	蝶形花 科	45	华东 (IV~VI、 IX)	阳性，喜深厚排水良好的土壤， 寿命长	秋叶黄色美丽	庭荫树、园景树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
400	皂荚●	<i>Gleditsia sinensis</i>	蝶形花科	30	华北至华南 (III~VII)	阳性, 稍耐阴, 耐寒, 耐干旱, 抗污染力强, 适应各种土壤	树冠广阔, 叶密荫浓	庭荫树、抗污树种
401	山皂荚●	<i>Gleditsia japonica</i>	蝶形花科	15~20	东北、华北至华东 (III~VI)	阳性, 耐寒, 耐干旱, 抗污染力强	树冠广阔, 叶密荫浓	庭荫树、防护林、树篱
402	紫荆●	<i>Cercis chinensis</i>	苏木科	2~4	华北、西北至华南 (III~VIII、IX南部)	阳性, 耐干旱瘠薄, 不耐涝	花紫红, 花期 3~4 月, 叶前开放, 老茎生花	庭院观赏、丛植
403	红花羊蹄甲●	<i>Bauhinia blakeana</i>	苏木科	5~10	华南 (VIII)	阳性, 喜高温湿润气候, 适应性强, 耐干旱瘠薄, 抗污染, 不抗风	花紫红色, 春秋两次盛花, 不结果, 夏季萌发新叶	风景树、行道树、庭荫树
404	羊蹄甲	<i>Bauhinia purpurea</i>	苏木科	10~12	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜暖热气候不耐寒, 耐干旱, 生长快	常绿, 花淡红, 粉红色或粉白色, 10 月, 能结果	风景树、行道树、庭荫树
405	洋紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科	6~8	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜暖热气候, 不耐寒	半常绿, 花粉红色或暗紫色, 春末, 花大美丽芳香, 能结果	风景树、行道树、庭荫树
406	金凤花●	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	苏木科	5	华南 (VIII)	强阳性, 喜高温湿润气候, 不抗风, 不耐干旱, 怕污染	植丛半球形, 花冠橙红色, 边缘金黄色, 全年可开花, 花似彩蝶	庭植观赏、木本花卉
407	凤凰木●	<i>Delonix regia</i>	苏木科	20	两广南部及滇南 (VIII)	阳性, 喜暖热气候, 不耐寒, 速生, 抗污染, 抗风	树冠伞形, 花红色美丽, 花期 5~8 月	庭荫树、行道树
408	黄槐●	<i>Cassia surattensis</i>	苏木科	7~10	华南 (VII、VIII)	阳性, 耐半阴, 喜高温多湿气候, 耐旱, 不抗风	枝叶茂密, 花鲜黄色, 全年开花	绿篱、行道树、园景树
409	腊肠树 (阿勃勒)●	<i>Cassia fistula</i>	苏木科	22	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜暖热气候	初夏满树金黄色花, 鲜叶开放, 荚果柱形如腊肠, 秋季成熟	风景树、庭荫树, 行道树
410	石榴●	<i>Punica granatum</i>	石榴科	2~7	黄河流域及其以南地区 (III南部~VII、IX南部)	阳性, 耐寒, 适应性强	花红色, 花期 5~6 月, 果红色	庭院观赏、果树
411	臭椿●	<i>Ailanthus altissima</i>	苦木科	20~30	华北、西北至长江流域 (III~VI、IX南部)	阳性, 耐干旱瘠薄、盐碱、抗污染, 不耐水湿, 深根性, 生长快, 少病虫害	树冠半球形, 树姿雄伟, 枝叶茂密, 春季嫩叶紫红色, 有些植株的翅果成熟前红褐色	庭荫树、行道树
412	细叶小檗	<i>Berberis poiretii</i>	小檗科	1~2	西北、华北、东北 (II~IV、IX、X)	喜光, 耐旱, 耐寒	花黄色, 花期 5~6 月	绿篱、庭院观赏
413	小檗●	<i>Berberis thunbergii</i>	小檗科	1.5~2	华北、西北、长江流域 (III~VI、IX)	中性, 耐寒, 耐修剪	花淡黄, 花期 5 月, 秋果红色, 秋叶红色	庭院观赏、绿篱

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
414	紫叶小檗 ●	Berberis thunbergii cv. Atropurpurea	小檗科	0.5~1	华北, 西北, 长江流域 (III~VI、IX)	中性, 耐寒, 要求阳光时, 叶色方呈紫红色	叶常年紫红, 秋果红色	庭院观赏、丛植
415	金花小檗	Berberis wisoniae	小檗科	1	西南 (VI南部)	中性	花金黄色, 花期 5 月, 浆果红色, 秋叶亮红色	庭植观赏
416	构树	Broussonetia papyrifera	桑科	16	黄河流域至西南、华南各地 (III~VII)	阳性, 抗污染, 耐干旱瘠薄, 适应性强, 不择土壤, 生长迅速	聚花果球形, 熟时桔红色, 易招苍蝇	工矿区绿化
417	柘树 ●	Cudrania tricuspidata	桑科	10	河北南部、华东、中南、西南各地 (III~VI)	阳性, 适应性强, 喜钙树种, 耐干旱瘠薄		庭荫树、绿篱、水土保持树种
418	桑树 ●	Morus alba	桑科	15	辽宁以南各地 (III~VI)	阳性, 适应性强, 抗污染, 抗风, 耐盐碱	秋叶黄色, 果可食	庭荫树
419	龙爪桑 ●	Morus alba cv. Tortulsa	桑科	23	辽宁以南城市 (III~VI)	阳性, 适应性强, 抗污染, 抗风, 耐盐碱	枝条扭曲如游龙	庭植观赏
420	鸡桑 ●	Morus australis	桑科	8	辽东、华北、华中、西南 (III~VI)	阳性, 耐旱, 耐寒, 怕涝, 抗风		庭荫树
421	蒙桑	Morus mongolica	桑科	3~5	东北、华北、华中、西南 (II~VI)	阳性, 耐旱, 耐寒, 怕涝, 抗风		庭荫树
422	无花果 ●	Ficus carica	桑科	12	长江流域及其以南地区 (V~VIII)	中性, 喜温暖气候, 不耐寒, 抗污染	树冠球形, 叶果美丽	庭院观赏、高篱
423	黄 葛 树 (大叶榕) ●	Ficus virens var. sublaceolata	桑科	10~25	华南、西南 (VI西部、VII、VIII)	阳性, 喜温暖至高温湿润气候, 耐瘠薄, 抗风, 抗大气污染	树冠宽阔, 夏秋叶色翠绿	庭荫树、行道树、风景树
424	无患子 ●	Sapindus mukorossi	无患子科	20~25	长江流域及其以南地区 (V~VIII)	弱阳性, 喜温湿, 不耐寒, 深根性, 抗风, 不耐修剪, 生长快, 寿命长, 抗SO ₂	树冠广圆形, 树荫稠密, 秋叶金黄	庭荫树、行道树
425	栾树 ●	Koelreuteria paniculata	无患子科	15	辽宁、华北至长江下游 (III~VI)	阳性, 较耐寒, 耐干旱, 抗烟尘, 耐短期水浸	花金黄, 花期 6~8 月。果桔红色, 9 月。秋叶橙黄色	庭荫树、行道树
426	复羽叶栾树 ●	Koelreuteria bipinnata	无患子科	20	中南及西南 (VI)	喜光, 喜温暖湿润气候, 深根性, 适应性强, 耐干旱, 抗风, 抗大气污染, 速生	树冠伞形, 花黄色, 花期 7~9 月。蒴果秋天变红色, 艳丽	庭荫树、风景树
427	全缘叶栾树	Koelreuteria bipinnata var. integrifoliola	无患子科	17	长江以南地区 (VI、VII)	喜光, 喜温暖湿润气候, 深根性, 速生	花黄色, 花期 8~9 月。蒴果秋天变淡红色	庭荫树、风景树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
428	文冠果●	Xanthoceras sorbifolia	无患子 科	3~5	东北、西北、华北 (II、III、IX)	喜光, 耐严寒, 耐干旱及盐碱, 不耐水湿, 深根性, 萌蘖力强	4~5 月白花满树, 与秀丽绿 叶相称	庭院观赏
429	紫花文冠 果	Xanthoceras sorbifolia cv. Purpurca	无患子 科	3~5	东北、西北、华北 (II、III、IX)	喜光, 耐严寒, 耐干旱及盐碱, 不耐水湿, 深根性, 萌蘖力强	4~5 月开紫花	庭院观赏
430	牡丹	Paeonia suffruticosa	芍药科	2	西北、华北至长江流 域 (III~VI、IX南部)	中性, 耐寒, 要求排水良好土壤	花白、粉、红、紫, 4~5 月	庭院观赏
431	悬铃木● (英桐)	Platanus × acerifolia	悬铃木 科	30~35	华北南部至长江 流域 (IV~VI)	阳性, 喜温暖, 抗污染, 耐修剪	树冠阔球形, 冠大荫浓	庭荫树、行道树
432	杜仲●	Eucommia ulmoides	杜仲科	20	华北南部至长江 流域 (III南部~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 较耐寒, 适应性强, 不择土壤	树冠球形, 枝叶茂密	庭荫树、行道树
433	大花溲疏 ●	Deutzia grandiflora	山梅花 科	2~3	长江流域各地 (V、VI)	弱阳性, 喜温暖, 耐寒性不强	花白色, 花期 5~6 月	庭院观赏、丛植、 花篱
434	溲疏●	Deutzia scabra	山梅花 科	1~2	华北南部至长江 流域 (IV~VI)	喜光稍耐阴, 喜温暖湿润气候, 萌蘖性强, 耐修剪	花白色, 花期 6~7 月	花篱、基础种植、 岩石园
435	香茶藨子 ●	Ribes odoratum	茶藨子 科	1~2	东北、华北 (II、III)	弱阳性, 耐寒, 喜肥沃土壤	花黄色, 4~5 月, 浆果球形, 黑色	庭院观赏
436	东陵八仙 花●	Hydrangea bretschneideri	八仙花 科	4	黄河流域 (IV)	喜光, 稍耐阴, 喜酸性土	伞房花序, 初开时白色, 后 变淡紫色, 6~7 月	庭植观赏
437	大花园锥 绣球	Hydrangea paniculata cv. Grandiflora	八仙花 科	10	华北至长江流域 (II~VI)	喜阴湿	花大, 初开时为白色后变成 浅粉色, 花期 8~9 月	庭植观赏
438	山梅花	Philadelphus incanus	山梅花 科	3~5	华北、华中、西北 (III~V、IX)	弱阳性, 较耐寒, 耐旱, 怕水湿	花白色, 花期 5~6 月	庭院观赏、丛植、 花篱
439	太平花●	Philadelphus pekinensis	山梅花 科	1~3	东北南部、华北、 西北 (III、IV、IX)	弱阳性, 耐寒, 怕涝	花白色, 花期 5~6 月	庭院观赏、丛植、 花篱
440	白鹃梅	Exochorda racemosa	蔷薇科	5	华北至长江流域 (III~VI)	弱阳性, 适应性强, 耐干旱瘠薄, 较耐寒	枝叶秀丽, 4~5 月开花, 洁白美丽	庭院观赏、丛植
441	笑靥花	Spiraea prunifolia	蔷薇科	3	长江流域及其以 南地区 (V、VI、 VII)	阳性, 喜温暖湿润气候	花小, 白色美丽, 花叶同放	庭院观赏、丛植

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
442	珍珠花 ●	Spiraea thunbergii	蔷薇科	1.5	东北南部、华北至华南 (III~VII)	阳性, 喜湿润排水良好的土壤	花小, 白色美丽, 3~4 月花叶同放, 早春繁华满枝, 秋季叶变桔红色	庭院观赏、丛植
443	珍珠绣球	Spiraea blumei	蔷薇科	2	自辽宁、内蒙至两广 (III~VII、IX)	喜光, 耐干旱, 喜肥沃湿润、沙壤土	花白色, 伞形花序, 花期 4~5 月	庭院丛植
444	柳叶绣线菊	Spiraea salicifolia	蔷薇科	2	东北、内蒙及河北 (III、IX)	喜光, 耐寒, 喜肥沃湿润土壤, 不耐干旱瘠薄	花粉红色, 花期 6~8 月	庭院观赏
445	麻叶绣线菊 ●	Spiraea cantoniensis	蔷薇科	1.5	我国东部及南部 (III~VI)	中性, 喜温暖气候	花小, 白色美丽, 花期 4~5 月	庭植、花篱、地被
446	金焰绣线菊 ●	Spiraea × bumalda cv. Goldflame	蔷薇科	0.4~0.6	东北南部、华北 (III)	阳性, 稍耐阴, 耐寒, 耐盐碱, 耐旱。耐修剪, 怕涝	花小, 粉红色, 花期 6~9 月。树冠上部叶红色, 下部叶片黄绿色	庭植、花篱、地被
447	金山绣线菊 ●	Spiraea × bumalda cv. Goldmound	蔷薇科	0.4~0.6	自东北南部至华东 (III~VI)	喜光, 耐干燥气候, 耐盐碱, 忌水涝	花小, 粉红色, 花期 6~9 月, 叶金黄色	庭植、花篱、地被
448	菱叶绣线菊 ●	Spiraea × vanhouttei	蔷薇科	2	华北至华南、西南 (III~VII)	中性, 喜温暖气候较耐寒	花小, 白色美丽, 花期 4~5 月	庭院观赏、丛植
449	粉花绣线菊 ●	Spiraea japonica	蔷薇科	1.5	华北南部至长江流域 (III~VI)	阳性, 喜温暖气候	花粉红色, 花期 6~7 月	庭院观赏、花篱、丛植、花境
450	贴梗海棠 ●	Chaenomeles speciosa	蔷薇科	2	我国东部、中部至西南部 (III~VI)	阳性, 喜温暖气候, 较耐寒, 耐瘠薄, 不耐水湿	花粉、红或白, 3~4 月, 先叶而放, 簇生枝间。秋果黄色, 有香气	庭院观赏、花篱、基础种植
451	木瓜	Chaenomeles sinensis	蔷薇科	10	长江流域至华南 (IV~VII)	阳性, 喜温暖, 不耐低湿和盐碱土	花粉红, 花期 4~5 月。秋果黄色, 8~10 月, 浓香	庭院观赏
452	平枝栒子 ●	Cotoneaster horizontalis	蔷薇科	1~1.5	华北、西北至长江流域 (III~VI、IX)	阳性, 耐寒, 适应性强	匍匐状, 秋冬果鲜红	基础种植、岩石园
453	多花栒子 (水栒子) ●	Cotoneaster multiflorus	蔷薇科	4~5	华北、东北、西北、西南 (III~VI 西部、IX)	阳性, 耐干旱瘠薄, 耐修剪	花白色, 花期 5~6 月。秋果红色	果实能吸引鸟类, 丛植、孤植
454	甘肃山楂 ●	Crataegus kansuensis	蔷薇科	2.5~8	西北、西南 (II、III、IX、XI)	喜光, 较耐干旱	花白色, 花期 5 月。果桔红色, 9 月	丛植
455	山楂 ●	Crataegus pinnatifida	蔷薇科	2.5~8	东北南部、华北、华中 (III~V)	弱阳性, 耐寒, 耐干旱瘠薄土壤, 抗污染	花白色, 顶生伞房花序, 花期 5~6 月。秋红果	庭院观赏、园路树、果树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
456	金露梅 ●	Potentilla fruticosa	蔷薇科	0.5~1.5	东北、西北、西南(Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ西部、Ⅸ)	阳性, 耐寒, 耐旱	花金黄色, 花期 6~7 月	岩石园、丛植
457	山荆子 ●	Malus baccata	蔷薇科	6~14	东北至黄河流域 (Ⅱ~Ⅳ、Ⅸ)	喜光, 耐寒, 耐旱, 深根性, 寿命长	花白色或淡粉色, 花期 4~5 月。果熟时亮红色或黄色, 9~10 月	庭荫树
458	花红 ●	Malus asiatica	蔷薇科	6	西北、东北至长江流域 (Ⅱ~Ⅵ、Ⅸ)	阳性, 喜温凉气候及肥沃土壤, 耐寒, 耐碱	花粉红色, 开后变白。果黄色, 可食	果树、庭荫树
459	垂丝海棠 ●	Malus halliana	蔷薇科	5	华北南部至长江流域、西南 (Ⅲ~Ⅵ)	阳性, 喜温暖湿润, 耐寒性不强	花鲜玫瑰红色, 朵朵下垂, 深味美丽, 花期 4~5 月	庭院观赏、丛植
460	海棠果	Malus prunifolia	蔷薇科	8	东北、华北、西北 (Ⅱ~Ⅳ、Ⅸ)	阳性, 耐旱, 耐寒, 耐碱, 较耐水湿, 生长快, 深根性	花白, 花期 4~5 月。果红或黄, 9 月成熟	庭荫树、果树
461	海棠花	Malus spectabilis	蔷薇科	9	西北、华北、华中、华东 (Ⅱ~Ⅵ、Ⅸ)	喜光, 耐寒, 耐旱, 忌水湿	树态峭立, 枝条红褐色, 花在蕾时粉红色, 开后淡粉红至近白色, 花期 4~5 月, 果黄色	园景树
462	西府海棠 ●	Malus × micromalus	蔷薇科	5	辽宁、华北、西北 (Ⅲ、Ⅳ、Ⅸ)	喜光, 耐寒, 抗旱, 较耐盐碱和水湿	树态峭立, 花粉红色, 花期 4~5 月。8~9 月果熟	庭院观赏
463	湖北海棠	Malus hapehensis	蔷薇科	8~12	我国中部、西部 (Ⅳ~Ⅵ)	喜光, 喜暖湿气候, 根系浅, 较耐水湿	花蕾时红色, 开后白色, 有香气, 花期 4~5 月。果黄绿色稍带红晕	庭院观赏, 嫩叶可代茶
464	苹果 ●	Malus pumila	蔷薇科	15	华北南部至长江流域 (Ⅲ~Ⅵ、Ⅸ)	阳性, 喜冷凉干燥气候及肥沃深厚而排水良好的土壤	花白色带红晕, 花期 4~5 月	果树、庭荫树
465	杏 ●	Prunus armeniaca	蔷薇科	10	东北、华北至长江流域 (Ⅱ~Ⅵ)	阳性, 耐寒, 耐干旱, 不耐涝, 抗盐性较强	花粉红, 花期 3~4 月。果黄色, 6 月成熟	庭院观赏、风景林、果树
466	紫叶李 ●	Prunus cerasifera cv. Atropurpurea	蔷薇科	4	华北至华中、华东 (Ⅲ~Ⅶ)	阳性	叶紫红色, 花淡粉红色, 花期 3~4 月	庭院观赏, 丛植
467	麦李 ●	Prunus glandulosa	蔷薇科	1.5~2	华北至长江流域 (Ⅲ~Ⅵ)	阳性, 较耐寒, 适应性强	花粉、白, 花期 4 月。果红色	庭院观赏, 丛植
468	粉红重瓣麦李	Prunus glandulosa cv. Rosea Plena	蔷薇科	1.5~2	华北至长江流域 (Ⅲ~Ⅵ)	阳性, 较耐寒, 适应性强	花粉红色, 重瓣	庭院观赏, 丛植
469	郁李 ●	Prunus japonica	蔷薇科	1.5	东北、华北至华南 (Ⅱ~Ⅶ)	阳性, 耐寒, 耐干旱, 较耐水湿, 根系发达	花粉、白, 春天花叶同放, 果深红色	丛植, 果实可招引鸟类

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
470	毛樱桃●	Prunus tomentosa	蔷薇科	2~3	我国北部至西南 (Ⅱ~Ⅵ、Ⅸ)	喜光, 稍耐阴, 性强健, 耐寒耐干旱瘠薄	花粉白色, 花期4月。花叶同放, 果红色	果实可招引鸟类, 丛植
471	日本晚樱	Prunus lannesiana	蔷薇科	10	华北至长江流域 (Ⅲ~Ⅵ)	阳性, 喜温暖气候, 较耐寒	花粉红, 有香气, 花期4月	庭院观赏、风景林、行道树
472	山桃稠李●	Prunus maackii	蔷薇科	10~16	东北、华北、西北 (Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ)	喜光, 稍耐阴, 耐寒性强	树干红褐色至亮黄色, 花白色, 有清香, 花期5月。果熟时亮黑色, 8月	风景林
473	稠李●	Prunus padus	蔷薇科	13~15	东北、华北、西北 (Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ)	喜光, 稍耐阴, 耐寒性强, 喜肥沃湿润排水良好的土壤, 根系发达	花序长而美丽, 花白色, 有清香, 花期4~5月。果熟时亮黑色, 8~9月, 秋叶黄红色	果实可招引鸟类, 庭荫树
474	李●	Prunus salicina	蔷薇科	7	东北南部、华北至华中 (Ⅲ~Ⅵ)	喜光, 适应性强	花白色, 叶前开放	庭院观赏
475	东京樱花	Prunus × yedoensis	蔷薇科	15	华北南部至长江流域 (Ⅳ~Ⅵ)	阳性, 不耐烟, 对有害气体抗性较强	花粉、红、白, 花期4~5月	庭荫树、行道树
476	樱花●	Prunus serrulata	蔷薇科	10~15	东北、华北至长江流域 (Ⅲ~Ⅵ)	阳性, 较耐寒, 不耐粉尘和毒气	花粉白, 花期4月	庭院观赏、丛植、园路树
477	桃●	Prunus persica	蔷薇科	3~5	东北南部至广东、西北、西南 (Ⅱ~Ⅷ)	阳性, 较耐寒, 不耐水湿, 寿命短	花粉红色, 花期3~4月, 先叶而放	果树
478	碧桃●	Prunus persica cv. Duplex	蔷薇科	3~5	东北南部至广东、西北、西南 (Ⅲ~Ⅷ)	阳性, 较耐寒, 不耐水湿	花粉红色, 重瓣	观花灌木
479	白碧桃	Prunus persica cv. Alba Plena	蔷薇科	3~5	东北南部至广东、西北、西南 (Ⅲ~Ⅷ)	阳性, 较耐寒, 不耐水湿	花大白色, 近于重瓣	观花灌木
480	红碧桃	Prunus persica cv. Rubra Plena	蔷薇科	3~5	东北南部至广东、西北、西南 (Ⅲ~Ⅷ)	阳性, 较耐寒, 不耐水湿	同一树上有红白相间的花朵、花瓣或条纹, 近于重瓣	观花灌木
481	绛桃	Prunus persica cv. Camelliaeflora	蔷薇科	3~5	东北南部至广东、西北、西南 (Ⅲ~Ⅷ)	阳性, 较耐寒, 不耐水湿	花深红色, 半重瓣	观花灌木
482	绯桃	Prunus persica cv. Magnifica	蔷薇科	3	东北南部至广东、西北、西南 (Ⅲ~Ⅶ)	阳性, 较耐寒, 不耐水湿	花鲜红色, 重瓣, 花期略晚	观花灌木
483	紫叶桃●	Prunus persica cv. Atropurpurea	蔷薇科	3	东北南部至广东、西北、西南 (Ⅲ~Ⅶ)	阳性, 较耐寒, 不耐水湿	叶紫红色, 花单瓣或重瓣, 花色丰富	观花灌木

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
484	垂枝桃	Prunus persica cv. Pendula	蔷薇科	2~3	东北南部至广东、 西北、西南(III~VII)	阳性，较耐寒，不耐水湿	枝条下垂，花多重瓣，有白、 粉、红等颜色	观花灌木
485	山桃 ●	Prunus davidiana	蔷薇科	6~10	辽南至华北地区 (III、IX)	阳性，耐旱，耐寒，较耐盐碱， 忌水湿	早春叶前开花，花粉白色， 树皮暗紫色有光泽	早春观花灌木
486	榆叶梅●	Prunus triloba	蔷薇科	2~3	东北南部、华北、 西北 (III、IX)	阳性，稍耐阴，耐寒，耐干旱， 忌涝	花粉红色，单瓣或重瓣，密 集于枝条，先叶开放，4 月	庭院观赏、丛植、 列植
487	梅 ●	Prunus mume	蔷薇科	15	长江流域及以南 地区 (V、VI)	阳性，喜温暖气候，较耐旱，怕 涝，寿命长	花红、粉、白，芳香，花期 2~3 月	庭植观赏、片植、 盆景
488	垂枝梅	Prunus mume var. pendula	蔷薇科	3	长江流域及以南 地区 (V、VI)	阳性，喜温暖气候，较耐旱怕涝， 寿命长	枝自然下垂或斜垂，花有 红、分、白各色	庭植观赏、片植、 盆景
489	白梨 ●	Pyrus bretschnideri	蔷薇科	8	东北南部、华北、 西北(III、IV、IX)	阳性，喜干冷气候，耐寒，耐水 湿	花白色，花期 4 月	庭院观赏、果树
490	沙梨	Pyrus pyrifolia	蔷薇科	15	长江流域至华南、 西南 (VI、VII)	喜光，喜温暖湿润气候，耐旱， 耐水湿	花白色 3~4 月，果球形，黄 褐色	庭院观赏、果树
491	杜梨	Pyrus betulaefolia	蔷薇科	10	东北南部至长江 流域 (III~VI)	喜光，抗旱，耐寒，耐水湿，较 耐盐碱，深根性，寿命长	花白色，繁密，花期 4~5 月	庭荫树、防护林
492	鸡麻 ●	Rhodotypos scandens	蔷薇科	2~3	辽宁至华中，西北至 华东 (III~V、IX)	中性，喜温暖气候，较耐寒	花白色，花期 4~5 月	庭院观赏、丛植
493	珍珠梅 ●	Sorbaria kirilowii	蔷薇科	2~3	东北南部、华北、 西北 (III~V、IX)	耐阴，耐寒，对土壤要求不严， 萌蘖性强	花小而密，白色，花期 6~8 月	庭院观赏、丛植
494	东北珍珠 梅 ●	Sorbaria sobifolia	蔷薇科	2~3	东北、内蒙 (II、IX北部)	弱阳性，耐寒性强，耐修剪	花小而密，白色，花期 6~8 月	庭院观赏、丛植
495	黄刺玫 ●	Rosa hugonis	蔷薇科	3	华北、西北、东北 南部 (III、IX)	阳性，耐寒，耐干旱	花黄色，花期 4~5 月，果红 色	庭院观赏、丛植、 花篱
496	月季 ●	Rosa chinese	蔷薇科	2	东北南部至华南、 西南 (III~VII)	阳性，喜温暖气候，较耐寒	花红、紫，花期 5~10 月	庭植、丛植、盆 栽
497	现代月季	Rosa hybrida	蔷薇科	1	东北南部至华南、 西南 (III~VII)	阳性，喜温暖气候，较耐寒	花色丰富，花期 5~10 月	庭植、专类园、 盆栽
498	丰花月季 ●	Rosa hybrida Floribunda Roses	蔷薇科	1~2	东北南部至华南、 西南 (III~VII)	阳性，喜温暖气候，较耐寒	花色丰富，花期长，耐寒性 较强，耐粗放管理	丛植

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
499	藤本月季	Rosa hybrida Climbing Roses	蔷薇科		东北南部至华南、 西南（III~VII）	阳性，喜温暖气候	枝条长，慢性或攀援花色丰富，花期 5、10 月	攀援围栏、棚架
500	杂种香水 月季	Rosa hybrida Hybrid Tea Roses	蔷薇科	1~2	东北南部至华南、 西南（III~VIII）	阳性，喜温暖气候	花大，色彩丰富，芳香，生长季中开花不断，多为灌木少有藤本	专类园，木本花卉
501	白玉棠	Rosa multiflora cv.Ablo-plena	蔷薇科	1~2	华北、西北（III、IX）	阳性，耐寒，耐干旱，适应性强	花繁密，白色，重瓣，芳香	庭院观赏、丛植、花篱
502	玫瑰 ●	Rosa rugosa	蔷薇科	2	东北、华北至长江 流域（III）	阳性，耐寒，耐干旱，不耐积水	花紫红，花期 5~6 月，芳香	庭院观赏、丛植、花篱
503	水榆花楸 ●	Sorbus alnifolia	蔷薇科	20	东北至长江中下游 及陕、甘南部（II ~VI、IX南部）	中性，耐阴，喜湿润排水良好的微酸性或中性土壤,耐寒	花白色，5 月，梨果椭球形，红色或橙黄色，9~10 月果熟，秋叶变红色或金黄色	风景林、园景树、庭荫树
504	棣棠●	Kerria japonica	蔷薇科	1~2	华北至华南、西南 （III~VII）	中性，喜温暖湿润气候，较耐寒	花金黄色，花期 4~5 月，枝干绿色	丛植、花篱、庭植
505	连香树	Cercidiphyllum japanicum	连香树 科	30~40	我国中部(IV~VI)	喜光，喜温凉气候及肥沃土壤	幼叶紫色，秋叶黄色或橙色	风景林、庭荫树、园景树
506	腊梅（蜡 梅）●	Chimonanthus praecox	腊梅科	3~4	华北南部至长江 流域（III~VI）	阳性，喜温暖，耐干旱，忌水湿，耐修剪	花蜡黄色，浓香，花期 1~2 月	庭院观赏、盆栽
507	丝棉木	Euonymus bungeanus	卫矛科	6	东北南部至长江 流域（III~VI）	中性，耐寒，耐水湿，抗污染	树冠圆球形，小枝细长，绿色，枝叶秀丽，花盘肥大，朔果粉红色，秋季成熟	庭荫树、水边绿化
508	枳椇（拐 枣）	Hovenia dulcis	鼠李科	25	黄河流域及其以南 地区（IV~VII）	阳性，喜温暖气候	叶大荫浓，花淡绿色，花期 6 月，果 10 月	行道树、庭荫树
509	鼠李	Rhamnus davurica	鼠李科	10	东北、华北（II~IV）	耐阴，抗寒，耐瘠薄，适应性强		庭植观赏
510	枣树	Ziziphus jujuba	鼠李科	10	东北及内蒙南部至 华南(III~VII、IX南部)	阳性，适应性强，寿命长		果树、蜜源植物、庭荫树
511	龙爪枣	Zizuphus jujuba cv. Tortuosa	鼠李科	5~8	东北及内蒙南部至 华南(III~VII、IX南部)	阳性	小枝卷曲如游龙	庭植观赏

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
512	雀梅藤	Sageretia theezans	鼠李科	2~3	长江流域及其以南地区（V~Ⅷ）	喜光，稍耐阴，喜温暖气候，耐修剪	落叶攀援灌木	绿篱、盆景
513	马甲子	Paliurus ramosissimus	鼠李科	2~3	华东、中南、西南、陕西（V、VI）	中性		绿篱
514	紫椴	Tilia amurensis	椴树科	15~25	东北、华北(Ⅱ、Ⅲ)	中性，耐寒性强，抗污染，深根性	树姿优美，枝叶茂密	行道树、庭荫树
515	蒙椴●	Tilia Mongolia	椴树科	6~10	东北、华北、内蒙（Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ北部）	中性，喜冷凉湿润气候，耐寒	树姿优美，树皮红褐色，枝叶茂密，嫩叶红色，秋叶亮黄色。花期 6~7 月，果 9 月	园景树
516	糠椴●	Tilia mandshurica	椴树科	20	东北、华北（Ⅱ、Ⅲ）	弱阳性，喜冷凉湿润气候，耐寒，深根性，不耐碱，怕污染	树姿优美，叶大荫浓，嫩叶红色，花黄色 7 月，芳香，果 9 月	庭荫树、行道树
517	欧洲大叶椴	Tilia platyphylla	椴树科	32	青岛（Ⅲ东部）	中性，喜凉爽湿润气候	树冠半球形，叶大荫浓，花黄白色	庭荫树
518	心叶椴	Tilia cordata	椴树科	20~30	华东、新疆(Ⅲ~Ⅵ、X)	喜光，耐寒，抗烟能力强	树冠圆球形，花黄白色，芳香	庭荫树、行道树
519	南京椴	Tilia miqueliana	椴树科	12~20	华东（Ⅵ东部）	中性，喜温暖气候	树姿优美	庭荫树
520	木姜子	Litsea cubeba	樟科	8~10	长江以南地区(Ⅵ~Ⅷ)	喜光，稍耐阴，浅根性	花夏季，果黑色	丛植观赏
521	檫木	Sassafras tzumu	樟科	35	长江以南地区（V~Ⅶ）	喜光，喜温暖湿润气候及深厚、肥沃、排水良好的酸性土壤，不耐旱，忌水湿，深根性，生长快	花小，黄色，微香，核果球形，蓝黑色。秋叶红色	用材林、风景林
522	怪柳●	Tamarix chinensis	怪柳科	2~5	辽宁至全国各地（Ⅲ~Ⅶ、Ⅸ~Ⅺ）	阳性，耐干旱、水湿，抗风沙、盐碱，抗有害气体能力强，耐修剪	枝叶细小柔软，花粉红色，花期 5~8 月	庭植、绿篱、海防林、防护树
523	枫香●	Liquidambar formosana	金缕梅科	30	长江流域及其以南地区（Ⅵ~Ⅷ）	阳性，喜温暖湿润气候，耐干旱瘠薄，幼树略耐阴，抗风，抗大气污染	秋、冬叶色红艳，树干端直高耸，树冠广卵形或略扁	庭荫树、行道树、风景树
524	金缕梅	Hamamelis mollis	金缕梅科	10	长江流域（Ⅵ）	阳性，稍耐阴	花红黄色，芳香，早春叶前开放，秋叶黄色	庭植观赏
525	蜡瓣花	Corylopsis sinensis	金缕梅科	5	长江流域及其以南各省（Ⅵ~Ⅷ）	阳性	花柠檬黄色，芳香，春天叶前开花	庭植观赏
526	乌桕	Sapium sebiferum	大戟科	15	黄河以南各省（Ⅳ~Ⅷ）	阳性，喜温暖湿润气候，耐水湿，抗风，抗性较强	树冠球形，秋叶紫红，缀以白色种子	行道树、庭荫树

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
527	山麻杆	Alchornea davidii	大戟科	1~2	长江流域(V、VI)	阳性	早春嫩叶及秋叶紫红色, 叶常带红褐色	庭植观赏
528	重阳木 ●	Bischofia polycarpa	大戟科	15	长江流域及以南各省 (V~VIII)	阳性, 稍耐阴, 喜温暖湿润气候, 耐水湿, 抗风	春叶、秋叶红色	庭荫树、行道树、护堤树
529	铁 海 棠 (虎刺梅) ●	Euphorbia pulcherrima	大戟科	1	华南 (VII、VIII)	喜光	花红色, 秋冬季为盛花期	木本花卉
530	油桐	Vernica fordii	大戟科	12	长江流域及其以南地区 (IV~VIII)	喜光, 喜温暖湿润气候, 不耐水湿, 生长快, 寿命短	树冠园整, 叶大荫浓, 花白色, 春季花叶同放, 大而美丽	庭荫树、行道树
531	梧桐 (青桐) ●	Firmiana simplex	梧桐科	15~20	华北南部至长江流域 (IV~VI)	阳性, 喜温暖湿润, 抗污染, 怕涝	枝干青翠, 叶大荫浓, 干皮绿色	庭荫树、行道树
532	沙棘	Hippophae rhamnoides	胡颓子科	1~2	华北、西北、西南 (III、IX~XI)	喜光, 耐寒, 抗风沙, 适应性强	花淡黄色, 叶前开放, 核果球形, 橙黄色	刺篱、果篱
533	秋胡颓子	Elaeagnus umbellata	胡颓子科	4	长江流域及其以北地区(III、IV、IX)	阳性, 喜温暖气候, 不耐寒	花黄白色, 花期 5~6 月, 芳香, 果橙红色, 9~10 月	庭院观赏、防护林下木
534	沙枣 (桂香柳) ●	Elaeagnus angustifolia	胡颓子科	7~12	西北、华北、东北 (III、IV、IX)	阳性, 耐干旱、低湿及盐碱	叶银白色, 花黄色 7 月, 有香气, 果 8~10 月	庭植、绿篱、防护林
535	红瑞木 ●	Cornus alba	山茱萸科	1~3	东北、华北 (II~IV)	弱阳性, 耐寒, 耐湿, 耐干旱瘠薄	茎枝红色美丽, 花白色或黄白色, 花期6~7月, 果白色, 秋叶红色	庭院观赏、丛植
536	灯台树	Cornus controversa	山茱萸科	12~20	辽宁、华北、西北至华南、西南 (III~VII、IX南部)	阳性, 喜湿润, 生长快	树形整齐美观, 花白色美丽, 花期 5~6 月	庭荫树、行道树
537	车 梁 木 (毛柞木) ●	Cornus walteri	山茱萸科	6~15	黄河流域, 华东、西南 (IV~VI)	阳性, 较耐干旱瘠薄, 不择土壤, 深根性	花白色, 有香气, 花期 5 月, 果黑色, 9~10 月	庭荫树
538	偃伏柞木 ●	Cornus stolonifera	山茱萸科	2~3	东北 (II)	喜光, 耐旱, 生长快, 抗性强	枝条鲜红色, 花白色, 花期 5~6 月, 核果白色, 9 月	丛植
539	四照花 ●	Dendrobenthamia japonica	山茱萸科	8	华北南部至长江流域 (IV~VI)	中性, 喜温暖气候, 耐寒性不强	花黄白色, 花期 5~6 月, 秋果粉红, 9~10 月	庭院观赏
540	山茱萸 ●	Macrocapium officinale	山茱萸科	10	华东 (V、VI)	喜光, 性强健, 耐寒, 耐旱	花金黄色, 3~4 月, 叶前开花, 果红色, 8~9 月果成熟, 秋叶红色或黄色	庭植、盆景

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
541	刺五加●	Acanthopanax senticosus	五加科	3~5	东北、华北 (Ⅱ、Ⅲ)	喜光, 稍耐阴, 喜湿润气候和肥沃土壤	花紫黄色, 花期 7~8 月, 果黑色, 8~9 月	庭植观赏
542	辽东槲木●	Aralia elata	五加科	1.5~4	东北 (Ⅱ、Ⅲ)	阴性, 喜湿润肥沃土壤	叶形肥大可观, 顶生圆锥花序, 花黄白色, 花期 8 月, 果黑色	庭植观赏
543	刺楸	Kalopanax septemlobus	五加科	20~30	东北南部至华南、西南 (Ⅲ~Ⅶ)	弱阳性, 适应性强, 深根性, 速生, 少病虫害	顶生圆锥花序, 花白色, 花期 7~8 月	庭荫树、行道树
544	大果冬青	Ilex macrocarpa	冬青科	15	西南、中南 (Ⅵ)	喜光	花白色, 芳香, 果球形, 黑色	庭荫树
545	柿 ●	Diospyros kaki	柿树科	15	东北南部至华南、西南 (Ⅲ~Ⅶ)	阳性, 喜温暖, 耐寒, 耐干旱瘠薄, 不耐水湿和盐碱, 深根性, 寿命长	秋叶红色, 果橙黄色	果树、庭荫树、行道树
546	瓶兰花	Diospyros armata	柿树科	8	浙江、湖北 (Ⅵ)	阳性	花冠乳白色, 芳香, 花期 4~5 月, 果球形, 黄色	盆景、庭植观赏
547	乌柿	Diospyros cathayensis	柿树科	2~4	华中至华南 (Ⅴ~Ⅷ)	阳性	花白色, 花期 4 月, 枝近黑色, 果球形, 黄色	盆景、庭植观赏
548	老鸦柿	Diospyros rhombifolia	柿树科	2~4	华东 (Ⅵ)	阳性	花白色, 花期 4 月, 果红色, 10 月熟	绿篱、庭植观赏
549	君迁子●	Diospyros lotus	柿树科	14	东北南部至华南、西南 (Ⅲ~Ⅵ、Ⅸ)	阳性, 耐寒、耐干旱瘠薄, 抗污染, 深根性, 寿命长	果熟时, 由黄变成蓝黑色	果树、庭荫树、行道树
550	白檀●	Symplocos paniculata	山矾科	12	除西北地区, 全国都有分布 (Ⅲ~Ⅶ)	阳性, 适应性强, 深根性	花黄白色, 花期 5 月, 繁密, 微香, 核果卵球形, 熟时蓝色, 经久不凋	庭植观赏
551	流苏树●	Chionanthus retusus	木犀科	6~20	黄河中下游及其以南地区 (Ⅳ~Ⅵ)	阳性, 喜温暖, 耐寒, 生长慢	花白色美丽, 花期 5 月, 花期满树雪白, 核果蓝黑色, 9 月下旬成熟	庭植观赏
552	雪柳●	Fontanesia fortuner	木犀科	4~6	东北南部至长江中下游 (Ⅲ~Ⅵ、Ⅸ)	中性, 耐寒, 适应性强, 耐修剪	花小, 白色, 花期 5~6 月	绿篱、丛植、林带下木
553	连翘●	Forsythia suspensa	木犀科	3	南北各省 (Ⅱ~Ⅴ)	阳性, 耐半阴, 耐寒, 抗旱, 不耐水渍	花金黄色, 叶前开放, 花期 4~5 月, 枝条弯曲下垂	庭植、花篱、坡地河岸栽植
554	金钟花	Forsythia viridissima	木犀科	1.5~3	华北及长江流域 (Ⅳ~Ⅵ)	阳性, 喜温暖气候, 较耐寒	花金黄, 花期 4~5 月, 叶前开放	庭院观赏、丛植

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
555	白蜡	Fraxinus chinesis	木犀科	15	东北、华北、西北、 长江流域(III~VI、 IX)	弱阳性,耐寒,对土壤适应性强, 耐低湿,抗烟尘,深根性,耐修 剪	树冠卵圆形,秋叶黄色	庭荫树、行道树、 堤岸树
556	绒毛白蜡	Fraxinus velutina	木犀科	8~15	华北(III、IV)	阳性,耐干旱瘠薄,耐低洼、盐 碱地,抗污染,生长快,落叶较 晚		庭荫树、行道树
557	洋白蜡	Fraxinus pennsylvanica	木犀科	20	东北南部、华北 (III)	阳性,耐寒,耐低湿	枝叶茂密,叶色深绿而有光 泽,发叶迟,落叶早	行道树、防护林
558	水曲柳●	Fraxinus mandshurica	木犀科	30	东北(II)	阳性,耐寒,喜肥沃湿润土壤, 生长快,抗风力强,耐水湿	树冠卵形	庭荫树、行道树、 风景林
559	花曲柳●	Fraxinus rhynchophylla	木犀科	15	东北至黄河流域 (II~IV)	喜光,耐寒	树冠卵形,干直	庭荫树、行道树、 风景林
560	迎春●	Jasimum nudiflorum	木犀科	2~3	华北至长江流域 (III~VI)	阳性,稍耐阴,怕涝	花黄色,早春叶前开放	庭院观赏、花篱、 地被植物
561	云南黄馨 ●	Jasminum mesnyi	木犀科	3~4.5	长江流域至华南、 西南(VI~VIII)	中性,喜温暖,不耐寒,适应性 强	枝拱垂,花黄色,春季开花	庭院观赏、花篱
562	什锦丁香 ●	Syringa chinensis	木犀科	3	华北、辽东半岛 (III)	阳性,喜暖湿气候,耐干旱瘠薄, 耐寒,怕涝	花序大,花香,淡紫红色或 粉红色,花期5月	庭院观赏、丛植
563	西南丁香(西 马拉雅丁香)●	Syringa emodi	木犀科	3~4	哈尔滨、西藏 (II、IX)	喜光,畏夏季湿热	花粉红色,紧密,花期5月 中旬	庭院观赏、丛植
564	匈牙利丁 香●	Syringa josikaea	木犀科	3~5	哈尔滨(II)	喜光,喜湿润气候,抗性强	花淡紫色,芳香,花期5~6 月	庭院观赏、丛植
565	西蜀丁香 ●	Syringa komarovii	木犀科	3~5	云南、四川西部 (III、VI西部)	喜光,耐寒,耐旱,喜土壤湿润 而排水良好	花粉红色,花期5~6月	庭院观赏、丛植
566	小叶丁香 ●	Syringa microphylla	木犀科	2	辽南、华北、华中、 西北(III、IV、IX)	喜光,耐寒,抗旱	花淡紫红色,5月,7~8月 两次开花	庭院观赏、丛植
567	蓝丁香●	Syringa meyeri	木犀科	0.8~1. 5	华北(III、IV)	喜光,耐寒,耐干旱,适应性强	花蓝紫色,花期4~5月	庭院观赏、丛植
568	紫丁香●	Syringa oblata	木犀科	4~5	东北南部,华北、 西北(III、IV、IX)	阳性,稍耐阴,耐寒,耐旱,忌 低湿	花堇紫色,花期4~5月,芳 香	庭院观赏、丛植

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
569	白丁香●	Syringa oblata var. alba	木犀科	4~5	东北南部, 华北、 西北(III、IV、IX)	阳性, 稍耐阴, 耐寒, 耐旱, 忌 低湿	花白色, 花期 4~5 月, 芳香	庭院观赏、丛植
570	北京丁香●	Syringa pekinensis	木犀科	10	中国北部(III、IV、 IX)	阳性, 耐旱	花白, 花期 5~6 月, 有异香	庭荫树、园路树
571	暴马丁香●	Syringa reticulata var. mandshuica	木犀科	10	东北、华北(II~ IV、IX)	阳性, 耐旱	花白, 花期 5~6 月, 有异香	庭荫树、园路树
572	波斯丁香●	Syringa × persia	木犀科	2	西北、东北、华北 (III、IX南部、XI)	喜光, 稍耐阴, 喜温暖湿润气候, 耐寒, 耐旱	花淡紫色, 花期 5 月	庭院观赏、丛植
573	羽叶丁香●	Syringa pinnatifolia	木犀科	3	华北、华中、西南 (III、IV、VI西部)	阳性, 耐旱, 耐寒, 喜湿润气候	花白色或淡粉红色, 花期 5 月	庭院观赏、丛植
574	毛叶丁香●	Syringa pubescens	木犀科	1~3	东北南部至黄河流 域(III、IV、IX南部)	阳性, 耐旱, 耐寒, 耐瘠薄	花紫色或淡紫色, 具浓香, 花期 5 月	庭院观赏、丛植
575	垂丝丁香●	Syringa reflexa	木犀科	4	东北南部、华北, 原产川东、鄂西的 高山上(III、VI北 部)	阳性, 喜湿润气候, 耐寒, 耐旱	花冠外粉红色, 内白色, 花 期 5 月	庭院观赏、丛植
576	四川丁香●	Syringa sweiginzowii	木犀科	3	原产于川西的高 山上, 辽宁有栽培 (III、XI西部)	喜光, 耐半阴, 喜空气、土壤湿 润, 耐干旱, 耐寒	花淡红色, 有香气, 花期 5 月下旬	庭院观赏、丛植
577	关东丁香●	Syringa velutina	木犀科	3	辽宁、吉林(III)	喜光, 稍耐阴, 耐寒, 耐干旱	花白色或淡紫色, 花期 5 月	庭院观赏、丛植
578	欧丁香●	Syringa vulgaris	木犀科	7	全国各地(III~VI)	喜光, 稍耐阴, 耐干旱, 耐寒	花淡紫色, 芳香, 花期 5 月	庭院观赏、丛植
579	红丁香●	Syringa villosa	木犀科	3	辽宁、华北、西北 (III、IX南部)	喜光, 稍耐阴, 喜冷凉湿润气候, 耐干旱, 耐寒	花淡粉色至白色, 花期 5~6 月	庭院观赏、丛植
580	辽东丁香●	Syringa wolfi	木犀科	5	东北、内蒙、河北、 山西(III)	喜光, 喜土壤湿润而排水良好, 耐寒	花青紫色, 淡紫色, 花期 6 月	庭院观赏、丛植
581	金叶女贞●	Ligustrum vicaryi	木犀科	1~2	华北南部至华东 (III~VI)	喜光, 喜温暖湿润气候, 耐高温	半常绿性, 花白色, 花期夏 季	观叶植物、绿篱、 色带
582	小叶女贞●	Ligustrum quihoui	木犀科	2~3	华北至长江流域 (III~VI)	中性, 喜温暖气候, 较耐寒	半常绿性, 花小, 白色, 花 期 8~9 月, 有香气, 果黑色	庭院观赏、绿篱
583	小蜡●	Ligustrum sinese	木犀科	3~6	长江流域及其以南 地区(V~VIII)	中性, 喜温暖, 较耐寒, 耐修剪	半常绿性, 花白色, 花期 5~6 月, 生长慢	庭院观赏、绿篱

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
584	水蜡●	Ligustrum obtusifolium	木犀科	2~3	长江以北地区(III~V)	喜光, 稍耐阴, 耐寒, 适应性强, 耐修剪	花白色, 花期 6 月, 芳香。果 9~10 月, 黑色	绿篱、造型树
585	大叶醉鱼草●	Buddleia davidii	醉鱼草科	1~3	长江流域 (VI)	阳性, 喜温暖气候, 耐修剪, 性强健, 耐旱	花色丰富, 有紫、红、暗红、白色等品种, 芳香, 花期 6~9 月	庭院观赏、丛植, 招引蝴蝶
586	密蒙花	Buddleja officinalis	醉鱼草科	1~3	中国西南、中南部 (VI)	阳性	花淡紫色至白色	庭植观赏、药用
587	枸杞●	Lycium chinese	茄科	1	辽宁以南地区(III~VI、IX南部)	阳性, 耐阴, 耐碱	花紫色, 花期 5~10 月, 果红色	庭植、桩景
588	紫珠●	Callicarpa dichotoma	马鞭草科	1.5~2	我国东部及中南部 (III~VI)	中性, 喜温暖气候, 较耐寒	花淡紫色, 花期 6~7 月, 核果球形, 亮紫色	庭院观赏、丛植
589	海州常山●	Clerodendrum trichotomum	马鞭草科	3~8	华北至长江流域 (III~VI)	喜光, 稍耐阴, 喜温暖气候, 耐干旱, 耐水湿, 抗污染	花白色带粉红色, 花期 7~8 月, 紫红色萼片, 宿存。蓝果, 9~10 月	庭院观赏、丛植
590	荆条●	Vitex negundo var.heterophylla	马鞭草科	1~2	东北南部、华北、西北、华东、西南(III~VD)	喜光, 耐寒, 耐干旱瘠薄	花蓝紫色, 有香气, 花期夏季	盆景
591	龙吐珠●	Clerodendrum thomsonae	马鞭草科	2~5	华南 (VIII)	喜光, 喜高温、高湿气候, 不耐寒, 生长迅速	蔓性木质藤本, 花萼白色, 花鲜红色, 夏至秋季开花	庭院观赏
592	赧桐 (荷包花)●	Clerodendrum japonicum	马鞭草科	1~4	长江流域以南地区 (VI~VIII)	喜光, 耐半阴, 喜温暖多湿气候, 耐湿又耐旱, 生长快	花鲜红色, 花期夏至秋季	庭院观赏
593	糯米条	Abelia chenensis	忍冬科	1.5~2	华北南部至华南 (III~VII)	中性, 喜温暖, 耐干旱瘠薄, 耐修剪, 根系发达	花白色, 花期 7~9 月, 芳香, 花后宿存叶片变红	庭院观赏、花篱
594	大花六道木	Abelia grandiflora ×	忍冬科	2	华北至华南 (III~VII)	耐半阴, 耐寒, 耐旱, 生长快, 耐修剪	花粉红色, 7~9 月花开不断	丛植、花篱
595	美丽忍冬●	Lonicera bella	忍冬科	1.5	华北、东北 (III)	喜光, 耐半阴, 喜湿润气候, 耐寒	初开花白色或粉色, 后变成黄色, 浆果红色	庭植观赏
596	黄花忍冬●	Lonicera chrysantha	忍冬科	4	华北、东北、西北 (III、IX)	喜光, 耐半阴, 耐旱, 耐寒	花黄白色后变为红黄色, 6 月, 浆果红色, 8~9 月	庭植观赏
597	金银木●	Lonicera maackii	忍冬科	6	南北各省 (II~VII)	喜光, 耐半阴, 耐旱, 耐寒	花白色后变黄, 花期 4~5 月, 浆果红色	庭植观赏、防护林、蜜源植物
598	紫枝忍冬●	Lonicera maximowiczii	忍冬科	2~3	东北、西北 (II、III、IX)	耐阴, 耐寒	花紫红色, 花期 5~6 月, 浆果红色, 8 月	庭植观赏

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
599	长白忍冬	Lonicera ruprechtiana	忍冬科	3~5	东北（Ⅱ、Ⅲ）	喜光，耐阴，耐旱，喜湿润	花初开为白色后变成黄色， 5~6 月，浆果红色，8~9 月	庭植观赏
600	桃色忍冬 (鞑靼忍冬●)	Lonicera tatarica	忍冬科	3	西北、华北、东北 （Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ、Ⅹ）	喜光，稍耐阴，耐旱，耐寒	花粉、红、白色，花期 5~6 月。浆果红色，9 月熟	庭植观赏
601	藏花忍冬 ●	Lonicera tatarinowii	忍冬科	2	东北南部至华北 （Ⅲ）	耐半阴，耐寒，喜湿润气候	花暗紫色，花期 5~6 月，浆 果球形，红色，8~9 月	庭植观赏
602	锦带花 ●	Weigela florida	忍冬科	1~3	东北、华北、华中 （Ⅱ南部~Ⅵ）	阳性，耐寒，耐干旱，怕涝	花玫瑰红色，花期 4~5 月	庭院观赏、丛植、 花篱
603	花叶锦带 ●	Weigela florida cv.Variegata	忍冬科	1~2	华北（Ⅲ、Ⅳ）	阳性，较耐阴，耐寒，耐旱，怕 积水，耐修剪	植株紧密，叶边缘淡黄白 色，花粉白色，花期 4~5 月	丛植
604	红王子锦 带花 ●	Weigela florida cv.Red Prince	忍冬科	1~2	华北（Ⅲ、Ⅳ）	喜光，耐寒	花鲜红色，极其繁茂，花期 4~5 月	丛植、花篱
605	白锦带花 ●	Weigela florida f.alba	忍冬科	1~3	华北、东北（Ⅲ、 Ⅳ）	阳性，较耐阴，耐寒，耐旱，怕 积水，耐修剪	花白色，花期 4~5 月	丛植
606	早锦带花 ●	Weigela praecox	忍冬科	1~2	东北南部至华北 （Ⅲ、Ⅳ）	喜光，稍耐阴，耐寒，耐瘠薄	花粉红色，花期 5 月	观花灌木
607	美丽锦带 花 ●	Weigela nikkoensis	忍冬科	1~1.5	华北至华东（Ⅲ~ Ⅴ）	阳性，耐寒，耐旱，怕积水	花紫红色，花期 6~10 月	观花灌木
608	接骨木 ●	Sambucus williamsii	忍冬科	6	南北各地（Ⅲ~Ⅶ）	弱阳性，喜温暖，抗有毒气体， 适应性强	花小，白色，花期 4~5 月， 秋果红色 7~9 月	庭院观赏
609	海仙花	Weigela coraeensis	忍冬科	5	华北、华东、华中 （Ⅳ~Ⅵ）	弱阳性，喜温暖，颇耐寒	花初开时黄白色后渐变为 紫红色，花期 5~6 月	庭院观赏、丛植
610	木本绣球	Viburnum macrocephalum	忍冬科	4	华北南部至闽、川 （Ⅳ~Ⅶ）	阳性，稍耐阴	花白，5~6 月，花序大，形 如绣球	庭院观赏
611	天目琼花 ●	Viburnum sargentii	忍冬科	3	东北、华北至长江 流域（Ⅱ、Ⅲ~Ⅵ）	中性，较耐寒	花白色，花期 5~6 月，秋果 红色	庭植观花、观果
612	荚蒾	Viburnum dilatatum	忍冬科	3	华北南部至华南 各省（Ⅳ~Ⅶ）	中性	花白，花期 5~6 月，核果红 色，9~10 月	庭院观赏
613	香荚蒾 ●	Viburnum farreri	忍冬科	3	华北、西北（Ⅲ、Ⅸ）	中性，耐干旱，耐寒	花红色，芳香，花期 4 月， 果椭圆形，紫红色	庭植观花

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
614	蝴蝶树	Viburnum plicatum f. tomentosum	忍冬科	3	华北南部以南地区 (IV~VII)	阳性, 稍耐阴	花白, 花期 4~5 月, 秋日观红果	庭植观赏
615	猬实 ●	Kolkwitzia amabilis	忍冬科	3	华北、西北、华中 (III、IV、IX南部)	阳性, 颇耐寒, 耐干旱贫瘠	花粉红, 花期 5 月, 果似刺猬	庭院观赏、花篱
616	紫薇 ●	Lagerstromia indica	千屈菜科	3~6	华北南部至华南、西南 (III~VIII)	喜光, 耐半阴, 喜温暖气候, 耐旱, 不耐严寒, 不耐涝, 抗大气污染	花紫、红、白, 花期 6~9 月, 秋色叶可观	庭院观赏、园路树
617	大花紫薇 ●	Lagerstromia speciosa	千屈菜科	16~20	华南 (VII、VIII)	喜光, 耐半阴, 喜暖热气候, 耐干旱瘠薄, 不耐寒	树冠半球形, 花淡紫红色, 夏季开花。果宿存至冬, 冬季落叶时叶色变红或橙红色	庭荫树、园景树、行道树
618	南紫薇	Lagerstromia subcostata	千屈菜科	2~8	我国南部、西部 (VI、VII)	喜光	花小白色	丛植观赏
619	黄薇	Heimia myrtifolia	千屈菜科	1~2	华东 (VI)	喜光, 喜温暖, 耐干旱	花金黄色, 夏秋开花	丛植观赏
620	木棉 ●	Bombax malabaricum	木棉科	10~40 20	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜暖热气候, 耐干旱瘠薄, 抗风, 抗大气污染, 不耐水湿, 速生	花大, 红色, 花期 2~3 月, 春季先叶开放	园景树、行道树
621	吉 贝 (爪哇木棉) ●	Ceiba pentandra	木棉科	10~20	华南 (VIII)	阳性, 喜高温多湿气候, 抗大气污染, 须排水良好, 不耐旱	树冠近似塔形, 花大, 淡红色或白色, 春末夏初开花	庭荫树、园景树
622	美人树 ●	Ceiba insignis	木棉科	10~15	华南 (VIII)	强阳性, 喜高温多湿气候, 生长迅速, 抗风, 不耐旱	树冠伞形, 叶色青翠, 成年树干成酒瓶状, 冬季开紫红色花	庭荫树、园景树
623	七叶树 ●	Aesculus chinese	七叶树科	25	黄河中下游至华东 (IV~VI)	弱阳性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒, 深根性, 生长慢, 寿命长	树冠开阔, 叶大荫浓, 白花绚烂, 花期 5~6 月	庭荫树、行道树、园景树
624	天师栗	Aesculus wilsonii	七叶树科	30	豫西与粤北、华中、西南 (IV~VI)	弱阳性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒, 深根性, 生长慢, 寿命长	花白色, 芳香	园景树
625	木芙蓉 ●	Hibiscus mutabilis	锦葵科	2~5	长江流域及其以南地区 (V~VII)	中性偏阴, 喜温暖气候及酸性土	花白、粉、紫红色, 花期 9~10 月花朵大, 鲜艳	庭院观赏、丛植、列植
626	木槿 ●	Hibiscus syriacus	锦葵科	2~6	东北南部至华南 (III~VII)	阳性, 喜温暖气候, 不耐寒	花淡紫, 白, 粉红, 花期 7~9 月	丛植、花篱、庭植观赏
627	金丝桃 ●	Hypericum monogynum	金丝桃科	1	长江流域及其以南地区 (V~VIII)	阳性, 耐半阴, 喜温暖气候, 较耐干旱	半常绿性, 花金黄色, 6~7 月	庭院观赏、丛植

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
628	金丝梅	Hypericum patulum	金丝桃科	1	长江流域及其以南地区（V~Ⅷ）	阳性，不耐积水	半常绿性,花金黄色，4~8 月	庭植观赏、丛植
629	结香●	Edgeworthia chrysanthia	瑞香科	1~2	中部及西南各省（Ⅳ~Ⅵ）	喜半阴及湿润环境，耐水湿	花黄色，3~4 月先叶开放，芳香	庭院观赏
630	芫花	Daphne genkwa	瑞香科	1	黄河中下游至长江流域（Ⅳ~Ⅵ）	阳性，颇耐寒	花淡紫色，春天叶前开放，花期 3 月，核果白色，5~6 月成熟。	庭院观赏
631	蓝果树	Nyssa sinensis	蓝果树科	30	长江以南地区（Ⅵ）	阳性，喜温暖湿润气候，耐干旱瘠薄，生长快	秋叶红艳	庭荫树、行道树
632	珙桐	Davidia involucrata	蓝果树科	20	鄂西、川中南、贵北、滇北（Ⅵ）	阳性，略耐半阴，喜温凉湿润气候及肥沃土壤	花絮包片奇特美丽，状如飞鸽	庭荫树、行道树
633	喜树●	Camptotheca acuminata	蓝果树科	30	长江以南地区（Ⅵ~Ⅷ）	阳性，喜温暖，不耐寒，浅根性，生长快	树冠圆形或卵形，树干端直	庭荫树、行道树
634	杜鹃（映山红）●	Rhododendron simsii	杜鹃花科	2~3	长江流域及其以南地区（Ⅵ、Ⅶ）	中性，喜温湿气候及酸性土	花深红色，4~6 月，还有橙红，粉红，白色等品种	庭院观赏、盆栽、花篱
635	锦绣杜鹃	Rhododendron pulchrum	杜鹃花科	1~2	长江以南（Ⅵ~Ⅷ）	喜温暖湿润气候，耐阴，忌阳光暴晒	半常绿，花紫色，有香气	庭院观赏、林带下木
636	满山红	Rhododendron mariesii	杜鹃花科	1~3	长江下游至闽、台（Ⅵ~Ⅷ）	中性	花玫瑰红带紫色，4 月	强酸性土指示植物、庭院观赏
637	石岩杜鹃	Rhododendron obtusum	杜鹃花科	1	华东（Ⅴ、Ⅵ）	喜光，耐半阴，耐热	花橙红色至亮红色,4~5 月，盛开时盖满树冠	庭院观赏，丛植
638	毛白杜鹃	Rhododendron mucronatum	杜鹃花科	2~3	长江流域（Ⅴ、Ⅵ）	中性，喜温暖气候，耐热，抗有害气体能力强	花白色，芳香，4~5 月开花	庭院观赏，丛植
639	鸡蛋花●	Plumeria rubra cv.Acutifolia	夹竹桃科	5	华南（Ⅶ、Ⅷ）	中性，耐湿	花冠漏斗状，外白内黄，芳香	庭植观赏
640	香果树	Emmenopterys henryi	茜草科	26	我国西南部及长江流域（Ⅵ）	喜温暖气候及肥沃湿润土壤，速生		庭荫树、园景树
641	榄仁（法国枇杷）●	Terminalis catappa	使君子科	10~20	华南（Ⅶ、Ⅷ）	喜光，耐半阴，喜高温湿润气候，深根性，抗风，抗污染，寿命长	树冠伞形，冬季叶色变红	风景树、行道树
竹 类								
642	箬竹	Indocalamus latifolius	禾本科	1	中部至长江流域（Ⅲ~Ⅵ）	中性，喜温暖湿润气候，不耐寒	秆丛状散生	庭园观赏、地被

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
643	孝顺竹(观音竹)	Bambusa multiplex	禾本科	2~4	长江以南地区 (VI~VIII)	中性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒	秆丛生, 枝叶秀丽	庭园观赏
644	凤尾竹 ●	Bambusa multiplex var. nana	禾本科	1~2	长江以南地区 (VI~VIII)	中性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒	秆丛生, 枝叶细密秀丽	庭园观赏、绿篱、造型
645	花孝顺竹	Bambusa multiplex f.alphonsekarri	禾本科	1~2	长江以南地区 (VI~VIII)	中性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒	竹秆金黄色节间有绿色纵条纹	庭园观赏
646	青皮竹 ●	Bambusa textilis	禾本科	9~10	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜高温多湿气候, 抗风	丛生竹, 秆亮绿色, 节间较长, 幼时被毛和白粉	庭园观赏
647	钓丝单竹	Bambusa vario-stiata	禾本科	10~20	广东 (VII、VIII)	阳性, 喜高温多湿气候	丛生竹, 竹秆下部节间幼时绿色, 有黄绿色条纹	庭园观赏
648	粉单竹 ●	Bambusa chungii	禾本科	15~20	广东、广西 (VII、VIII)	阳性, 喜温湿气候及肥沃疏松土壤	丛生竹, 竹竿粉绿色, 被白色蜡粉	庭园观赏
649	佛肚竹 ●	Bambusa ventricosa	禾本科	10	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜肥沃排水良好的壤土或沙壤土	节间膨大, 状如佛肚, 干幼时深绿色, 老后橄榄黄色	庭植观赏
650	黄金间碧玉竹 ●	Bambusa vulgaris var. striata	禾本科	10~20	华南 (VII、VIII)	阳性, 喜肥沃排水良好的壤土或沙壤土	丛生竹, 竹秆鲜黄色具显著绿色纵条纹	庭院观赏
651	罗汉竹	Phyllostachys aurea	禾本科	5~8	华北南部至长江流域 (IV~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	竹秆下部节间肿胀或节环交互歪斜	庭园观赏
652	桂竹	Phyllostachys bambusoides	禾本科	20	淮河流域至长江流域 (IV~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒, 耐盐碱, 适应性强	秆散生	庭园观赏
653	斑竹	Phyllostachys bambusoides cv. Tanakae	禾本科	10~20	华北南部至长江流域 (IV~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	竹秆有紫褐色斑	庭园观赏
654	刚竹	Phyllostachys viridis	禾本科	10~15	华北南部至长江流域 (IV~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	秆直, 淡绿色, 枝叶青翠	庭园观赏
655	绿皮黄筋竹	Phyllostachys viridis cv.Houzeauana	禾本科	10	长江流域 (VI)	阳性, 喜温暖湿润气候	竹秆之纵槽淡黄色	庭园观赏
656	黄皮绿筋竹	Phyllostachys viridis cv.Youngii	禾本科	10	长江流域 (VI)	阳性, 喜温暖湿润气候	秆小金黄色, 节下有绿色环带, 节间有少数绿色纵条纹	庭园观赏

续附表 1

序号	中名	学名	科名	高 度 (m)	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
657	粉绿竹	Phyllostachys glauca	禾本科	5~10	华中至长江流域 (V; VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	新秆布满白粉, 老秆仅节下有白粉环	庭园观赏, 可用于编织
658	毛竹 ●	Phyllostachys pubescens	禾本科	10~25	山东、河南以南地区 (IV~VII)	阳性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒	秆散生, 高大	庭园观赏, 风景林
659	龟 甲 竹 (人面竹) ●	Phyllostachys pubescens var.heterocycla	禾本科	10	长江中下游 (VI)	阳性, 喜温湿气候及肥沃疏松土壤	下部节间异形, 形如脸谱	庭园观赏
660	紫竹	Phyllostachys nigra	禾本科	3~5	长江流域及其以南地区 (V~VIII)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	新秆绿色, 老秆紫黑色	庭园观赏
661	淡竹 (毛金竹)	Phyllostachys nigra var. henonis	禾本科	7~18	长江流域及其以南地区 (V~VIII)	阳性, 喜温暖湿润气候	秆灰绿色	庭园观赏
662	早园竹●	Phyllostachys propinqua	禾本科	4~10	华北至长江流域 (III~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	枝叶青翠	庭园观赏
663	黄槽竹	Phyllostachys aureosulcata	禾本科	3~5	华北 (III)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	秆绿色或黄绿色, 竹秆节间纵槽内黄色	庭园观赏
664	苦竹	Pleioblastus amarus	禾本科	3~7	华北南部至长江流域、西南 (IV~VI)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	秆散生	庭园观赏
665	菲白竹	Pleioblastus argenteo-striatus	禾本科	1	长江中下游地区 (VI)	中性, 喜温暖湿润气候, 不耐寒	叶有白色纵条纹	绿篱、地被、盆栽、庭植观赏
666	茶秆竹	Pseudosasa amabilis	禾本科	6~15	长江流域以南至华南 (VI~VIII)	阳性, 喜温暖湿润气候, 稍耐寒	秆坚硬挺直, 老秆被蜡质斑块	庭园观赏
667	慈竹 ●	Dendrocalamus affinnis	禾本科	5~10	华中、西南 (VI)	阳性, 喜温湿气候及肥沃疏松土壤	秆丛生, 枝叶茂盛	庭园观赏、防风、护堤林
668	方竹 ●	Chimonobambusa quadrangularis	禾本科	3~8	华东、华南 (VI~VIII)	阳性, 喜肥沃排水良好的壤土或沙壤土	丛生竹, 竹秆有 4 钝棱	庭院观赏、造型

藤 木

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
669	炮仗花 ●	Pyrostegia ignea	紫葳科	华南、滇南 (VIII)	阳性, 喜暖热, 不耐寒,	常绿性, 花橙红色, 花期 1~6 月	攀援棚架、墙垣、山石等

续附表 1

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
670	蒜香藤●	Saritaea magnifica	紫葳科	华南（Ⅶ、Ⅷ）	喜光	常绿性，花紫红色至白色，春秋开花，叶揉搓有蒜香味	攀援棚架、围栏
671	美国凌霄	Campsis radicans	紫葳科	华北及其以南各地（Ⅲ~Ⅷ）	中性，喜温暖，耐寒	落叶性，花桔红色，花期 7~8 月	攀援墙垣、山石、棚架
672	凌霄●	Campsis grandiflora	紫葳科	华北及其以南各地（Ⅲ~Ⅷ）	中性，喜温暖，稍耐寒	落叶性，花大，桔红、红色，花期 7~9 月	攀援墙垣、山石等
673	北五味子●	Schisandra chinensis	五味子科	东北、华北、华中（Ⅱ~Ⅵ）	中性，耐寒性强，浅根性，不耐旱和水湿	落叶性，花乳白色或粉红色，芳香，花期 5 月，果红色，8~9 月	攀援篱垣、棚架、山石
674	南五味子	Kadsura longipedunculata	五味子科	华东、中南、西南（Ⅲ）	中性，喜暖湿气候	常绿性，花黄色，芳香，浆果深红色至暗蓝色	庭院观赏
675	云实●	Caesalpinia decapetala	苏木科	长江以南各省（Ⅴ~Ⅵ）	喜光，适应性强	落叶性，花黄色，花期 5 月	攀援墙垣、围栏
676	鸡血藤	Millettia reticulata	蝶形花科	华东、中南、西南（Ⅵ）	阳性	常绿性,花暗紫色，花期 5~8 月	攀援墙垣、棚架
677	紫藤●	Wisteria sinensis	蝶形花科	辽宁以南地区（Ⅶ）	阳性，略耐阴，耐寒，适应性强，落叶	落叶性，花堇紫色，花期 4 月，芳香	攀援棚架，枯树等
678	多花紫藤●	Wisteria floribunda	蝶形花科	长江流域及其以南地区（Ⅵ~Ⅷ）	喜光，喜排水良好的土壤	落叶性，花紫色或蓝紫色，花期 5 月，芳香	攀援棚架、老树干
679	常春油麻藤	Mucuna sempervirens	蝶形花科	我国西南至东南部（Ⅲ~Ⅵ）	耐阴，喜温暖湿润气候，耐干旱	常绿性，花大，暗紫色，花期 4 月	攀援棚架、岩石
680	铁线莲●	Clematis florida	毛茛科	华东、华中（Ⅳ~Ⅵ）	阳性，稍耐阴	落叶性，花白色，夏季	攀援篱垣、棚架、山石
681	转子莲●	Clematis patens	毛茛科	华北、东北（Ⅱ、Ⅲ）	阳性，喜排水良好的土壤	落叶性，花白色或淡黄色，大而美丽，5~6 月开花	攀援篱垣、棚架，垂直绿化材料
682	薜荔●	Ficus pumila	桑科	长江流域及其以南地区（Ⅵ~Ⅷ）	耐阴，喜温暖气候，不耐寒	常绿性	攀援山石、墙垣、树干等
683	南蛇藤●	Celastrus orbiculatus	卫矛科	东北、华北至长江流域（Ⅲ~Ⅵ）	中性，耐寒，性强健	落叶性，花黄绿色，秋叶红、黄色，蒴果鲜黄，开裂后更为美观	攀援棚架、墙垣
684	爬行卫矛	Euonymus fortunei var.radicans	卫矛科	华北以南地区（Ⅲ~Ⅶ）	耐阴，喜温暖气候，不耐寒	常绿性,叶较小，入秋常变红色，攀援能力较强	攀援墙面、山石、老树干

续附表 1

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
685	胶东卫矛	Euonymus kiautschovicus	卫矛科	我国东部及中部 (III~VI)	耐阴, 喜温暖气候, 稍耐寒	半常绿性, 花淡绿色, 花期 8 月。绿叶蒴果扁球形, 粉红色 11 月, 果熟	攀援墙面、山石、老树干
686	扶芳藤	Euonymus fortunei	卫矛科	华北以南地区 (III~VII)	耐阴, 喜温暖气候, 不耐寒, 常绿	常绿性, 入秋常变红色, 攀援能力较强	攀援墙面、山石、老树干
687	木香●	Rosa banksiae	蔷薇科	华北至长江流域 (IV~VI)	阳性, 喜温暖, 较耐寒	半常绿性, 花白或淡黄, 芳香, 花期 4~5 月	攀援篱架、篱栅
688	多花蔷薇●	Rosa multiflora	蔷薇科	华北南部至华南各省 (III~VIII)	喜光, 耐寒、耐旱, 耐水湿	落叶性, 花白、黄、粉, 芳香, 花期 5~6 月	攀援棚架、篱栅
689	十姐妹	Rosa multiflora cv. Platyphylla	蔷薇科	华北南部至华南各省 (III~VIII)	喜光, 耐寒、耐旱, 耐水湿	落叶性, 花重瓣, 深红色	攀援棚架、篱栅
690	木通	Akebia quinata	木通科	长江流域至华南 (V、VI)	中性, 喜温暖, 不耐寒	落叶性, 花暗紫色, 花期 4 月。10 月果熟, 紫色	攀援篱垣、棚架、山石
691	三叶木通●	Akebia trifoliata	木通科	华北至长江流域 (III~VI)	中性, 喜温暖, 较耐寒	落叶性, 花暗紫色, 花期 5 月	攀援篱垣、棚架、山石
692	杠柳●	Periploca sepium	杠柳科	除东北北部的全国各地(II~VI)	阳性, 耐寒, 耐旱	落叶性	垂直绿化
693	大血藤	Sargentodoxa cuneata	大血藤科	长江流域 (VI)	阳性	落叶性, 花黄绿色, 浆果暗蓝色	攀援篱垣、棚架
694	中国地锦 (爬山虎)●	Parthenocissus tricuspidata	葡萄科	南北各地(III~VIII、IX)	喜阴湿, 攀援能力强, 适应性强	落叶性, 秋叶黄色、橙黄色	攀援山石、棚架、墙壁
695	美国地锦 (五叶地锦)●	Parthenocissus quinquefolia	葡萄科	东北南部至全国各地 (III~VIII)	较耐阴, 喜温湿气候, 攀援能力弱, 抗污染	落叶性, 秋叶红艳或橙黄色	攀援山石、棚架、墙壁
696	葡萄●	Vitis vinifera	葡萄科	南北各地 (III~VII、IX、X)	阳性, 耐干旱, 怕涝	落叶性, 果紫红色或黄白, 花期 8~9 月	攀援棚架、篱栅, 果树
697	盘叶忍冬●	Lonicera tragophylla	忍冬科	华中、华东地区 (IV~VI)	耐阴	落叶性, 花黄色, 橙黄色, 花期 6~9 月。果熟时深红色, 9~10 月	攀援棚架、篱栅
698	金银花	Lonicera japonica	忍冬科	华北至华南、西南 (III~VIII)	喜光, 耐阴, 耐寒, 抗污染	半常绿性, 花黄、白色, 芳香, 花期 5~7 月	攀援小型棚架、墙垣、山石
699	贯叶忍冬●	Lonicera sempervirens	忍冬科	华东 (VI)	喜光, 不耐寒, 怕涝	半常绿性, 花桔红色至深红色, 晚春至秋陆续开放, 浆果红色	攀援园墙、拱门、篱栅

续附表 1

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
700	台尔曼忍冬●	Lonicera tellmanniana	忍冬科	东北南部至华北（III）	喜光，耐半阴，喜土壤湿润排水良好的生态环境	落叶性，花橙色，花期长	攀援园墙、拱门、篱栅
701	猕猴桃	Actinidia chinensis	猕猴桃科	我国中部及南部（II、III）	阳性，稍耐阴	落叶性，花黄白色，6月，有香气，果黄褐色，9月	庭植观赏、攀援棚架
702	软枣猕猴桃(猕猴桃梨)	Actinidia arguta	猕猴桃科	东北、西北、长江流域（II~VI）	中性，耐寒	落叶性，花乳白色，6月，果熟时，暗绿色	攀援棚架、篱垣
703	狗枣猕猴桃（深山天木蓼）	Actinidia kolomikta	猕猴桃科	东北、华北、西南（II~VI）	阳性	落叶性，花白色，芳香，雄株之叶上半部常变白色或粉红色，可观	攀援棚架、篱垣
704	葛枣猕猴桃(天木蓼)	Actinidia polygama	猕猴桃科	东北、西北、西南，华中（II~VI）	中性	落叶性，花白色，芳香，浆果黄色	攀援棚架、篱垣
705	中华常春藤	Hedera nepalensis var.sinensis	五加科	我国中部至南部、西南（IV~VIII）	阴性，喜阴湿温暖气候，不耐寒	常绿性，枝叶浓密，花淡黄白色 8~9月，果黄色或红色，3月	攀援墙垣、山石
706	鹅掌藤●	Scheffera arboricola	五加科	华南（VII、VIII）	蔓性灌木	常绿性，花淡黄绿色，秋冬开花，浆果红黄色，春季成熟	观叶植物
707	常春藤●	Hedera helix	五加科	长江流域及其以南地区（V~VIII）	阴性，喜温暖，不耐寒	常绿性，花淡黄白色，花期 8~9月。果黄色或红色，3月	攀援墙垣、山石，盆栽
708	软枝黄蝉●	Allemanda cathartica	夹竹桃科	华南（VII、VIII）	喜光，喜高温多湿气候，喜湿润土壤	常绿性，花黄色，花期 10月	攀援花架、荫棚
709	络石	Trachelospermum jasminoides	夹竹桃科	长江流域各地（V、VI）	耐阴，喜温暖，不耐寒	常绿性，花白色，芳香，花期 5月	攀援墙垣、山石、盆栽
710	长春蔓	Vinca major	夹竹桃科	华东至华南（V~VII）	中性	常绿性，花蓝紫色，花期 5~7月	地被植物
711	使君子●	Quisqualis indica	使君子科	华南（VII、VIII）	喜光，耐半阴，喜高温多湿气候	落叶性，花大，有香气，初开时为白色后变为淡红色至红色，夏至秋季开花	攀援花架、荫棚、墙垣
712	叶子花(三角花)●	Bougainvillea spectabilis	紫茉莉科	华南、滇南（VIII）	阳性，喜暖热气候，不耐寒	常绿性，花红、黄、紫，冬春开花	攀援山石、园墙、廊柱
713	麒麟尾●	Epipremnum pinnatum	天南星科	华南（VII、VIII）	喜半阴，喜温暖多湿气候，稍耐干旱，忌阳光暴晒	常绿性，肉穗花序淡白色，佛焰苞外黄内白	攀缘山石

续附表 1

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
714	龟背竹●	Monstera deliciosa	天南星 科	华南（Ⅶ、Ⅷ）	喜半阴，喜温暖多湿气候，忌阳光直射	常绿性，叶似龟背，气根长而下垂，肉穗花序淡黄色，佛焰苞外黄内白	观叶植物
715	春羽 ●	Phildendron selloum	天南星 科	华南（Ⅶ、Ⅷ）	喜半阴，喜温暖多湿气候	常绿性	观叶植物
716	心叶蔓绿 绒●	Philodendron scandens	天南星 科	华南（Ⅶ、Ⅷ）	喜半阴，喜温暖多湿气候，忌阳光暴晒	常绿性，肉质藤本，攀援性强	观叶植物
717	西番莲	Passiflora coerulea	西番莲 科	华南（Ⅶ、Ⅷ）	喜光，喜温暖至高温湿润气候	常绿性，攀援性强	攀援花架、荫棚

附表 2：常用草本园林植物性状表

序 号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
一、二年生花卉							
1	扫帚草（地肤）	Kochia scoparia	藜 科	全国各地	阳性，耐干旱瘠薄，耐碱，不耐寒	株丛圆整翠绿	自然丛植、花坛边缘、绿篱、盆栽
2	五色苋（红绿草）	Alternanthera bettzichiana	苋 科	全国各地	阳性，喜暖畏寒，宜高燥，耐修剪	株丛紧密，叶小，叶色美丽	模纹花坛材料
3	三色苋（雁来红）	Amaranthus tricolor	苋 科	全国各地	阳性，喜湿润及通风环境，忌湿热积水，耐旱，耐碱，耐寒	秋天梢叶鲜红艳丽，亦有深黄或橙色品种	丛植、花境背景、基础栽植
4	鸡冠花	Celosia cristata	苋 科	全国各地	阳性，喜干热，不耐寒，喜肥忌涝	花色多，有红、紫红、玫瑰红、橙黄色，花期 7~10 月	花坛、盆栽、干花、花镜
5	凤尾鸡冠	Celosia cristata var. pyramidalis	苋 科	全国各地	阳性，喜干热，不耐寒，喜肥忌涝	穗状花序，有红、黄两色系列，花期 8~10 月	花坛、盆栽
6	千日红	Gomphrena globosa	苋 科	全国各地	阳性，喜干热，不耐寒，不择土壤	花有深红、紫红、淡红、或白色，花期 8~10 月	花坛、盆栽、干花、切花
7	紫茉莉	Mirabilis jalapa	紫茉莉科	全国各地	阳性，稍耐阴，喜温暖湿润，不耐寒，直根性	花色丰富，芳香，花期夏至秋	林缘、草坪边缘、庭院
8	半支莲	Portulaca grandiflora	马齿苋科	全国各地	喜暖畏寒，耐干旱瘠薄	花色丰富，花期 6~8 月	花坛镶边、盆栽
9	须苞石竹	Dianthus barbatus	石竹科	长江流域及其以北地区	阳性，耐寒，喜肥，要求通风好	花有白、红、深红、紫等色彩，花期 5~10 月	花坛、花境、切花

续附表 2

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
10	锦团石竹	Dianthus chinensis var. heddeuigii	石竹科	长江流域及其以北地区	阳性，耐寒，喜肥，要求通风好	植株高 20~30cm,花色变化丰富，花期 5~10 月	花坛、岩石园
12	矮雪轮	Silene pendula	石竹科	全国各地	阳性，性健壮，喜肥，耐寒，耐湿	花深粉红色，花期 4~6 月，	花坛、地被
13	飞燕草	Consolida ajacis	毛茛科	全国各地	阳性，喜高燥凉爽，较耐寒，忌涝，直根性	花蓝紫色、粉红及白色，花期 5~6 月，花序长	花带、切花
14	花菱草	Eschscholtzia californica	罂粟科	全国各地	阳性，耐寒，喜冷凉干燥气候，忌高温，怕涝	叶秀花繁，花多黄色，花期 5~6 月	花带、花坛、花镜、盆栽
15	虞美人	Papaver rhoeas	罂粟科	全国各地	阳性，喜干燥，忌湿热，耐寒，直根性	花有白、红、粉红、紫红、玫红等色，花期 5~6 月	花坛、花丛、盆栽、庭植
16	银边翠	Euphorbia marginata	大戟科	全国各地	阳性，喜温暖，耐旱，直根性	梢叶白或镶白边	林缘地被或切花
17	凤仙花	Impatiens balsamina	凤仙花科	全国各地	阳性，喜暖畏寒，宜疏松肥沃土壤	花白色或红色，花期 6~7 月	花坛、花镜、花篱、盆栽
18	三色堇	Viola tricolor	堇菜科	全国各地	阳性，稍耐半阴，耐寒，喜凉爽	每朵花有蓝、黄、白三种颜色，花期 4~6 月	花坛、花径、镶边
19	月见草	Oenothera biennis	柳叶菜科	全国各地	喜光照充足，地势高燥	花黄色，芳香，6~9 月	丛植、花坛、地被
20	待霄草(月见草)	Oenothera odorata	柳叶菜科	全国各地,我国中部、南部可陆地越冬	喜光照充足，地势高燥	花黄色，傍晚至夜间开放，芳香，7~9 月	丛植、花坛、地被、香花园
21	大花牵牛	Ipomoea nil	旋花科	全国各地	阳性，不耐寒，较耐旱，直根蔓性	花色丰富，6~10 月	攀援棚架、篱垣、盆栽
22	圆叶牵牛	Ipomoea purpurea	旋花科	全国各地	阳性，喜温暖，不耐寒，耐干旱瘠薄	缠绕草本，花有白、桃红、堇紫、紫等色，花期 6~10 月	攀援棚架、篱垣
23	茑萝	Ipomoea quamoclit	旋花科	全国各地	阳性，喜温暖，不耐寒，耐干旱瘠薄，直根蔓性	花猩红、粉、白色，夏秋开花	攀援棚架、篱垣、矮篱
24	福禄考	Phlox drummondii	花荵科	全国各地	阳性，喜凉爽，耐寒力弱，忌碱涝	花有白、粉红、红、深红、紫红、蓝紫等色，花期 5~6 月	花坛、岩石园、花镜、切花
25	美女樱	Verbena hybrida	马鞭草科	全国各地	阳性，喜湿润肥沃排水良好的土壤，较耐寒	花除橙、黄两色外各色均有，花期 4~10 月	花坛、地被、花镜、自然栽植
26	醉蝶花	Cleome spinosa	白花菜科	全国各地	喜肥沃向阳，耐半阴，宜直播	花粉繁、白色，6~9 月	花坛、丛植、切花

续附表 2

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
27	羽衣甘蓝	Brassica oleracea var.acephala f. tricolor	十字花科	全国各地	阳性，耐寒，喜凉爽	叶色美，有蓝、紫红、粉红、牙黄、蓝绿等色	凉爽季节花坛、盆栽
28	香雪球	Lobularia maritima	十字花科	全国各地	阳性，喜凉忌热，稍耐寒，耐旱	花白或紫色，6~10月	花坛、岩石园
29	紫罗兰	Matthiola incana	十字花科	全国各地	阳性，耐半阴，喜冷凉气候肥沃土壤，忌燥热、耐寒	花淡紫或深粉红色，芳香，4~5月	花坛、切花、盆栽
30	桂竹香	Cheiranthus cheiri	十字花科	全国各地	阳性，耐寒，喜冷凉干燥气候，畏涝忌热	花橙黄、黄褐色或两色混杂，芳香，4~6月	花坛、花境、盆栽
31	一串红	Salvia splendens	唇形科	全国各地	阳性，稍耐半阴，不耐寒，喜肥沃	花红色，有白、紫色及矮型变种，花期7~10月	花坛、花带、盆栽
32	矮牵牛	Petunia hybrida	茄科	全国各地	阳性，喜温暖干燥，畏寒，忌涝	花大，有白粉、红、紫、堇紫等色，花期6~9月	花坛、花镜、自然式栽植、盆栽、花丛
33	金鱼草	Antirrhinum majus	玄参科	全国各地	阳性，耐半阴，较耐寒，喜凉爽，喜肥沃，稍耐石灰质土壤	花色除紫色外各色均有，花期5~6月	初夏花坛、盆栽、切花
34	心叶藿香蓟	Agerathum houstonianum	菊科	全国各地	阳性，适应性强	花蓝色，花期夏秋	花坛、花径、丛植、地被
35	雏菊	Bellis perennis	菊科	全国各地	阳性，较耐寒，喜冷凉气候	花白、粉、紫色，花期4~6月	花坛、花境、盆栽
36	金盏菊	Calendula officinalis	菊科	全国各地	阳性，较耐寒，喜凉爽	花黄至橙色，花期4~6月	春花坛、盆栽
37	翠菊	Callistephus chinesis	菊科	全国各地	阳性，喜肥沃湿润，忌连作和水涝	花有白、粉、红、黄、蓝紫色，花期6~10月	宜各种花卉布置和切花
38	矢车菊	Centaurea cyanus	菊科	全国各地	阳性，喜冷凉气候，忌炎热，直根性	花蓝、紫、粉红、白等色，5~8月	花坛、切花、盆栽
39	蛇目菊	Coreopsis tinctoria	菊科	全国各地	阳性，耐寒，喜冷凉，忌过肥土壤	花黄、红褐或复色，7~10月	花坛、花境、地被
40	波斯菊	Cosmos bipinnatus	菊科	全国各地	阳性，耐干旱瘠薄，性强健，肥水多易倒伏，开花少	花有白、粉、红、紫等色，花期8~10月	花丛、花篱、地被、花坛、花镜
41	万寿菊	Tagetes erecta	菊科	全国各地	阳性，喜温暖，抗早霜，抗逆性强，对土壤要求不严	花黄、橙色，6~10月	花坛、篱垣、花丛、花镜

续附表 2

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
42	孔雀草	Tagetes patula	菊科	全国各地	阳性，喜温暖，抗早霜，耐移植	花黄带褐斑，6~10 月	花坛、镶边、地被、花镜
43	百日草	Zinnia elegans	菊科	全国各地	阳性，耐半阴，耐旱，不择土壤，喜肥沃，排水好	花大色艳，花期 6~10 月	花坛、丛植、切花、丛植
宿 根 花 卉							
44	瞿麦	Dianthus superbus	石竹科	华北至华中	阳性，耐寒，喜肥沃，排水好	花白色、浅粉或紫红色有香气，花期 5~6 月	花坛、花境、丛植
45	常夏石竹	Dianthus plumarius	石竹科	长江流域及其以北地区	阳性，耐半阴，耐寒，喜肥，要求通风好	植株丛生，茎叶细，被白粉，花粉红、深粉红、白色，有香气，春夏开花	丛植、花坛、地被
46	皱叶剪秋罗	Lychnis chalcidonica	石竹科	长江流域及其以北地区	阳性，耐阴，耐寒，喜凉爽湿润	花序半球状，砖红色，花期 4~6 月	花境、花坛、地被
47	石碱花	Saponaria officinalis	石竹科	华北	阳性，性强健，不择干湿，地下茎发达，有自播习性	花白、淡红、鲜红色，7~9 月	地被
48	耬斗菜	Aquilegia vulgaris	毛茛科	全国各地	炎夏宜半阴，耐寒，喜湿润排水好的土壤	花紫色或蓝白色，花期 5~7 月	自然式栽植、花境、花坛，岩石园
49	翠雀（飞燕草）	Delphinium grandiflorum	毛茛科	我国北部	阳性，耐半阴，性强健，耐干旱，耐寒，喜冷凉气候，忌炎热	花蓝色，花期 5~7 月	自然式栽植、花境、花坛、岩石园
50	芍药	Paeonia lactiflora	芍药科	除华南以外的地区	阳性，耐寒，喜冷凉气候及深厚肥沃砂壤土	花色、花型丰富，花期 5 月	专类园、花境、群植、切花
51	荷包牡丹	Dicentra spectabilis	罂粟科	全国各地	喜侧荫，湿润，耐寒,惧热,怕旱	花粉红，花期 4~6 月	丛植、花境、疏林地被，盆栽
52	费菜	Sedum kamtschaticum	景天科	华北、西北	阳性，耐寒，忌水湿	多浆类，花橙黄色，花期 6~7 月	花境、岩石园、地被
53	八宝	Sedum spectabile	景天科	华北、华东	阳性，耐寒，忌水湿	多浆类，花淡红色，花期 7~9 月	花境、岩石园、地被
54	蜀葵	Althaea rosea	锦葵科	全国各地	阳性，耐寒，喜冷凉气候，耐半阴，宜肥沃排水良好土壤	花有红、白、紫红、分红等色，花期 6~8 月	花坛、花境、花带背景
55	芙蓉葵（秋葵）	Hibiscus moscheutos	锦葵科	华北、华东	阳性，喜温暖湿润，耐寒，排水好	花粉色、紫色或白色，6~8 月	丛植、花境背景

续附表 2

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
56	宿根福禄考	Phlox paniculata	花荵科	华北、华东、西北	阳性，耐寒，宜温和气候，喜排水良好，稍耐石灰质土壤	花色多，6~9月	花坛、花境、切花、地被、盆栽
57	随意草	Physostegia virginiana	唇形科	华北	阳性，耐寒，喜疏松肥沃，排水好	花白、粉紫色，7~9月	花坛、花境
58	桔梗	Platycodon grandiflorus	桔梗科	全国各地	阳性，喜凉爽湿润，排水良好	花蓝、白色，6~9月	花坛、花境、岩石园
59	千叶蓍	Achillea millefolium	菊科	东北、西北、华北	阳性，耐半阴，耐寒，宜排水好	舌状花白色，筒状花黄色、粉红色或紫红色，花期6~8月	花境、群植、切花、地被
60	木茼蒿	Argyranthemum frutescens	菊科	全国各地	阳性，喜凉惧热，畏寒	常绿亚灌木，舌状花白色或淡黄色，管状花黄色，周年开花，盛花期2~4月	花坛、花篱、切花、盆栽、暖地可露地栽培
61	荷兰菊	Aster novi-belgii	菊科	全国各地	阳性，耐寒，喜湿润肥沃排水良好土壤	花莲紫、白色，花期8~9月	花坛、花境、盆栽
62	大金鸡菊	Coreopsis lanceolata	菊科	华北、华东	阳性，耐寒，不择土壤，逸为野生	花黄色，6~8月	花坛、花境、切花
63	菊花	Dendranthema × grandiflora	菊科	全国各地	阳性，耐寒，多短日性，喜凉爽气候及肥沃湿润土壤	花色繁多，10~11月	花坛、花境、盆栽
64	大天人菊	Gaillardia aristata	菊科	东北、华北、华东	阳性，要求排水良好	花黄或瓣基褐色，6~10月	花坛、花境
65	牛眼菊	Leucanthemum vulgare	菊科	华北、西北、东北	阳性，耐寒，喜肥沃，排水好	花白色，5~9月	花坛、花境、丛植
66	黑心菊	Rudbeckia hybrida	菊科	东北、华北、华东	阳性，耐寒，耐干旱，喜肥沃土壤，通风好	花金黄或瓣基暗红色，5~9月	花境、自然丛植
67	吉祥草	Reineckea carnea	百合科	长江以南地区	喜温暖湿润及半阴环境，畏烈日	花小而多，芳香，粉红色，浆果熟时鲜红色，有银边吉祥草	地被
68	万年青	Rohdea japonica	百合科	长江以南地区	喜温暖湿润及半阴环境，宜微酸性砂壤土	花白色至淡绿色，5~6月球形浆果，红色至桔红色，9~10月	观果、观叶植物
69	龙舌兰	Agave americana	龙舌兰科	华南	喜光，喜温暖湿润气候，耐半阴，耐干旱瘠薄，适应性强	植丛呈莲座状	观叶植物
70	兰花类	Cymbidium spp.	兰科	长江以南地区	喜阴湿及通风良好的环境，喜排水良好而含腐殖质的砂土	叶姿优美，花香袭人	盆栽、温暖地区可做林下地被

续附表 2

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
71	萱草	Hemerocallis fulva	百合科	我国大部地区	阳性，耐半阴，耐寒，耐旱，适应性强	花桔红至桔黄色，具香味，花期 6~8 月	丛植、花境、疏林地被
72	玉簪	Hosta plantaginea	百合科	全国各地	喜阴，耐寒，宜湿润，排水好	花白色，具芳香，花期 7~9 月，叶基成丛	林下地被
73	火炬花	Kniphofia uvaria	百合科	华北、华东	耐半阴，耐寒，宜排水好	花黄、晕红色，夏季开花	花坛，花境，切花
74	阔叶麦冬	Liriope palatyphylla	百合科	我国中部及南部	喜阴湿温暖，稍耐寒	常绿性，株丛低矮，叶多簇生，线形，浓绿色	地被、花坛、花境边缘，盆栽
75	沿阶草	Ophiopogon japonicus	百合科	我国中部及南部	喜阴湿温暖，稍耐寒	常绿性，株丛低矮，叶丛生，狭线形	地被、花坛、花境边缘，盆栽
76	德国鸢尾	Iris germanica	鸢尾科	全国各地	阳性，耐寒，喜湿润而排水好	花有纯白、白黄、姜黄、桃红、淡紫、深紫等色，花期 5~6 月	花坛、花境、切花
77	鸢尾	Iris tectorum	鸢尾科	全国各地	阳性，耐半阴，耐寒，耐旱，喜湿润而排水好	花蓝紫色，4~5 月	花坛、花境、丛植，
球 根 花 卉							
78	花毛茛	Ranunculus asiaticus	毛茛科	华东、华中、西南	阳性，喜凉忌热，宜肥沃而排水好土壤，怕旱，畏积水	花有红、白、橙、黄等色，4~5 月	丛植、切花
79	大丽花	Dahlia pinnata	菊 科	全国各地	阳性，畏寒惧热，宜高燥凉爽	花型、花色丰富，夏秋开花	盆栽、花坛、花境、切花
80	卷丹	Lilium tigrinum	百合科	全国各地	阳性，稍耐阴，宜湿润肥沃，忌连作	花橙色，7~8 月	丛植、花坛、花境、切花
81	葡萄风信子	Muscari botryoides	百合科	华北、华东	耐半阴，喜凉爽气候，喜肥沃湿润排水良好的土壤	株矮，花蓝色，春花 3~4 月	疏林地被、丛植、切花
82	郁金香	Tulipa gesneriana	百合科	全国各地	阳性，喜凉爽湿润气候及疏松、肥沃土壤	花大，花有鲜红、橙、黄、白、褐、单色或复色品种，花期 3~4 月	花境、花坛、切花
83	石蒜	Lycoris radiata	石蒜科	华北至长江流域	喜半阴，也耐暴晒，喜凉爽湿润气候，较耐寒，喜疏松排水良好的土壤	花鲜红色，花期 7~9 月	林下地被、丛植、切花
84	喇叭水仙	Narcissus pseudo-narcissus	石蒜科	华东、华中、华北	阳性，耐阴，喜温暖湿润，肥沃而排水好	叶姿清秀，花大，花色白、黄色色，芳香，花期 4 月	花坛、花境、疏林地被
85	晚香玉（夜来香）	Polianthes tuberosa	石蒜科	全国各地	阳性，喜温暖湿润，肥沃，忌积水	花白色，芳香，7~11 月	切花、夜花园、岩石园

续附表 2

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
86	葱兰	Zephyranthes candida	石蒜科	全国各地	阳性，耐半阴和低湿，宜肥沃而排水好	花白色，夏秋	花坛镶边、疏林地被、花径
87	唐菖蒲	Gladiolus hybridus	鸢尾科	全国各地	阳性，喜通风好，忌闷热湿冷	叶剑形，花大，色彩绚丽，品种多，花色丰富，夏秋开花	切花、花坛、盆栽
88	西班牙鸢尾	Iris xiphium	鸢尾科	华东，华北(稍保护)	阳性，稍耐阴，喜凉忌热，宜排水好，秋冬生长，早春开花，夏季休眠	花蓝紫色，有丰富的花型和花色变种，春花 5 月	早春花坛、花境、丛植、切花
89	美人蕉	Canna generalis	美人蕉科	全国各地	阳性，喜温暖湿润，肥沃而排水好	花色变化丰富，夏秋	花坛、列植
水生花卉							
90	荷花	Nelumbo nucifera	睡莲科	全国各地	阳性，耐寒，喜温暖而多有机质处	花色多，6~9 月	美化水面、盆栽或切花
91	萍蓬草	Nuphar pumilum	睡莲科	东北、华东、华南	阳性，喜生浅水中，较耐寒	花黄色，花期 4~9 月	美化水面和盆栽
92	睡莲类	Nymphaea spp.	睡莲科	全国各地	阳性，喜温暖通风之静水，宜肥土	花有白、黄、粉色，花期 6~8 月	美化水面、盆栽或切花
93	菖蒲类	Acorus spp.	天南星科	长江流域以南地区	喜阴湿，稍耐寒，性强健	叶丛美丽，植株或花具香气	地被植物、水边绿化
94	千屈菜	Lythrum salicaria	千屈菜科	全国各地	阳性，耐寒，通风好，浅水或地植	花玫红色，7~9 月	花境、浅滩、沼泽地被
95	水葱	Scirpus tabernaemontani	莎草科	全国各地	阳性，夏宜半阴，喜湿润凉爽通风	株丛挺立，花淡黄褐色，花期 6~8 月	湿地、沼泽地、岸边绿化、盆栽
96	芦竹（狄芦竹）	Arundo donax	禾本科	华北南部	阳性，喜温暖，喜水湿，耐寒性不强	茎粗壮丛生，叶片条状披针形，顶生圆锥花序大而长，花期 9~12 月	水边观赏
97	凤眼莲	Eichhirnia crassipes	雨久花科	全国各地	阳性，宜温暖而富有机质的静水	叶鲜绿色，花蓝紫色，花期 7~9 月	美化水面、盆栽、切花
草坪地被植物							
98	二月兰	Orychophragmus violaceus	十字花科	东北南部至华东	宜半阴，耐寒，喜湿润	花淡蓝紫色，花期 3~5 月	疏林地被、林缘绿化
99	白车轴草（白三叶）	Trifolium repens	豆 科	东北，华北至长江流域	耐半阴，耐寒，耐旱，耐践踏，喜温湿	花白色，花期 4~6 月	地被、固土护坡

续附表 2

序号	中名	学名	科名	适用地区	生态习性	生物学特性及观赏特性	园林用途
100	连钱草	Glechoma longituba	唇形科	全国各地	喜阴湿，阳处亦可生长，耐寒，忌涝	花淡蓝至紫色，花期 3~4 月	疏林地被
101	匍匐剪股颖	Agrostis stolonifera	禾本科	华北、华东、华中	稍耐阴，耐寒，湿润肥沃，忌旱碱	绿色期长	潮湿地区或疏林下草坪
102	地毯草(大 叶油草)	Axonopus compressus	禾本科	华南	阳性，要求温暖湿润，侵占力强	宽叶低矮	庭园、运动场、固 土护坡草坪
103	野牛草	Buckloe dactyloides	禾本科	我国北方广大地区	阳性，耐半阴，耐寒，耐瘠薄干旱，不耐湿	叶细，色灰绿	为我国北方应用最多的暖地型草坪
104	狗牙根(爬 根草)	Cynodon dactylon	禾本科	长江流域及其以南地区	阳性，喜湿耐热，不耐阴，不耐寒，蔓延快	叶绿低矮，匍匐茎蔓延能力强，分枝多	游憩、运动场草坪
105	草地早熟 禾	Poa pratensis	禾本科	华北、华东、华中	喜光亦耐阴，宜温湿，忌干热，耐寒	绿色期长	潮湿地区草坪
106	结缕草	Zoysia japonica	禾本科	东北、华北、华南	阳性，耐阴，耐热，耐寒，耐旱，耐践踏	叶宽硬，具匍匐茎	游憩、运动场、高 尔夫球场草坪
107	细叶结缕草 (天鹅绒)	Zoysia tenuifolia	禾本科	长江流域及其以南地区	阳性，耐湿，不耐寒，耐践踏	叶极细，低矮，匍匐茎发达	观赏、游憩、固土 护坡草坪
108	羊胡子草 (白颖苔草)	Carex rigescens	莎草科	我国北方广大地区	稍耐阴，耐寒，耐干旱瘠薄，耐踏性差	叶鲜绿	观赏、或人流少的 庭园草坪
109	羊茅	Festuca ovina	禾本科	全国大部地区	阳性，不耐阴，耐寒，耐旱，耐热，不耐践踏,不择土壤	草丛低矮平整，纤细美观	高尔夫场草坪，花 坛、花境的镶边植物，岩石园
110	黑麦草类	Lolium spp.	禾本科	全国大部地区	阳性，不耐阴，喜温暖湿润气候，极耐践踏，不耐旱、寒，繁殖侵占能力强	叶片质地柔软，根状茎细弱，须根稠密	先锋绿化草种，快 速绿化草种
111	假俭草(蜈 蚣草)	Eremochloa ophiuroides	禾本科	长江流域以南	喜光，耐阴，耐干旱，较耐践踏	叶线形，具贴地生长的匍匐茎	运动场草坪、固土 护坡
112	红花酢浆 草	Oxalis rubra	酢浆草科	我国亚热带地区	喜向阳、湿润肥沃土壤	株矮，叶基生，也有白晕，花玫瑰红、粉红，花期 4~11 月	河岸边、岩石园
113	马蹄金	Dichondra repens	旋花科	长江流域以南	喜光及温暖湿润气候，耐低温，耐践踏	株高 5~15cm，具匍匐茎，侵占力强	庭院地被，固土护 坡

主编单位、参编单位、联系人及电话

主编单位

中国建筑标准设计研究院

郭 景

(010) 88361155-203

史丽秀

(010) 68361229

城市建设研究院风景园林所

白伟岚

(010) 64921199-2095
-2093
-2007

主管单位

中国建筑标准设计研究院

郭 景

(010) 88361155-203